

中學生自然研究叢書

魚類圖譜

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

2-64

中學生自然研究叢書

魚類圖譜

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

1983年4月28日

商務印書館發行

中華民國二十五年六月初版
（52963）

中學生自然
研究叢書
魚類圖譜一冊 實價國幣柒角

本叢書全部三十冊實價國幣拾陸元

外埠酌加運費匯費

版權所有必印翻

編譯者 沐

周王紹

雲建

人五良

發行人

王 上

上海

河南

南路

印刷所

周王紹

雲建

河南

南路

發行所

王 上

上海

河南

南路

印刷所

周王紹

雲建

河南

南路

發行所

周王紹

雲建

河南

南路

（本書校對者林仁之）

* D 三四三〇

編輯例言

1. 「自然研究」一語，在教育學上原指一種動的教學方法，即指導兒童向自然中去研究實物，以代替單純的文字教學，另一方面戶內觀察和實驗當然也並不忽略。它的研究材料，則大部分以動植物為主。本叢書的範圍和這相似，但內容卻微有不同。它包含研究方法，兼有理論的說明，使適合於中學生及一般讀者的閱讀。

1. 本叢書共二十五種，計三十冊，其中三分之二以文字為主，遇必要時附以插圖。內含基本理論，論文輯集，生物記載，研究方法，以及地球的歷史，科學摘記等項。又三分之一為圖譜，以圖為主，說明為輔，包括普通植物，觀賞植物，以及魚類，鳥類等動物的圖譜，每冊並有三色版彩圖約十面。圖譜不特能增加讀者的興趣，並且對於辨認實物也大有幫助。

1. 本叢書所採取材料以中國為主，但他國產物之著名或習知的也酌量採入。在圖譜方面，動植物的種類繁多，而篇幅有限，「掛一漏萬」，在所不免。

1. 本叢書有著的，譯的，或編的，因了材料的來源和執

筆者的意見不同，文體及譯名等不同之處亦所難免，讀者諒之。

1. 本叢書雖名爲「中學生自然研究叢書」，實際上也是一般愛好自然科學者的入門書。並且小學教師的參考上，也很有用處。

二十五年五月編者識

目 次

盲鰻 八目鰻	2
驛鯊 脂鯊	5
貓鯊 青鯊 白眼鯊	6
星鯊 雙鬚鯊	9
平頭鯊 長尾鯊 灰鯊	10
白頰鯊 尖角鯊 鋸鯊	13
黃點鯈 電鯈	14
黃貂鯈 刺鳶鯈	17
鰈魚 鱷 鯪魚	18
鯇 鮎	21
青鱗魚 鯷魚 鮭魚	22
狗母魚 紅狗母魚 鯨魚	25
鮒 鯉魚 石諸子	26
丁斑 苦腸魚 鰐	29
泥鰍 花鰍 鱔魚	30
鰻鱺魚 康吉鰻 鰆 黃鱺	33

—魚類圖譜—

楊枝魚 紅烟管魚 珊瑚海馬	34
鱈魚 文鰨魚	37
金眼鯛 錦鯛	38
金鱗魚 松球魚	41
鯔魚 竹刀魚 鮓魚	42
鯖魚 鯉 雲裳金鎗	45
金鎗魚 長鬚金鎗	46
鰆 旗魚 鎮獸	49
帶魚 疣鯛	50
烏鯧 鯧魚	53
鯨 鯽魚 紡錐鯨	54
白鬚鯛 回鯛	57
銀眶魚 縞鰭	58
天竺鯛 大眼鯛 鱇	61
鱸魚 鰆魚 星鮨	62
青鮨 縞雞魚	65
弧紋鯛魚 雞魚	66
石鯽 鱩鯛	69
紅魚 紅鯛	70

—魚類圖譜—

烏頰魚 條鯛	73
黃鯛 棘鰩魚	74
鮀 黃花魚	77
紺海鯉 甘鯛 鷹斑鯛	78
鬚魚 雀鯛	81
瘤鯛 砂逼羅	82
蝴蝶魚 求仙魚	85
點鯛 縞奴鯛	86
燕魚	89
藍子魚 鹿角魚	90
一角刺 三角魚	93
箱河豚 海雀 團扇河豚	94
模樣河豚 條河豚	97
鯖覲 刺河豚	98
石獅魚 鮋	101
蓑鮋 火魚	102
飭鯔 印魚	105
灰彈塗 比目魚	106
星鰈 眼板鰈	109

—魚類圖譜—

- 孫鰈 二色鰈..... 110
橫條鮓 紅舌鮓 虎鮓..... 113
姬鮓 鼠鮓 鱔..... 114
燈籠魚 鮫鰈..... 117

魚類圖譜

1. 盲鰻 *Heptatretus burgeri* (Girard). 英名 Borer. 盲
鰻科

眼退化，幾成無用。口邊有鬚 8 條，鼻孔位於口之上部。
兩側各有鰓及鰓孔 6 個。齒 2 列，銳利。體呈淡褐紫色。全長
約 600 餘毫米。


分布於日本中部以南及朝鮮南部一帶。我國產地未詳。棲
息內灣 5—7 米淺水處，具掠奪性，能穿入魚類體內，食其內
臟。夜間尤為活動，襲擊羅網之魚；且分泌黏液，損及網罟。產
卵期自 8 月中旬至 10 月下旬。卵數平均約 18 個。供食用，
又可作釣餌。

2. 八目鰻 *Entosphenus japonicus* Martens. 英名 Lam-
prey. 八目鰻科


體呈圓筒狀。與鰻魚相似，惟口為圓形，且無上下顎區別。
有鰓孔 7 對。全體黑青色，腹面較淡。長約 630 毫米。

日本，黑龍江下流，堪察加及猶空河 (Yukon) 等處出產甚
多。我國雖有產此魚之記載，但產地未詳，尚待啟證。幼生之
Ammocoetes 潛伏海底，約 5 年餘，始發生變態。消化器官發
達，吸住其他魚類生活。變態後數年，於 4—7 月間上溯河流
產卵，然後死去。每尾產卵數在 7 萬內外。味美。日本舊醫用
以入藥，據云可治雞盲。因昔人誤認頸旁 7 對鰓孔為眼，故連
眼合稱為八目鰻。

—魚類圖譜—



— 魚類圖譜 —



—魚類圖譜—

1. 驟鯊 *Chlamydoselachus anguineus* Garman. 英名

Frilled shark. 驅鯊科

體長，背鰭與稍大之臀鰭對生。尾鰭形狀特異，無普通鯊類之缺刻。兩側各有鰓孔 6 個，鰓蓋皮延長呈褶襞狀。噴水孔小，遠在眼之後方。口之位置，異於普通鯊類，在頭之前端。兩顎齒同型。本種為現生鯊類中之最原始者，故富有學術上之興味。

1884 年 格門 (Garman) 氏將日本採得之標本公諸世界後，歐洲各處亦續有捕獲。徵諸本種在歐洲之分布狀態，則他處深海中恐亦有棲息。生殖期自 4 月下旬至 7 月上旬。每尾胎兒數約 6—12。胎兒在捕獲母體內之最大紀錄為 347 毫米，成長後達 2 米。不能供食用。

2. 脂鯊 *Heptranchias deani* Jordan & Starks. 鯊科

體長而圓，吻略形突出，側扁而狹，前端頗鈍。眼大，無瞬膜。噴水孔小，位於眼與鰓孔之間。鰓孔每側 7 個，自前至後，逐漸由長而短。口位於吻之腹側，口角有 1 長溝。背鰭 1 基，在臀鰭前方，尾鰭甚長，下葉前端附近有 1 缺刻。胸鰭小。背部暗灰色，腹面較淡，全長達 1 米。分布於日本等處，供食用。

—魚類圖譜—

1. 貓鯊(虎頭鯊) *Heterodontus zebra*(Gray). 貓鯊科

本種與虎鯊酷似，然其實不同。自尾鰭至臀鰭之距離，約爲臀鰭基底長之 2 倍。第一背鰭在胸鰭基底中央之上部。體呈淡鼠色，上有 35 條黑褐色不規則之橫帶，闊帶與狹帶交互存在。全長達 1 米。

喜居暖海。分布區域頗廣，自東印度羣島至我國東海，均有出產。

2. 青鯊 *Galeus glaucus*(Linné). 星鯊科

體長大。眼有瞬膜，無噴水孔。胸鰭大，呈鎌刀狀。第一背鰭稍偏於體之後方，第二背鰭與臀鰭對生。體背呈青灰色，腹部白色，全長 6 米餘。

分布於我國福建，溫州，海南之外海，歐洲，北美及日本等處亦產。性凶猛，敏捷。胎兒數爲鯊類中之最多者，每尾胎兒數在 60 內外。供食用，魚翅以本種各鰭所製者爲最上品。

3. 白眼鯊 *Carcharhinus gangeticus* Müller & Henle.
星鯊科


頭部闊而縱扁，吻長。無噴水孔。胸鰭發達。尾鰭基部上端有 1 四窪。體呈青灰色，全長達 7.5 米，爲全世界所產大鯊之一種。

分布於我國，日本，印度等處。胎生，胎兒數約 18 尾左右。供食用。本種因眼之附近有白色 1 圈，故名。


—魚類圖譜—



1




2




3

—魚類圖譜—



1



2



3

— 8 —