


萬方新編

第九年

新在舍



府風

首會右頂
後寸半

曲池在肘橫紋
頭之左側

曲池

命門

商陽指中根側
開冲四指外側中根旁
少澤指外側中根下

至陰
陰紋
臑外

委中
委中終後橫紋中

臑外
三指外角
陰紋指外側
至陰指外

商陽
少澤

痧症全書目錄

卷一

痧原大略第一

痧無補法第二

分經絡第三

看涼熱第四

分表裡第五

審脈第六


論吐下第七

急症第八

緒論第九

手法第十 炸利刺

放痧十處



用藥大法第十一 藥忌 藥宜 宜忌

補未列藥

飲食第十二 食忌 食宜

飲急小方第十三 試痧法在內

卷中

痧分症治第十四

風痧

陰痧

紅痧

烏痧

瀉痧 即木痧

慢痧 即白痧

暑痧

陽痧

斑痧

吐痧

緊痧

暈痧

絞腸痧

暗痧

落弓痧

撲跌痧 卽喉痧

痘痧

晚陽痧 附方

羊痧 附晚痧

瘋痧

蛔蟲痧

鐵痧

身重痧

偏身青筋痧

抽筋痧

悶痧

噤口痧

角弓痧 附方歌

滿痧

羊毛痧 附輓擦法

血沫痧 附方

紫疱痧

銅痧 卽發背

痧塊

心煩嗜睡痧

遍身腫脹痧

痧別兼類變第十五

傷寒兼痧

傷風咳嗽痧

霍亂痧

痧類瘧疾

頭痛痧

腰痛痧

頭眩偏痛痧

痰喘氣急痧

膨脹兼痧

老病兼痧

內傷兼痧

痧類傷寒

咳嗽嘔噦痧

痧痢

瘧疾兼痧

心痛痧

小腹痛痧

流火流痰痧

半身不遂痧

痧變膨脹

弱症兼痧

痧變勞瘵

痧變血便紅

痧小便不通

痧後牙疳

婦人倒經痧

胎前痧痛附用藥

小兒夾驚痧

痘後痧脹

痧變腫毒

痧變發斑

眼目怪症痧

痧後胸膈痛

附胎產痧論

產後痧痛附用藥

痘前痧脹

瘡症兼痧

附痧後調理

卷下

六十四方第十六加總歌

金石

絲

竹

匏

土

革

木各八

麻瘋方附竹六

應用羣方第十七

玉樞丹

仙方腦麝力

煉石丹

附華陀危病方

治噉香綠丸

加減聖效散

失笑散

祛癰辟瘟丹

異症方案

六一散

補原本末列方

生黃八寶丹

鬱金丸

硫礬丸

潤下丸

大羌活湯

如聖散

普濟消毒飲

白虎湯
竹葉石膏湯

加味清血飲

治腰痛法二

五苓散加減

六和湯

續附絡痛方家

金鈴子

續附景岳刮案灸法

胃苓湯

霍香正氣散

痾嘔石附

痧症全書

閩中林

森德傳授

昆騰

凱著吾編輯

泰興

何孫

分所流訓訂
細芸樓訓訂
賜以臣奉校

痧原大略第一

先吐瀉而心腹絞痛者其痧從穢氣發者多先心腹絞痛而吐瀉者從暑氣發者多心胸昏悶痰涎膠結從傷伏熱發者多遍身腫脹疼痛四肢不舉舌強不言從寒氣冰伏過時鬱為火毒而發者多

痧無補法第二

痧者腐氣也入氣分則作腫作脹入血分則為蓄為瘀遇食積痰火則氣阻血滯最忌熱湯熱酒不論犯者虛實皆以有餘治絕無補法川藥剋削病自當之中病即已

分經絡第三

腰背顛頭連及風府脹痛難忍是太陽膀胱經痧

兩目赤腫唇乾鼻燥腹中絞痛是陽明胃經痧

脇肋腫脹痛連兩耳是少陽膽經痧

腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已是太陰脾經痧

心胸弔痛身重難移作腫作脹是厥陰肝經痧

痛連腰腎外腎也小腹脹硬是少陰腎經痧

咳嗽聲啞氣逆發噎手太陰肺經痧

半身疼痛麻木左足不能屈伸手太陽小腸經痧

半身脹痛廢俛仰有是不能屈伸手陽明大腸經痧

病重昏沉或任言不省人事手少陰心經痧

或醒或寐或獨語一二句手厥陰心胞絡經痧

胎腹熱脹揭去衣被乾燥無極手少陽三焦經少

按十二經受病見症隨症施治其引經藥亦不可少今

通列手足經脈後

手少陰心循手小指內側出其端

手太陽小腸起手小指端循外側上行

手少陽三焦起手無名指端

手厥陰心胞絡又名手心主出中指端

手陽明大腸起手食指端

手太陰肺出手大指端

足厥陰肝起足大指聚毛上

足太陰脾起足大指端

足陽明胃起足次指外間又一支亦入大趾

中指外間

足少陽膽起足四指間

足太陽膀胱起足小指外側端

足少陰腎起足小指下

闕此便於針刺

足太陽膀胱

手太陽小腸

陽明

胃大腸

少陽

膽三焦

足少陰腎

手少陰心

太陰

脾肺

厥陰

肝心胞絡

足太陽膀胱

手太陽小腸

藥本 吳和

足少陽胆

足厥陰肝

柴胡 苦皮

足陽明胃

葛根 石膏洗作厚朴

手少陽三焦

川芎 少用 沈有丹皮

手陽明大腸白芷少用

手厥陰心胞絡

足太陰脾酒白芍

手太陰肺白芷少用
洗有枯傳

足少陰腎酒

手少陰心細辛

膀胱小葉相差些須胃大葛朴芷區區脾芍腎獨鹽酒俱
膽肝焦紹柴丹青川芎宜少再丁宜肺葱桔芷心獨辛
羌芎白芷少為貴胃腸脾肺升麻履腎尤切戒毋加桂

看涼熱第四

疝犯太陽則頭痛發熱犯少陽則耳旁腫脹寒熱往來犯
陽明則面目如火但熱不寒犯太陰則腹痛犯厥陰則小
腹或胸脇痛犯少陰則腰痛以至皆身涼犯肺則咳嗽痰
喘微熱甚則鼻衄犯心則心痛或心脹頭額冷汗如珠而
身或熱或涼犯膀胱則小便溺血甚則身熱犯大腸則痢

下膿血重則嘔吐身熱犯肝則沉重不能轉側肺熱內熱甚則吐血犯三焦則熱毒內攻上則口渴下則便結凡痧氣壅阻發則爲熱若誤爲外感傳經熱症而發汗溫飲雖慢痧遲緩亦必變出頭汗發狂詬語種種重症不知外感之脈浮數而緊熱症之脈洪數有力痧症之脈終有不同或有可疑須看痧筋有無辨之

痧症身涼而內熱者宜攻其裡表實者宜透其肌用藥隨時活變故不立主方

分表裡第五

痧感肌表人不自知則入半表半裡故胸中作悶或作嘔吐而腹痛生焉此可猝刮而愈不愈用金四金五方痧毒入裡故欲吐不吐欲瀉不瀉衝心則心胸大痛攻腹