

觀聚方要補

癸

小兒初生

諸疳

諸痛驚風

小兒諸症



右觀聚方要補十卷。鉛槧有年。久爲醫家鴻寶。但傳播已廣。文字亦日就漫漶。當時校勘。非不精。而所據各種。仍有未得善本者。則其間往往不能無差錯。先伯父柳汧先生深以爲憾。有志于再訂。而不果。先教諭蒞庭府。君亦有志于斯。蓋近歲以來。如宋槧千金外臺及遠祖所著醫心方。凡絕無僅有之佳本。歷來鬱而未顯者。相踵而出。其可據以補訂者。匪一。於是從兄曉湖君與先教諭謀。釐力加之點勘。期無一遺誤。而後已。舊本每門前湯藥而後丸散。今一以世次爲序。舊本類方之散見于各款者。今一隸之原方之下。如金匱要略諸方及世所習見各方。原亦從略。應用之際。有不便者。今皆具

加續錄。以至煎煮服法。舊本從略者。亦皆一照原本載入。庶幾大莫不備。小莫不該。凡古今制方之源流。銖兩之節度。秩然可觀。譬之金之出冶。璞之加彫。蓋可謂吾家歷世拯黎之効。大成乎今日。功亦偉矣。此舉也。先教諭在日。將爲之跋。亦未果而謝世。今夏刻成。而刷印在迩也。曉湖君使琰置一言。其後琰辭以弇陋。不允。爰書家庭所聞。以應其命云爾。安政丁巳仲夏丹波元琰謹撰。

觀聚方要補卷十目錄

小兒初生

平和飲子

朱蜜法

龍膽湯

療初生不喫奶方

柴胡散

治嘔吐乳奶方

治胎寒腹痛方

生地黃湯

甘草湯

牛黃法

紫丸

治胞熱撮口方

黃連法

百壽散
黃連甘草汁

茯苓圓

治惡穢入腹嘔吐不止方

釀乳方

瓜蒂散

五香散

定命散

沈瀝丹

諸癰驚風

龍膽湯

龍膽散

竹瀝磨犀角飲子

延齡散

胡黃連散

治驚癇方

抱龍圓

涼驚圓

瀉青圓

導赤散

防風導赤散

利驚圓

宣風散

治慢驚風方

虛風湯

銀白散

治卒得癰方

療驚癰癰癰方

烏蛇散

安神湯

犀角湯

治驚癰客忤方

朱砂鐵粉散

緩急湯

神烏散

人參牛黃散

羚羊角湯

犀角湯

銀棗湯

醒脾散
大醒脾散

烏蝎四君子湯

烏沈湯

礞石散

黑附湯
蝎附散
黑附子湯

川烏散

沉附湯

釣藤飲

陰癰散

醒脾散

寧神膏

防風天麻散

分肢散

沉香天麻湯

奪命散
神聖牛黃奪命散

無價散

固真湯

六柱散

琥珀散

白附丸

奪命散

柴胡加大黃湯

抑肝散

釣藤散

參附湯

紫金錠

治風痰吐沫方

治內熱痰壅方

加味回陽散

急構飲

諸疳

四靈圓 五疳丸

鐵粉圓

麝香圓

大蘆薈圓

胡黃連丸

三和飲子

蘆薈丸

保童丸

肥兒丸 消疳消食丸
黃連肥兒圓

蝦蟇丸 五蟾圓

五靈脂丹

黃芪湯

驚血煎

不思食方

淨府散

抑肝扶脾散

清胃養脾湯

消疳飲

小兒諸症

紫丸

三物石膏湯

四物解肌湯升麻散

釣藤散

石膏散

加減四味飲子芍藥湯

藿香散

赤茯苓散

貝母散

牛黃圓

鶴蝨散

苦楝根散

黃芪圓

地黃圓補腎地黃圓
人參地黃圓

瀉白散

阿膠散 補肺散

益黃散

白朮散 人參散

瀉心湯

異功散 和脾飲子
參苓散

藿香散

二氣散

惺惺散

消毒散

連翹飲

甜消散

治小兒盜汗方

石亭脂散

治小兒脾胃虛寒吐瀉等方

魏香散

紫蘇子散

葛根湯

六神湯 人參白朮豆散
銀白散 六神散

四順散

越桃飲子

人參犀角散

胡黃連散

惺惺散

清膈飲子

黑散子

海漂消散

貝母丸

甘瓜散

墜痰丸

溫脾丹

芍藥丸

海蛤散

金鈴散

白朮散

麥門冬散

山薊湯

滴金散

藿香散

雙金散

治陰囊腫痛方

常歸散

二黃散

治吊氣方

治陰囊腫大方

呀方

升麻飲子

加減瀉黃散

大連翹飲

大連翹湯

烏梅散

五苓散

半夏圓

黃耆茯苓散

治小兒蟲証腹痛方

治小兒直腸泄瀉方

乳附元

附苓元

治小兒嘔吐法

乳沈膏

香葛湯

消食圓

治夜啼方

阿魏丸

脫甲散

鼈甲退熱散

犀角散

水萍散

調中散

神生救生散

牛黃解毒丸

四黃丸

益脾散

白附飲

碧玉丹

清脾飲

觀聚方要補卷十

東都 丹波元簡廉夫 輯

孫元昕兆燾 參訂

小兒初生

平和飲子 顧願 治小兒初生日與

人參 茯苓 甘草 升麻 各一分

右水煎時時與之臨時冷加白朮熱加芒消

甘草湯 千金 兒洗浴斷臍竟褊抱畢以甘草如手中指一節許

打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計

取一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胃中惡汁也

朱蜜法 千金

飲甘草湯不吐者乃可與之以鎮心神安魂魄也

以飛鍊朱砂如大豆許以蜜一蜎殼和之以綿纏筋頭沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許勿過此則傷兒也

牛黃法 千金

與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽

除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也

以上三法外臺引崔氏醫心方引小

品同

○幼幼張渙形色不實者不宜多服若胎熱或身體黃色

宜多服之

龍膽湯 千金

小兒初出腹面目悉黃而啼閉目聚口撮面口中

乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也宜與之

方出驚癇

紫九千金凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚

盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不

時下則成大疾疾成則難治矣方出諸症

劉氏療小兒初生不喫奶方外臺

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫乳立效

○總微名通關散

治小兒胞熱撮口聖惠

牛黃錢一竹瀝合一

右令勻時時與少許服之此外臺劉氏療小兒喫奶不穩恐作撮口方

柴胡散聖惠治小兒變蒸經時不止挾熱心煩啼叫無歇骨熱

小兒初生

聖惠室藏反

面黃。

柴胡

甘草

人參

玄參

各一兩

龍膽

半兩

麥門冬

一兩半

右水煎。○直指小兒無玄參有防風。

集驗方黃連法

幼幼

凡小兒初生必有惡汁留於胃次若不消

去即胃膈壅塞易生蘊熱驚癇瘡癰皆由此也用好肥黃連

槌碎每少許厚以綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁時一二點

在小兒口內即惡汁自下其後或間以朱蜜與之。○三因小

兒初生未須與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細

末抹兒口中打盡腹中舊屎方可與乳

醫綱引海藏二味水煎灌下名百壽散