

內外傷辯序

僕幼自受難素於易水張元素先生講誦既久稍有
所得中年以來更事頗多諸所診治坦然不惑曾撰
內外傷辯惑論一篇以證世人用藥之悞陵谷變遷
忽成老境神志旣惰懶於語言此論束之高閣十六
年矣崑崙范尊師曲相獎借屢以活人爲言謂此書
果行使天下之人不致夭折是亦仁人君子濟人利
物之事就令著述不已精力衰耗書成而死不愈於
無益而生乎予敬受其言僅力疾就成之雖未爲完
備聊答尊師慈憫之志師宋文正公之後也丁未歲

重九日東垣老人李杲明之題

內外傷辨序

內外傷辨目錄

卷上

辨陰證陽證

辨脉

辨寒熱

辨外感八風之邪

辨手心手背

辨口鼻

辨氣少氣盛

辨頭痛

辨筋骨四肢

辨外傷不惡食

辨渴與不渴

辨勞役之病表虛不作表實治之

辨證與中熱頗相似

卷中

飲食勞倦論

補中益氣湯

立方本指

硃砂安神丸

四時用藥加減法

除風濕羌活湯

通氣防風湯

羌活勝濕湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

暑傷胃氣論

清暑益氣湯

參朮調中湯

升陽散火湯

當歸補血湯

硃砂涼膈丸

黃連清膈丸

門冬清肺飲

人參清鎮丸

皂角化痰丸

白朮和胃丸

肺之脾胃虛方

升陽益胃湯

雙和散

寬中進食丸

厚朴溫中湯

腎之脾胃虛方

沈香溫胃丸

神聖復氣湯

卷下

辨內傷飲食用藥所宜所禁

易張先生枳朮丸

橘皮枳朮丸

麴蘖枳朮丸

木香枳朮丸

木香化滯湯

半夏枳朮丸

丁香爛飯丸

草豆蔻丸

三黃枳實丸

除濕益氣丸

上二黃丸

枳實導滯丸

枳實梔子八黃湯

白朮丸

木香見睨丸

三稜消積丸

備急大黃丸

神應丸

益胃散

飲食自倍腸胃乃傷分而治之

論酒客病

葛花解酲湯

除濕散

五苓散

臨病制方

隨時用藥

吐法宜用辨上部有脉下部無脉

瓜蒂散

重明木鬱則達之之理

說病形有餘不足當補當瀉之理

內外傷辨卷上

東垣

李杲

撰

新安

吳勉學

校

辯陰證陽證

曰甚哉陰陽之證不可不詳也徧觀內經中所說變化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣榮氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五臟之氣已絕於外者

是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是
五臟六腑真氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故
榮衛失守諸病生焉其中變化皆由中氣不足乃能
生發耳後有脾胃以受勞役之疾飲食又復失節耽
病日久事息心安飽食太甚病乃大作槩其外傷風
寒六淫客邪皆有餘之病當瀉不當補飲食失節中
氣不足之病當補不當瀉舉世醫者皆以飲食失節
勞役所傷中氣不足當補之證認作外感風寒有餘
客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外絕其死只在旬
日之間所謂差之毫釐繆以千里可不詳辯乎按陰

陽應象論云天之邪氣感則害人五臟是八益之邪
乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨蓋有
形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者地之
氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎主
骨故風邪感則筋骨疼痛筋骨之絕則腎肝之本亦
絕矣乃有餘之證也又云水穀之寒熱感則害人六
腑是七損之病乃內傷飲食也黃帝鍼經解云適飲
食不節勞役所傷濕從下受之謂脾胃之氣不足而
反下行極則衝脉之火逆而上是無形質之元氣受
病也繫在上焦心肺是也心肺者天之氣故難經解

云心肺之氣已絕於外以其心主榮肺主衛榮者血也脉者血之府神之所居也衛者元氣七神之別名衛護周身在於皮毛之間也肺絕則皮毛先絕神無所依故內傷飲食則亦惡風寒是榮衛失守皮膚間無陽以滋養不能任風寒也皮毛之絕則心肺之本亦絕矣蓋胃氣不升元氣不生無滋養心肺乃不足之證也計受病之人飲食失節勞役所傷因而飽食內傷者極多外傷者間而有之世俗不知往往將元氣不足之證便作外傷風寒表實之證而反瀉心肺是重絕其表也安得不死乎古人所謂實實虛虛醫

殺之耳若曰不然請以衆人之耳聞目見者證之向者壬辰改元京師戒嚴迨三月下旬受敵者凡半月解圍之後都人之不受病者萬無一二旣病而死者繼踵而不絕都門十有二所每日各門所送多者二千少者不下一千似此者幾三月此百萬人豈俱感風寒外傷者耶大抵人在圍城中飲食不節乃勞役所傷不待言而知由其朝饑暮飽起居不時寒溫失所動經三兩月冒氣虧之久矣一旦飽食太過感而傷人而又調治失宜其死也無疑矣非惟大梁爲然遠在真祐興定間如東平如太原如鳳翔解圍之後

病傷而死無不然者余在大梁凡所親見有表發者
有以巴豆推之者有以承氣湯下之者俄而變結胸
發黃又以陷胃湯丸及茵陳湯下之無不死者蓋初
非傷寒以調治差悞變而似真傷寒之證皆藥之罪
也往者不可追來者猶可及輒以平生已試之効著
內外傷辯論一篇推明前哲之餘論歷舉近世之變
故庶幾同志者審其或中觸類而長之免後人之橫
天耳僭易之罪將何所逃乎

辯脉

古人以脉上辯內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣

口爲外傷氣口脉大於人迎爲內傷此辯固是但其說有所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役不節皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉丁與壬合內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在

肺陽脉浮。臟陰
沉隱而不見。謂
胃脉也。內顯脾脉。
沉候也。

少陰則兩倍。太陰則三倍。此內傷飲食之脉。若飲食
不節。勞役過甚。則心脉變見於氣口。是心火刑肺。其
肝木挾心火之勢。亦來薄肺。經云。侮所不勝。寡於畏
者是也。故氣口脉急大而澀。數時一代而澀也。澀者
肺之本脉代者。元氣不相接。脾胃不及之脉。洪大而
數者。心脉刑肺也。急者。肝木挾心火而反尅肺金也。
若不甚勞役。惟右關脾脉大而數。謂獨大於五脉。數
中顯緩時一代也。如飲食不節。寒溫失所。則先右關
胃脉損弱甚。則隱而不見。惟內顯脾脉之大數。微緩
時一代也。宿食不消。則獨右關脉沈而滑。經云。脉滑

者有宿食也以此辯之豈不明白易見乎但恐山野間卒無醫者何以診候故復說病證以辯之

辯寒熱

外傷寒邪之證與飲食失節勞役形質之病及內傷飲食俱有寒熱舉世盡將內傷飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪表實有餘之證反瀉其表枉死者豈勝言哉皆由不別其寒熱耳今細爲分解之外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又爲之拂拂發熱發於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也是寒邪犯高之高者也皮膚毛腠者陽之分也是