

名方類證醫書大全卷十九

癰疽瘡瘍

凡瘡之痛痒自屬虛實寒熱故痛而實者為熱虛而痒者為寒
經云諸瘡痛癢皆主於心以心主血而行氣氣血凝滯而為瘡
直瘡癰闊大一寸已上曰癰疽一寸以下曰瘡癰諸瘡之中惟
背疽丁瘡最為急證其初發也使身體或先熱而後惡寒或先
癢而後痛若其不痛最為惡證且如背疽始生如黍粟粒大總
有黃時便用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至痛使毒氣
隨火而散若失之於初瘡勢已成又當審其虛實寒熱熱實則
清之虛寒則溫之後毒消膿潰方為可治之證丁瘡者必發於
手足之間生黃泡其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之

際急宜以針於紅線所至之處刺出毒血然後以蟾酥乳膏膏
等於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹
攻心必致危困至若瘰癧頸疽脉癰之類皆毒氣鬱積於內發
而為此治之皆須解毒潰膿若氣血弱者又須生之此一定之
法瘡癰疥癬之類隨其臟腑所受冷熱調之所貴氣血宣流自
失其痛痒矣如脚外廉瘡久年不愈者多是腎水流注又有脾
水潰溢治各有方隨證選擇

初發 一 **忍冬酒** 治癰疽發背不問疽發何處一切癰腫及
婦人乳癰皆有奇効

忍冬藤生取一把以葉入沙盆內爛研入餅子酒少許生餅
酒尤佳調和稀稠得所塗付四圍中心大留一口洩其毒氣
其藤只用五兩 用水搥微打損不犯鉄器

右二味入砂瓶內以水二椀文武火慢煎至一椀入無灰酒

一大椀再煎十沸去滓分三服一日一夜喫尽如病勢重更進一服如無生者可用乾者但力輕耳

(一) 車螯治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等皆宜宜毒利下熱退為度

紫背車螯 一以鹽泥固濟火煨紅地上出火毒輕粉

甘草 各二大黃 五小黃芩 漏芦 瓜根 各半兩

右為末每二小薄荷湯或酒下

(三) 五寶湯治一切積熱結核癰癰癰疽瘡癰

沉香 不見火連翹 去蒂射干 桑寄生 升麻 以丁香 去枝煨

獨活 羌活 木通 去節升麻 大黃 蒸各三分甘草 生一分

乳香 研一分麝香 一分半研舶上青木香 不見火一分

右以咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利下惡毒為度本方有竹瀝芒硝隨熱輕重當自添減

〔四〕治一切癰疽瘡癤腫毒因氣滯血熱而生者

赤芍藥 白芷 當歸 川芎 大黃

甘草 生乾地黃 苡苳 黃芩各等分

右咬咀每服四錢水二盞酒一盞煎至兩盞去滓熱服藥治

婦人乳癰等瘡

〔五〕治氣体虛弱之人患

背瘡頸疽不知痛痒瘡勢不依急宜服此以生血潰膿有熱者

不可服

〔六〕治癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫者

漏蘆 黃芩 白及 麻黃去節各二兩 大黃三兩

白欬 升麻 枳殼去白 芍藥 粉草炙各二兩

右咬咀每服四升水一盞煎七分空心熱服本方有芒硝今

去之若見熱而實者加大黃五兩或加芒硝皆可



(七) 宣熱拔毒大便秘者方可用此

大黃剉如豆大每服三錢水煮服即快利

追毒(八)

追毒(八) 專治癰疽發背附骨疽諸般惡漏等瘡

雄黃 一各

金頭蜈蚣 七個 頭尾脚足黃黃色研如泥

乳香

別研一各

烏金石

即石炭袁州萍鄉縣有之二各

沒藥

別研一各

鯉魚膽

七個 乾者用之去皮臘月者尤佳

蟾酥

二各

狗膽

一個 乾者用之去皮純黑狗膽月者尤佳

硃砂

一各

狗寶

一兩 生用癰狗腹中得之

輕粉

一各

麝香

一各

黃蠟

三各

粉霜

一各 別研

鉛白霜

一各

頭首孩兒乳

一合

右先將頭首兒乳黃臘放在鉢內文武火化開用前藥末和成劑要用旋面如麻子大每服二圓至五圓用白丁香七箇直者以新汲水化開送下狗寶圓腰以下病食前服腰以上

食後服如人行五里用熱葱白粥投之即以衣被蓋定汗出
為度已後只喫白粥常服十奇散留頭與四邊以烏龍膏貼
九 **追毒膏** 治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶圓次貼
以烏龍膏收腫散毒去毒量然後用針刀開瘡納追毒丹使之
潰然後去敗肉排膿隨證治之

巴豆

七粒去皮心腹不去油研如泥

白丁香 一多

雄黃

黃丹

各二多

輕粉

一多

加塔酥丸神速

右研和加白麪二三滴水為圓如麥狀針破瘡納之上覆以
乳香膏追出膿血毒物滿瘡四壁死肌不去不可治者亦以
此法追毒去死肌生新肉疾小者用一粒大者加用之

十

追毒膏 治癰疽發背一切惡瘡服此毒氣不內攻

麻油半斤銀器內煎十沸出候冷用無灰酒兩掬侵油內重
湯溫稍熱通口急服一日尽之為妙

十一 治癰疽發背及魚臍瘡人多不識治諸風

癰瘻赤腫卅癰能解一切毒被狐狸毒鼠毒惡菌河純毒食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡虫所傷

五倍子 三兩 山慈蔞 二兩 續隨子 去壳研去他取霜一兩

大戟 一兩半 射香 三錢

右除射香續隨霜外為末却入二味研勻用糯米煮濃飲為丸分作四十粒每一粒研生薑薄荷汁并花水研服合時宜用端午七夕重陽日合或遇天德月德日尤佳要在淨室焚香至誠端製毋令婦人雞犬孝子不具足人見之乃衛生之寶也

止痛 乳香 治發背癰疽一切瘡癰爛潰痛不可忍者

當歸 川芎 桂 白芷

真桑豆粉 羌活 獨活 五靈脂 各五錢

乳香 沒藥 各三錢 白膠香 五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸薄荷湯嚥下手足諸般
損痛不能起者加草烏五錢用木瓜鹽湯下

(十二) 追膿血消惡毒

木鱉子去殼當歸各一兩柳枝七八寸寸剉之

以上以清油四兩慢火煎令黑色次用

乳香沒藥各半兩白膠香明淨者四兩共研細入油

煎化以綿濾之

右再治淨鐵鈹又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以
兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起住攪直待注
在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出
火毒搜成劑收之遇用貼開

(十四) 治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人

嘔吐應干毒瘡並皆治之



藁豆粉 四兩 乳香 好者二兩

右同研極細每服二錢新汲水濃調食後服

〔未潰〕十五 瘡腫毒 專用塗諸瘡疽

川烏 蚌粉 草烏 海金沙 赤小豆 天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

〔十六〕 疥癩 治一切瘡癤癰毒已破未破悉皆治之

地蜈蚣 赤芍藥 當歸 甘草 各等分

右為末每服二升溫酒調下不拘時

〔十七〕 復元通氣散 治諸氣逆耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛

消腫

青皮 陳皮 各四兩 川山甲 炮 括萎根 各三兩

加金銀花 連翹 各一兩 甘草 三兩 生熟 各半

右為細末熱酒調下

(十八)

治發背惡瘡

懸萎 一个大黃 一兩當歸 五錢金銀花 一兩皂角刺 一兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子

(十九)

治一切癰疽瘡癤未成者自然消之

已成者能令速潰凡瘡痒者多是血虛此藥最能消風生血

人參

去芦

黃耆

當歸

洗焙各

厚朴

姜製

甘草

生用

桂心

不見

桔梗

去芦

川芎

防風

去芦

白芷

各一兩

右同為末每服三錢熱酒調下

不飲者木香湯調服

(二十)

治發背瘡潰後因飲食有傷發熱不止

漏芦

連翹

梔子

黃芩

防風

石韋

無以刺白皮代

白茯苓

生甘草

升麻

人參

各二錢

黃耆

二兩

為粗末每服四大匙水一椀煎六分去滓溫服

三十一 黃芩六分湯離疽已潰大渴不止

綿黃芪

六兩鹽水潤濕飯上蒸三次焙乾剉

粉草一兩用半生半炙

右為末每一錢白湯下當湯水服

三十二 治証同上 方見虛勞門

通治 二十三 酒用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調二

錢澄清服以滓傳患處治一切癰疽發背癰毒惡候

三十四 治發背已潰未潰者最有神效及一切癰疽

厚朴

二兩姜陳皮二兩

去白蒼朮五兩

甘草二兩炙

右入桑黃五兩同為末瘡潰則乾摻之未潰則油調塗之

三十五 治發背腦疽一切惡瘡

甘草

半兩為

沒藥一分研

大芫荽一枚去皮

右用無灰酒三升熬至一升放溫頓服如一服不盡作三次

三十六 治諸瘡腫發背癰疽

乾柝木葉 乾荷葉 乾萱草根 甘草 地榆 各一兩

右剉每服五升水煎服未成者自消已成膿者自乾

三十七 治一切癰疽服至一兩已上無不効辟毒止痛

生肌末潰已潰皆可服

白礬 一兩 黃蠟 半兩

和九梧子大每服十九丸漸加至二十九丸白湯或酒下

洗之 治一切癰疽腫壞消毒氣去惡肉凡瘡有

口便要以此湯洗

白芷 生甘草 羌活 露蜂房

黃芩 赤芍 當歸 各等分

右用猪前蹄兩隻一斤水煮汁湯以湯煎此藥去滓以湯溫洗

二十九 治諸癰瘡

越桃 一名梅子 黃芩 甘草 當歸 羌活 白芷 各等分

右吹咀每用一兩水五椀煎至四椀去查溫洗

三十 治癰疽腫毒以黃蜀葵花用鹽摻收入磁器密封經年不壞每用患處傳之若無花葉皆可

三十一 治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不移時自透累有效驗

蛾口蠶用出子蛾兒蠶兒

右將蠶兒一個燒灰用酒調服即透切不可兩個三個蠶兒燒服若服一個只一個瘡口若服兩個三個即兩個三個瘡口切勿輕忽

傳貼 三十二 治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子 半夏 各一兩 水粉 四兩 草烏 半兩

右於鐵銚內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傳瘡

黃栢

川山甲 炒焦各一兩

攪却

木香

各半兩 雞肚至七枚生用焙

右為末每用少許候大膿出盡方可搽瘡口上

(三十四)

神效膏

治癰疽壞爛及諸瘡口不合

雄黃

一兩

滑石

煨半兩

右為末洗右搽瘡上以綿子覆護凡洗後破爛者用此貼之

(乳癰)

(三十五)

瓜萎散

瓜萎仁三錢酒搗爛入乳香末一錢熱酒調服熱甚者加石

膏末少許

(三十六)

曼刺子

治乳初發癰時便服即散

曼刺子一味以酒搗爛去滓溫酒熱服以滓封傳患處

(心癰)

(三十七)

治心癰作寒熱口乾飲水渾身痛腹內作熱頭面

赤先以

白蜜散

次服

乳香散

云香連翹散

已潰者多服

內補

方並見前

前之前按根於既愈之後大能順氣均血先服此使氣血和暢然後隨治疾無不安

何首烏 當歸 木通 赤芍 白芷

茴香 土烏藥 枳殼 甘草 各等分

每服四錢水酒相半煎病在上食後服病在下食前服熱多者水多酒少冷多者酒多水少煎 治証詳見外科精要補遺

腎囊癰 三十九治腎虛嗜慾過度外挾寒邪發為癰腫不可施以

涼劑宜入藥酒中煎服之兼用葱白橘葉椒葉酒湯淋洗

仍以酒蒸貼之方並見前

肺癰 四十一治男子婦人嗽而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥

煩悶多渴時出濁唾腥臭小便赤大便秘是曰肺癰當先投



四服虛者先投
方並咳喘門

四十一

治肺癰吐膿

薏苡仁

瓜蒌仁

桃仁各等分

右判每四錢先以葦葉一握水二錢煎取一半去滓入藥煎
煎七分食後服 一方不用葦葉用側柏

陽癰

四十二治腸癰壯熱微汗氣急小腹痛大便澀已成未成

皆可用

當歸

一兩

甜瓜子

一合 蛇退皮一尺

四十三

治腸癰未成膿腹中痛不可忍

木香

牡丹皮

敗醬

甜瓜子

赤芍

桃仁

芒消

大黃

率分每四水煎服

癰毒三四便毒之證皆因內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫

結疼痛初發用何首烏散數服次四青連服之後

用雄黃乳香黃柏等分為末水調傳之自平方並見前

偏癰四五俗名魯氣又謂瘡癰初作未作之時以天門冬去

皮心半水半酒煎熱服即愈

治偏癰便毒初發以生姜一大塊米醋一合以姜蘸磨

取下步峰泥敷腫處即消上步峰即人掌行步

丁毒四十六治魚臍丁瘡

絲瓜葉即虞判葉

連鬚葱

韭菜

右入石鉢內搗爛如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手

貼左腋下右手貼右腋下在左腳貼左膝右腳貼右膝如在

中則貼心臍並用布帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安