

喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹痛者唇色必淡不嗜飲食今其若此得非虫乎遂投以阿魏積塊丸服之果下虫數十大者二一紅一黑長尺餘虫身紅線自首貫尾虫腹中復有虫大者數條小者亦三四條虫下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

鍼灸法

脾俞

治脹隨年壯灸之

肝俞

治脹灸百壯

三焦俞

治心腹脹滿飲食減少小便不利羸瘦少氣

分水

治腹脹遠臍結痛不能食若是水病尤宜灸之

神關

主水腫膨脹腸鳴
如水之聲極效

石門

主水腫水行皮中小便黃

足三里

主水腫腹脹

水溝

主一切水腫

按水腫證惟得鍼水溝若鍼餘穴水盡卽死此明堂銅人所
戒也庸醫多爲人鍼分水誤人多矣若其他穴或有因鍼得
瘥者特幸焉耳大抵水腫禁鍼不可爲法

腫脹論列方

廓清飲

新和十三

四苓散

和一八七

四君子湯

補一

神香散

新和二十

平胃散

和十七

五苓散

和一八二

五君子煎 新熱六

胃苓湯 和百九十

二陳湯 和一

六君子湯 補五

五淋散 寒百十七

五皮散 和六八

正柴胡飲 新散六

參蘓飲 散三四

排氣飲 新和六

小柴胡湯 散十九

理中湯 熱一

理陰煎 新熱三

大和中飲 新和七

歸脾湯 補三三

溫胃飲 新熱五

小和中飲 新和八

解肝煎 新和十一

實脾散 熱百五

嚴氏實脾散 熱百六

六味湯 補一二二

八味湯 補一二二

金匱腎氣湯 補一二六

四磨飲 和五二

流氣飲 和四六

金水六君煎 新和一

敗毒散 散三六

疏鑿飲 和五三

加減一陰煎 新補九

白虎湯 寒二

十棗湯 攻二八

葛根葱白湯 散三二

禹功散 攻四一

瀋川散 攻四二

導水茯苓湯 和六二

神祐丸 攻四八

導水丸 攻七一

芍藥清肝散 寒六一

舟車丸 攻七十

赤金豆 新攻二

龍胆瀉肝湯 寒六三

大柴胡湯 攻七

百順丸 新攻六

大承氣湯 攻一

論外備用方

三和湯 和六十
脾濕腫

健脾散 和六三
和中快氣

參朮健脾湯 和六四
補脾行滯

當歸散 和六五
水氣腫

四磨飲 和五二
行氣

麻黃附子甘艸湯 散五
風濕

百合湯 熱一三五
腫喘

越脾湯 散八九
風水悉腫

麻黃甘艸湯 散六水腫取汗

調胃白朮散 和二三和胃

蘓子降氣湯 和四一順氣

人參養胃湯 和二三四和胃

調氣平胃散 和十八

七氣湯 和五一積脹

半夏丁香丸 和百十三氣滯

厚朴湯 和五四氣滯

麴蘗枳朮丸 和八一食腫

香砂枳朮丸 和八十氣脹

木香寬中散 和五五行氣

沉香琥珀丸 和六九利便

消導寬中湯 和五八食氣滯

人參木香散 和五七利水

養胃進食丸 和八九健脾

化滯調中湯 和五九食滯

導水茯苓湯 和六二利水

導滯通經湯 和六一脾濕

木香分氣飲和五六氣濕

當歸活血散和六六瘀血

檳榔煎和二三六瘴氣

大正氣散和二四寬濕中滿

溫胃湯熱十二胃寒中滿

養胃湯熱七十虛寒滯

厚朴丸熱一六一寒滯中滿

腹脹方熱百七

紅丸子熱一九一消食脹

胡椒理中湯熱六虛寒

強中湯熱九三生冷傷脾

復元丹熱百三寒滯

沉香桂附丸熱百十二中寒

感應丸攻五四積聚脹痛

透膈湯攻三十逐滯消脹

厚朴溫中湯熱九一寒滯

枳實導滯丸攻五七清火攻滯

全書卷三十一
腫脹

卷之三

雜錄

三

好

景岳全書卷之二十三心集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

積聚

經義

百病始生篇岐伯曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然遇疾風暴雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人此必因虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形是故虛邪之中人也雷

而不去傳舍於腸胃之外募原之間畱着於脉稽畱而不土
息而成積或著孫脉或著絡脉或著經脉或著輸脉或著於
伏衝之脉或著於膈筋或著於腸胃之募原上達於緩筋邪
氣淫泆不可勝論○其著孫絡之脉而成積者其積往來上
下臂手孫絡之居也浮而緩不能句積而止之故往來移行
腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則臍脹滿雷引故時
切痛○其著於陽明之經則挾臍而居飽食則益大饑則益
小○其著於緩筋也似陽明之積飽食則痛饑則安○其著
於腸胃之募原也痛而外連於緩筋飽食則安饑則痛○其

著於伏衝之脉者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如
湯沃之狀○其著於脊筋在腸後者饑則積見飽則積不見
按之不得○其著於輸之脉者閉塞不通津液不下孔竅乾
壅○帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒
乃生厥乃成積也○帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足悒
足悒生脛寒脛寒則血脉凝滯血脉凝滯則寒氣上入於腸
胃入於腸胃則臍脹臍脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以
成積○卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷
陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢

則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣○卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液瀦滲著而不去而積皆成矣

奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是爲何病岐伯曰病名息積此不妨於食不可灸刺積爲導引服藥藥不能獨治也

邪氣臟腑病形篇曰心脉微緩爲伏梁在心下○肝脉微急爲肥氣在脇下若覆杯○腎脉微急爲奔豚

五臟生成論曰赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於
食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之○白脉之至
也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛各曰肺痺寒
熱得之醉而使內也○青脉之至也長而左右彈有積氣在
心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同法○黃脉之至也大
而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使
四支汗出當風○黑脉之至也上堅而大有積氣在小腹與
陰名曰腎痺得之沐浴清水而臥

平人氣象論曰寸口脉沉而橫曰脇下有積腹中有橫積痛○

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脉宗氣也結而橫有積矣

大奇論曰腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆爲瘕三陽急爲瘕

刺熱篇曰類下迎顴爲大瘕

氣厥論曰小腸移熱於大腸爲虛瘕

骨空論曰任脉爲病女子帶下瘕聚

衛氣篇曰新積痛可移者易已也積不痛難已也

腹中論帝曰病有少腹盛上下左右皆有根此爲何病可治不

岐伯曰病名伏梁裏大膿血居腸胃之外不可治治之每切
按之致死帝曰何以然岐伯曰此下則因陰必下膿血上則
迫胃脘生膈俠胃脘內癰此久病也難治居齊上爲逆居齊
下爲從勿動亟奪○帝曰人有身體髀股胣皆腫環齊而痛
是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大脹而著
於盲盲之原在齊下故環齊而痛也不可動之動之爲水溺
瀦之病

六元正紀大帝曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無
殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

論證 共四條

積聚之病凡飲食血氣風寒之屬皆能致之但曰積曰聚當詳辨也蓋積者積壘之謂由漸而茂者也聚者聚散之謂作止不常者也由此言之是堅韌不移者本有形也故有形者曰積或聚或散者本無形也故無形者曰聚諸有形者或以飲食之滯或以膿血之畱凡汁沫凝聚旋成癥塊者皆積之類其病多在血分血有形而靜也諸無形者或脹或不脹或痛或不痛凡隨觸隨發時來時往者皆聚之類其病多在氣分氣無形而動也故難經以積爲陰氣聚爲陽氣其義卽此凡

無形之聚其散易有形之積其破難臨此證者但當辨其有形無形在氣在血而治積治聚自可得其梗槩矣

一飲食之積凡暫積者不過以飲食偶傷必在腸胃之內故可行可逐治無難也惟飲食無節以漸畱滯者多成痞積於左脇膈膜之外蓋以胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣此陽明宗氣所出之道也若饑飽無論飲食疊進以致陽明胃氣一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故餘滯未消乃并腸外汁沫搏聚不散漸成癥積矣然其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而藥餌難及今西此小