

治法彙五卷

肝江

張三錫

纂

金壇

王肯堂

校

脹滿

有寒有熱有氣滯有氣虛有血虛俱屬脾

寒初起脉沉伏或食寒涼傷脾而脹屬寒平胃

理中湯辛以散之

熱脉弦數膏粱酒色傷中濕熱鬱于中而脹者

屬熱小便必短數苓連梔子滑石苦以洩之大

便秘而脉數有力者遇僊丹或茵陳梔子大黃湯以通大便

氣虛脉緩弱無力或氣口大四倍于人迎食少倦怠朝急暮寬屬中氣虛補中益氣湯加厚朴氣不運加木香不能食者先用六君子湯

血虛脉弦數或濇黑瘦口乾二便阻澀暮急朝寬屬血虛四物加二冬蘇子紅花桃仁泥以生血潤燥有火加薑製黃連大便秘用搜風順氣

丸一二服

氣滯脉沉結、或伏、或弦、晝夜不減、頻歎氣、屬氣滯、因暴怒、或抑鬱而成、用木香、流氣飲、或七氣湯、增減、

三錫曰、脹滿、悉屬脾虛、運化不及、濁氣填塞、所致、初起、微佐以消化、舒鬱爲先、勢盛而二便澀滯者、微利之、弱人或稍久、一切病後、瘡疽後、產後、必參朮、芪、芍、大補脾氣爲主、而佐以消化、厚朴、木香、黃連、三類然、王道無近功、必數十服、以漸取效、常見用商陸、牽牛等行水法、一瀉卽消、

三日後復起而死者比比皆是良由病家不明
理醫者求速效天人天年悲哉歷考古今明醫
無踰于丹溪東垣薛新甫王損菴矣豈肯曠日
持久而不知尅伐之功速耶其如中氣何可與
高明言難與俗人道爾

肥白人腹脹多是濕痰二木二陳平胃五苓加
減瘦人腹脹是熱用炒黃連厚朴白芍香附

灰血有口嗜煎燂及熱酒物致血蓄于中而脹
者大便必見黑物抵當湯丸下之不若桃仁承

氣湯加紅花蘇木韭汁佳

宿食如氣口緊滑惡心飽悶而脹者是食積口

乾內熱者木香檳榔丸或枳實導滯丸下之

初起挾寒食而脈弦者木香厚朴丁香砂仁神

麴香附

內有濕熱外被寒鬱而脹者用藿香麻黃升麻
葛根桂枝亦表散之

怒則氣逆兩脇脹滿兩手脈弦青陳皮木香梔

子仁蘆薈甚者當歸蘆薈丸

厚味太過脾傷運化不及而脹者二朮二陳加薑製黃連薑製厚朴蘿藦子或保和丸

因食肉過多而脹者山楂枳朮香附半夏麴有火加炒芩連

脹而喘喘則必生脹脹則必生喘二者相因之病脾不運而濁火上炎肺不得清則喘肺氣被鬱喘而不得下降則脹治分新久虛實初起脉實者二陳蘇子葶藶洩之二便通暢喘脹俱減其功易

久病中氣弱、食少多鬱悒、人必用參朮補中藥、
佐黃芩、麥冬、以清肺、其效難、醫者不可因其難
而妄攻下也、

丹溪曰、痺腹脹、乃脾虛之甚、必用大劑參朮、佐
陳皮、曰、茯苓、朮、厚朴之類、或曰、腹已脹矣、反用
參朮、何耶、曰、乃內經塞、因塞用之法、正氣虛而
不能運行、濁氣滯塞于中、今扶助正氣、使之自
然、健運邪、無所留、而脹消矣、

素問曰、下氣虛、乏中焦氣、壅欲散滿、則恐虛、其

下欲補下則滿甚于中、况少服則資壅、多服則
宣通、遂乃峻補其下、以疏啓其中、則中滿自消
下虛自實、乃塞因塞用也、如下痢日百度、反用
大黃通利、乃因通而用通、故曰塞因塞用、通因
通用、且參朮之性、少用則滋壅于上、多服則峻
補于下、又曰中滿者、必須峻補其下、以疏啓其
中、然氣旣得峻補、則上行而啓其中、焦運行之
令、使之疏通、乃軒岐奧旨、世多不解、因吐者而
發明之、

補脾藥必佐薑製厚朴以其溫能益氣辛能寬
脹也

王損菴曰每見俗工不明其道專守下之則脹
已者一法耳雖得少寬一二日然真氣未免因
瀉而下脫而邪氣既不降必復聚成脹遂致不
救可勝嘆哉因書一二證以驗之嘉定沈氏子
年十八患胸腹身面俱脹滿醫治半月不效診
其脉六部皆不出也於是用紫蘇桔梗之類煎
服一盞胸有微汗再服則身盡汗其六部和平

之脉皆出，一二日其證悉平。又一男子，三十餘
胸腹脹大，發煩躁渴，面赤，不得卧，而足冷。予以
其人素飲酒，必酒後入內，奪於所用，精氣溢下，
邪氣因從其上逆，逆則陰氣在上，故爲臍脹。其
上焦之陽，因下逆之邪所迫，壅塞於上，故發煩
躁。此因邪從下而上盛於上者也。於是用萸棗
黃附子、人參輩，以退陰逆。水冷飲之，以解上焦
之浮熱。入咽覺胸中頓爽，少時腹中氣喘如牛
吼，泄氣五七次，明日其證愈矣。風寒暑濕脹。

藿香正氣散

七情脹五膈寬中散木香流氣

飲沉香降氣湯

或飲食所傷脾胃虛弱以致

水穀聚而不化此寒濕鬱遏而脹香砂調中湯

大怒而脹分心氣飲憂思過度而脹紫蘇

了湯濕熱內甚心腹脹滿小便不利大便滑

泄及水腫大橘皮湯失饑傷飽痞悶停酸早

食暮不食名穀脹大異香散鷄矢醴治心腹

脹滿旦食不能暮食由脾元虛弱不能剋制於

水水氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣

不宣流上下痞塞故令人中滿旦陽氣方長穀
氣易消故能食暮陰氣方進穀不得化故不能
食其脉沉實滑病名穀脹用鷄矢白半升以好
酒一斗漬七日每服一盞食後臨臥溫服脾土
受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有
聲怔忡喘息名水脹大半夏湯煩躁水迷
忘驚狂痛悶喘惡虛汗厥逆小便多大便血名
血脹人參芎歸湯有因積聚相攻或瘀或脹
者初用七氣消聚散日久元氣虛脾胃弱而脹

者、參朮健脾湯、少佐消導藥、瘀蓄成血而脹、

腹皮上見青紫筋、小水反利、脉乳澀、婦人多有

此疾、先以桃仁承氣湯、勢重者、抵當湯、如虛人

不可下者、且以當歸活血散調治、勞倦所傷、

脾胃不能運化而脹者、補中益氣湯、加減法見

勞倦門、大病後飲食失調、脾胃受傷、運化且

難而生脹者、先以化滯調中湯、次以參苓白朮

散、瀉利後、并過服通利藥、以致脾胃太弱而脹、

專以補脾爲主、若瀉痢未止、間用胃風湯、喘

滿不得臥、虛則人參生脉散之類、實者葶藶湯
之類、胸膈滿脹、一身面目盡浮、鼻塞欬逆、清
涕流出、當用小青龍湯二三服、分利其經、却進
消脹藥、經久患泄瀉、晝夜不止、乃氣脫也、宜
用益智子煎濃湯服之、愈、凡腹脹、小腹脹、皆
有腎熱、三焦虛寒、石水、腸癰、女勞疸、
診法曰、脹滿、脉弦、脾制于肝、洪數熱脹、遲弱陰
寒、浮爲虛滿、緊則中實、浮則可治、虛則危急、高
陽生曰、腹脹浮大是出阨、虛小病深、命應促、

平胃理中湯

補中益氣湯

見勞傷門

遇倦丹

茵陳梔子大黃湯

見濕門

六君子湯

見脾胃門

搜風順氣丸

見風門

木香流氣飲

見氣門

抵當湯

見蓄血門

桃仁承氣湯

見蓄血門

當歸龍薈丸

見脇痛門

保和丸

見傷食門

藿香正氣散

五膈寬中散

見反胃門

沉香降氣湯

見氣門

木香流氣飲

見氣門

香砂調中湯

治飲食所傷脾胃嘔吐胸膈噎

噎或胸腹脹痛

藿香

砂仁

各一錢二分

蒼朮

米泔浸二錢

厚朴

薑

陳皮 半夏 茯苓 青皮 枳實各一錢

甘草三分

薑三片水煎食前服

紫蘇子湯 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便

不利脉虛緊瀼

真紫蘇子炒搥碎一錢 大腹皮 草果仁

半夏製 厚朴 木香 陳皮去白 木通

白朮 枳實炒各一錢 人參五分 甘草三分