

醫法青篇

二



醫法青篇

卷之二

燕山琢之陳璞

同著

健菴弟玠

武林門人徐紹熙

較正

傷寒

時氣

瘟疫

中風



虛勞 傳尸 吐血 咳嗽

傷寒症

傷寒症者。內經受傷。外感風寒。乘時而發也。其症有頭痛惡寒。往來寒熱。嘔吐身痛等症。仲景立三百九十七法。一百一十三方。分別陰陽表裏。各經症候。無非示人以規矩準繩。若能精通各經脉法。分別表裏陰陽。虛實寒熱。臟腑氣血。自有變通。則不必拘定成方而用也。蓋傷寒之症。有冬傷於寒。邪氣由肺俞穴而入。伏于華蓋之下。至春又感時氣而發者。乃為春

溫至夏又染夏熱而發。則為夏熱。至秋又染時氣而發。則為秋溫。至冬風寒重感。相際一年而發者。乃真傷寒也。為內經之症。或從太陽而發。相遞傳經。或直中三陰。或為兩感之重症。當依傷寒本條治之。至於春溫。夏熱。秋溫。以及冬令隨感而發者。皆溫疫時氣。另列專條。分別治之。不可雜入傷寒而致淆混。以上數條。既形勢相同。而氣情各別。惟當分辨明白。然後用藥。庶不致有誤矣。



傷寒症伏寒在內故有傳經却無傳染

時氣症有傳染而無傳經若有伏寒亦有傳經畧似

傷寒治法亦同

感冒症隨感而發並無傳染亦不傳經

脉訣符反歌訣

傷寒熱病脉喜浮洪

沉微濇小症反必凶

汗後脉靜身涼自安

汗後脉燥熱甚必難

陽症見陰命必危殆

陰症見陽雖困無害

傷寒脉論

凡脉浮大滑數皆陽脉也。沉細微弱濡遲皆陰脉也。寸口脉浮為在表。沉為在裏。數為在腑。遲為在臟。按浮為表。沉為裏。古今相傳之法。然沉亦表病。此陰實陽虛寒勝者然也。脉浮亦有裏症。此陽實陰虛水虧之故。凡欲察表邪者。只當以緊數與否為辨。蓋寒邪在表。脉緊數。浮洪有力。即為陽症。若浮洪無力。邪在陰分。即陰症。大凡傷寒之脉。不論浮沉遲數。總以有

力無力為辨故曰有力為陽無力為陰
脉有十種陰陽兩分即具五法浮沉是脉體大弱是
脉勢滑濇是脉氣動弦是脉形遲數是脉息大小浮
沉遲數相等雖有寒熱不辨而陰陽和平雖劇當愈

傷寒死脉

寸不至關為陽絕尺不至關為陰絕陰症見陽者生
陽症見陰者死六脉純弦者死六脉俱虛熱不止者
死六脉俱盛大汗出熱不解者死脉沉細手足逆冷

譫語妄言者死。脉症相反。譫妄者死。傷寒六七日。脉微手足厥冷。煩燥。反厥陰不還者死。傷寒下利。日十餘行。脉反實者死。

太陽經

手太陽小腸
足太陽膀胱

太陽之為病。脉浮緊。傷寒無汗。脉浮緩。傷風有汗。頭痛項強。脊強。或身痛。或腰痛。或嘔逆。發熱惡寒。發麻痛。皆太陽經症。頭為諸陽之會。氣病則麻。血病則痛。身熱者。寒客皮毛。鬱閉其陽。而後發熱。蓋傷寒始傷。

于寒而終成于熱。惟不發熱而但寒者。和發于陰也。
或寒多熱少。不大便而清泉。頻數或熱結膀胱而溺
瀦。或汗多便難。或汗後不解。或汗溺不止。或過經不
解。或喘或吐。皆太陽所主。當分別治之。
太陽禁忌。小便不利。不可更利。大便不利。
不可易動。表不解。不可下。不可溫脾胃。
太陽傷寒。傷營。脈浮緊。人迎脈緊。無汗。宜沖和湯。表解。
沖和湯。

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 生地

蒼朮 黃芩 甘草 加蔥薑發汗。

太陽風傷衛。脈浮緩。人迎微緊。有汗。宜防風湯解表。
防風湯。

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 生地

白朮 黃芩 甘草 加薑棗

太陽傷寒有夾虛不能造汗者。仍用冲和湯。加生參
生芪。又有年老陽氣更衰者。用再造散以回陽氣。



再造散

人參炙

黃芪炙

桂枝

附片

羌活

防風

川芎

白芍炒

細辛

甘草

加煨薑大棗煎

太陽經寒多熱。少不大便。清泉頻數者。以沖和湯去

黃芩。生地。加桂枝芍藥干薑。

太陽經汗多便難。宜麻仁湯潤燥。

當歸麻仁湯。

當歸

麻仁

柏子仁

杏仁

桂枝

人參

炙

黃芪^炙

芍藥^炒

炙草

加白蜜一杯引

太陽經熱結膀胱溺澀以冲和湯去蒼朮加茯苓猪

苓澤瀉

太陽經汗後不解宜桂枝黃芪芍藥杏仁甘草湯解之
太陽經汗後汗溺不止者亡陽之症宜加減四逆湯
以救其陽

加減四逆湯

人參^炙

黃芪^炙

桂枝

芍藥

五味子

麥冬

干薑 甘草
大陽經發喘嘔吐此肺胃受邪上焦壅遏阻氣為危
篤之症宜蘇子降氣湯。

蘇子 前胡 枳殼 杏仁 桔梗 橘紅
半夏 沉香 甘草 加竹茹 薑汁引

以上太陽經症如夏秋溫熱感而發者
只以蒼蔥解表不可用麻黃辛熱恐變
症多端若像冬寒太甚蒼蔥不能發汗

表不解者。當遵仲景麻黃湯。大法發汗解之。即麻黃桂枝杏仁甘草也。

陽明症

手陽明大腸
足陽明胃經

陽明之為症。胃家實。舌胎黃黑也。陽明主裏。內候胃中。外候肌肉。故有經病腑病之分。如身熱煩渴。目痛鼻乾。不得卧。不惡寒反惡寒者。此經病也。宜白虎湯。若潮熱譫語。手足腋下。漑漑然汗出。腹滿痛。大便鞭者。此府病也。宜承氣湯下之。或脇滿而嘔者。宜橘皮

半夏湯或瘀血發黃者宜桃仁承氣湯下之。或頭痛惡寒是太陽未解。仍按太陽方藥。摻用升葛湯解表。或下血譫妄亦宜桃仁承氣。或胸煩懣懣宜梔豉湯。以上皆陽明主症。當分別治之。

陽明禁忌。不當發汗。不當利小便。

陽明脉尺寸俱長而微洪。經病長而沉。數府病。以胃家實。舌胎黃黑為陽之剛領。

加味白虎湯。經病。

知母 石膏 花粉 芍藥 桔梗 甘草

加糯米引。

加味小承氣湯。府病。

枳實 厚朴 生軍 生地 赤芍 當歸

加芒硝名大承氣。加甘草去枳朴名調胃承氣。

橘皮半夏湯。脇滿而嘔。

橘皮 半夏 干薑 薑連 枳實 厚朴

甘草

