



證治準繩第二冊

金壇王肯堂輯

諸氣

經云諸病皆因於氣百病皆生於氣怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同也按子和云天也之氣常則安變則病而況人稟天地之氣

侵於外七情交戰於內

行至實害人又勿令人易太

如此

以詮

諸病皆因於氣百病皆生於

氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而爲九怒喜悲恐寒熱驚思勞也蓋怒氣逆甚則嘔血及餐泄故氣逆上矣怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚嘔血及餐泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣逆逆則下焦脹故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣熱則腠理開

榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣嘗考其爲病之詳變化多端如怒氣所至爲嘔血爲餐泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胸滿腸痛食則氣逆而不下爲喘渴煩心爲消痺爲犯氣爲目暴盲耳暴閉筋緩發於外爲癰疽喜氣所至爲笑不休爲毛革焦爲

爲脉痿男爲軟沒血女爲血崩  
爲酸鼻辛頰爲目昏爲少氣不能報息爲泣則  
臂麻恐氣所至爲破脣脫肉爲骨痠痿厥爲暴  
下綠水爲面熱膚急爲陰痿爲懼而脫頤驚氣  
所至爲潮涎爲目眾爲口吐爲癰癟爲不省人  
爲僵仆久則爲瘡痺勞氣所至爲嗌噎病爲喘  
促爲嗽血爲腰痛骨痿爲肺鳴爲高骨壞爲陰  
痿爲唾血爲冥目視爲耳閉男爲少精女爲不  
月衰甚則潰潰乎若壞都汨汨乎不可止思氣

所至爲不眠爲嗜卧爲昏聶爲中痞三焦閉塞  
爲咽嗌不利爲膽癰嘔苦爲筋痿爲白淫爲得  
後與氣快然如衰爲不嗜食寒氣所至爲上下  
所出水液澄徹清冷下利清白云熟氣所至

爲喘嘔吐酸暴注下迫

云

竊又稽之內經治

法但以五行相勝之理互相爲治如怒傷肝肝  
屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太過則肝  
亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺金

亦

入胃而心亦自病悲喜而傷金悲則

并於而所木受邪金太過則肺亦自病恐  
傷腎腎屬水恐則氣并於腎而心火受邪水太  
過則腎亦自病思傷脾脾屬土思則氣并於脾  
而腎水受邪土大過則脾亦自病寒傷形形屬  
陰寒受熱則陽受病寒太過則陰亦自病熱傷  
氣氣屬陽熱勝寒則陰受病熱太過則陽亦自  
病凡此數者更相爲治故悲可以治怒以愴惻  
苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪襄狎之言  
娛之恐可以治喜以追遽死亡之言怖之怒可

以治思以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以  
慮彼志此之言奪之凡此五者必詭詐謫怪無  
所不至然後可以動人耳目易人視聽若胸中  
無才器之人亦不敢用此法也熟可以治寒寒  
可以治熱逸可以治勞習可以治驚經曰驚者  
平之夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則  
不驚矣如丹溪先生治一女子許婚後夫經商  
二年不歸因不食困卧如癡他無所病但向裏  
坐十思想氣結也藥難獨治得喜可解不然

其為

所木怒則木氣升發而衝開脾氣矣

因過思則脾氣結而不食

而病者悲泣後卽愈矣素問曰懼勝喜可謂得玄

因

其為所木怒則木氣升發而衝開脾氣矣因

激之大怒而哭至二時許令解之與藥一貼卽求食矣然其病雖愈必得喜方已乃給以夫回旣而果然病不舉又如子和治一婦人久思而不眠令觸其怒婦果怒是夕因睡捷於影響惟勞而氣耗恐而氣奪者爲難治喜者少病百脉舒和故也又聞莊先生治喜勞之極而病者莊切其脉爲之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣後卽愈矣素問曰懼勝喜可謂得玄

關者也凡此之類內經自有治法庸工廢而不  
行亦已久矣幸河間子和丹溪數先生出而其  
理始明後之學者宜知所從事丹溪云冷氣

滯氣逆氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升  
無降熏蒸清道甚而轉成劇病局方類用辛香  
燥熱之劑以火濟火咎將誰執氣無補法世  
俗之言也以其爲病痞悶壅塞似難於補不思  
正氣虛者不能運行邪滯著而不出所以爲病

曰土有氣行則愈怯者著而成病苟或氣怯

用補法氣何由行 氣屬陽無寒之理 上升

之氣覺惡寒者亢則害承乃制也 氣有餘便

是火冷生氣者局陽生之謬言也自覺冷氣自  
下而上者非真冷也蓋上升之氣自肝而出中  
挾相火自下而上其熱爲甚火極似水陽亢陰

微也

按河間論氣爲陽而主輕微諸所動亂勞傷乃陽火之化神狂氣亂而病熱矣又云

五志過極皆爲火也而其治法獨得言外之意  
凡見喜怒悲恐思之証皆以平心火爲主至於  
勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火  
二者必以平心火爲主俗醫不達此者遂有寒  
涼之謗

氣鬱用香附蒼术撫芎

調氣用木香然

味辛氣能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰  
火衝上而用之則反助火邪矣故必用黃柏知  
母而少用木香佐之 氣從左邊起者肝火也  
氣刺痛皆屬火當降火藥中加枳殼 破滯  
氣用枳殼枳殼能損至高之氣二三服卽止恐  
傷真氣氣實者可服 實熱在內相火上衝有  
如氣滯用知母黃柏芩連 陰虛氣滯用四物  
以補血 因事氣鬱不舒伸而痛者木香調達

憂而痰氣香附五錢瓜蔓一兩貝母山楂

名三錢半夏一兩 禀受素壯而氣刺羸用枳

殼烏藥 因死血而痛者桃仁紅花歸頭

解

五藏結氣益少 陰經血用梔子炒黑爲末入湯  
同煎飲之甚効

河間云婦人性執故氣疾爲

多宜正氣天香湯先導之

戴復菴云七氣致

病雖本一氣而所以爲氣者隨症而變三因方

論最詳喜怒憂思悲恐驚謂之七氣有痰在咽

喉間如綿絮相似咯不出咽不下並宜四七湯

未効進丁沈透膈湯內有熟者不宜審知是思慮過度

宜四七湯去茯苓加半夏人參菖蒲審知是盛怒成疾面色青黃或兩脇脹滿宜調氣散或四七湯加枳殼木香各半錢因驚恐得疾心下怔忡者見驚悸門 脉滑者多血少氣澀者少血

多氣大者血氣俱多小者血氣俱少下手脉沉便知是氣其或沉滑氣兼痰飲 脉弦軟或虛大虛滑微弱飲食不節勞傷過度精神倦怠四肢困乏法當補益補中益氣湯調中益氣湯十

金大補湯夏月清暑益氣湯四君四物之類加

脉結濁或沉弦急疾收斂四肢腹脇腰胯  
間牽引疼痛不能轉側皆由七情鬱滯腫門傷  
損謹察病原隨證疎導三因七氣湯流氣飲子  
大七氣湯蘇子降氣湯化氣散四磨湯大玄胡  
湯選用 脉沉滑氣兼痰飲者二陳湯桔梗半  
夏湯四七湯枳殼烏藥紫蘇大腹皮桑白皮  
類隨證加減

鬱

六元正紀大論曰木鬱達之火鬱發之土鬱蒸  
之金鬱泄之水鬱折之然調其氣過者折之以  
其畏也所謂瀉之 王安道曰木鬱達之五句  
治鬱之法也調其氣一句治鬱之餘法也過者  
折之三句調氣之餘法也夫五法者經雖爲病  
由五運之鬱所致而立然擴而充之則未嘗不  
可也且凡病之起也多由乎鬱鬱者滯而不通  
之義或因所乘而爲鬱或不因所乘而本氣自

皆鬱也豈惟五運之變能使然哉鬱旣非五運之變可拘則達之發之奪之泄之折之之法固可擴焉而充之矣木鬱達之達者通暢之也如肝性急怒氣逆胠脇或脹火時上炎治以苦寒辛散而不愈者則用升發之藥加以厥陰報使而從治之又如久風入中爲餐泄及不因外風之入而清氣在下爲餐泄則以輕揚之劑舉而散之凡此之類皆達之之法也王氏謂吐之令其條達爲木鬱達之東垣謂食塞胸中食爲