

嬰孩癰瘍

眼目

救急

勿藥元詮

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十一上

嬰孩門

正方四十九
附方五

初生拭口法

甘草下胎毒法

豬乳法

襁褓

法乳哺法

乳兒法

哺兒法

雜將護法

柴歸飲

升麻葛根湯

方見表
散門

疏邪飲

柴葛

參蘇

飲

方見表
裏門

惺惺散

透邪煎

麻黃湯

方見表
散門

加

味葛根湯

紅花湯
五味異功散

桔梗湯

羌活透肌湯

透肌

散

紫草化毒湯

搜毒煎

涼血養營煎

甘

桔湯

方見瀉火門

消毒飲

加味如聖散

前胡化斑

湯

活血散

犀角地黃湯

方見理血門

四順清涼飲

黃連解毒湯

方見瀉火門

人參白虎湯

方見瀉火門

七五

散

加味導赤散

辰砂益元散

方見消暑門退火回生散

當

歸黃連湯

保元湯

十味異功散

九味異

功煎

六物煎

六氣煎

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯

方見治氣門

四物湯

方見理血門

當歸活血湯

內托散

八珍湯

方見治氣門

附子理中湯

方見祛寒門

十全大補湯

方見治氣門

止痛活血散

痧證初起方

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人

周蘭九生庭
殷豫龍浩如
同較

成方切用

嬰孩門

小兒之病與大人無異。惟初生保護及痘疹等證。不得不另集方法。以便

施用。世俗所謂驚風。卽四時感冒證也。方中行癰書喻嘉言寓意草中論之最詳。當從傷寒門循經救治。切不可用抱龍丸鎮驚丸等金石藥。鎮墜外邪深入臟腑。爲害不淺。

初生拭口法

嬰兒初生。急以綿裹指拭兒口中

舌上惡血。穢露。調之玉銜。若啼聲一發。卽入腹

成百病

薛氏曰嬰兒初生口含血塊啼聲一出

久熱或飲食停滯或外感風寒發熱等因發爲瘡疹急須於未啼時用軟帛裹指揩去其血雖

出痘亦

輕矣

又看舌下若連舌有膜如石榴子若

啼不出聲不轉速以指爪摘斷之或用葦刀子

割之微有血出卽活若舌下血出多者以亂

髮燒灰同豬脂少許和塗之

聖惠云看齒根有黃筋兩條以葦刀

割斷點豬乳佳如兒口難開先點豬乳

甘草下胎毒法

用粉甘草中指一節拍碎以水

二蜆殼煎一蜆殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出

惡汁為佳若服一蜺殼不吐即不須更服不問

嬰兒虛實寒熱皆須服之心鑑曰古方書言嬰兒始生落草服汞粉

朱砂白蜜黃連牛黃欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾胃敗陽之物若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助養脾氣消化乳食薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口

豬乳法 嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳

滴口中佳豬兒飲母次便提後

襁褓法 千金論云小兒用父故衣女用母故衣

勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癰

皆自此始

巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣煖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若

不見風日則令肌膚脆軟便易損傷嬰兒常

藏在幃幙之內重衣溫煖譬如陰地草木不見

風日軟脆不任風寒嬰兒皆當以故絮著衣

莫用新綿也天氣和煖無風之時令母常抱日

中嬉戲數見風日則令血和氣剛肌肉硬密堪

耐風寒不致疾病又當習薄衣之法當從秋

習之不可於春夏卒減其衣令兒受風寒冬

月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊

綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲害也

又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風

寒晝夜寤寐

皆當戒之

乳哺法

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者妳也

哺者食也。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。
小兒脾胃怯弱。乳食相併。難以尅化。周歲以上
必成乳癖于腹中。作疼作熱。疳病從此起也。溪丹
日。小兒腸胃尚脆而窄。若稠粘乾硬酸鹹甜辣。
一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒。俱是發熱難化。
之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非唯無病。且不
縱口。可以養德。此外生栗味鹹。乾柿性涼。可爲
長陰之助。然栗太補。柿太澀。俱爲難化。亦宜少
與。婦人無知。唯務姑息。畏其啼哭。無所不與。積
成痼疾。雖悔何及。所以富貴驕養。有子多病。迨
至成人。筋骨柔弱。有食則不能忌口。以自養。居
喪則不能食素。以盡禮。小節不謹。大義亦虧。可
不慎與。至于乳母。尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便
通。情慾中動。乳脉便應。病氣到乳。汁必凝滯。兒
得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瀉則熱。或爲口

糜。或爲驚搐。或爲夜啼。或爲腹痛。病之初來。其
溺必少。便須詢問。隨證治母。母安亦安。可消患
於未
形也。

乳兒法

凡乳母氣血爲乳汁也。五情善惡。悉氣

血所生。宜戒喜怒。一切禁忌。不用狐臭。瘦瘦氣。
嗽病者。及身體疥癬。頭瘡。髮少。唇緊。音啞耳聾。
軀鼻癰病等。方可乳兒。夏天盛熱時。乳母浴
後。或兒啼。不可與妳。使兒胃有熱毒。秋成赤白
痢。浴後可令定息良久。乳之可無患也。聶氏
曰。盛啼不可食乳。恐氣逆不順。聚而爲噎。亦能

成疾。千金論曰。凡乳兒不可過飽。飽則溢而
成嘔吐。若乳來多猛。取出按後再乳。切須乳時
合先令捏去宿熱。乳然後乳之。如乳母欲臥寐
當以臂枕之。令乳與兒頭平。母欲睡着時。即奪
其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合之間
兒臥于側。或驚起。不可乳兒。蓋氣亂未定。必能
殺兒也。聖惠方云。醉淫喘乳。能殺小兒。聖濟經
論。乳者。夏不欲熱。熱則致吐逆。冬不欲
寒。寒則致下痢。母不欲怒。怒則令上氣顛狂。母
不欲醉。醉則令身熱腹滿。母方吐下而乳。則致
虛羸。母有積熱而乳。則變黃不能食。新房而乳。則瘦悴交脛不能行。

哺兒法 錢乙云。兒多因愛惜過當。兩三歲猶未

飲食。致脾胃虛弱。平生多病。半年後宜煎陳米

稀粥。時時與之。十月後漸與稠粥爛飲。以助中

氣。自然易養。少病。惟忌生冷油膩甜物等。寶鑑云。兒

五十日可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。三歲未滿。勿食雞肉及子。恐腹内生蟲。

雜將護法 嬰兒百日日任脉生。能反復乳母。當存

節喜怒。適其寒溫。嬰兒半晬。尻骨已成。乳母

當教兒學坐。嬰兒二百日外。掌骨成。乳母教

兒地上匍匐。嬰兒三百日。臛骨成。乳母教兒

獨立。嬰兒周晬。膝骨已成。乳母教兒行步。上件並是定法。世人不能如法。往往抱兒過時。損傷筋骨。切宜戒之。

柴歸飲。治痘疹初起發熱未退。無論是否痘是邪。

疑似之間。均宜用此平和養營之劑。以為先着。

有毒者可托。有邪者可散。實者不致助邪。虛者

不致損氣。

凡陽明實熱邪盛者。宜升麻葛根湯。如無實邪。悉宜用此增減之。小兒

壯熱。呵欠頓悶。時發驚悸。或吐或瀉。手足時冷。面頰頤赤。嗽啞者。為痘證也。呵欠頓悶。肝之證也。

也。時發驚悸。心之證也。或吐或瀉。手足時冷者。脾之證也。煩赤嗽啞。肺之證也。腰痛喜寐。腎之

證也。五臟之證盡顯者其痘必多。但顯一二證者其痘必少。其本總由于淫火之毒也。

當歸錢二三 芍藥或生或炒 錢半 荊芥錢一 炙甘草七分 或一

柴胡錢一二 加薑煎服 血熱者加生地

陰虛者加熟地 氣虛脈弱者加人參 虛寒

者加炮姜肉桂 腹痛者加木香砂仁 嘔惡

者加乾姜陳皮 若治麻疹以乾葛易荊芥

升麻葛根湯 小兒初間發熱壯盛為風寒為痘

疹莫能辨的此方穩當

方見卷三上表散門

表熱壯盛。此邪實于表也。經曰：輕可去實。故用升麻葛根以疏表。甘草佐之，可以和在表之氣。芍藥佐之，可以和在表之營。去其實邪，和其營衛。風寒則解。痘疹則出，誠初間之良劑也。如至四五日，痘中夾疹者，亦此方主之。疹散只依常法治痘。

疎邪飲

治痘疹初起發熱。凡氣血強盛，無藉滋

補者，單宜解邪。此方爲主，以代升麻葛根湯及

蘇葛等方，最爲穩當。

芍藥酒炒柴胡用倍甘草炙蘇葉減荊芥穗半水

煎熱服宜無火者加生姜三片火盛內熱者

加黃芩渴者加乾葛

去蘇葉荊芥加乾葛黃芩連翹名柴葛煎治痘

疹表熱及瘟疫等證

參蘇飲治痘證初起風寒壯熱體重頭痛

壅盛

方見卷五下表裏門

風寒客于外故用紫蘇乾葛以發表痰嗽壅于

內故用半夏前胡桔梗陳皮茯苓以安裏邪去
之後中外必虛人參甘草急固其虛此則表和
而痘易出裏和而氣不虛表裏無失斯良劑矣
惺惺散發熱之初未明是痘形體怯弱者宜之

人參

白朮

甘草

細辛

白茯苓

天花

粉

白芍藥

桔梗

各七分

參苓朮草防其虛也細辛桔梗所以疏其陽花

粉白芍所以和其陰

透邪煎

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云

未出之先。不宜用藥。然解利得宜。則毒必易散。而勢自輕減。欲求妥當。當先用此方為主。

當歸

二錢

芍藥

酒炒一錢

防風

八分

荊芥穗

一錢

升麻

三錢

甘草

炙七分

水煎服

如熱甚脉洪滑者加

柴胡一錢。此外凡有雜證。俱可隨宜加減。

麻黃湯 治痘疹天寒腠密表熱壯盛。

方見卷三上表散門。

解表之藥有三品。辛涼辛溫辛熱也。夏月表氣

易泄。宜用辛涼。春秋表氣平調。宜用辛溫。若天