

升麻和氣飲

一八九

治風癰瘡疥熱結大便不通

當歸

陳皮 各一錢半

枳殼 麸炒

芍藥 酒炒

半夏 製

桔梗 炒

白芷

蒼朮 米泔浸炒

乾葛

白茯苓

甘草 炙各一錢

乾薑 炒

大黃 各五分

升麻 三分

右水煎服

當歸飲 百九十

治風濕血熱癰疹痒痛膿水淋漓瘡疥發熱

等證

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

白蒺藜炒

黃芪

何首烏不見鐵
各錢半 防風

荊芥

甘草各一錢

右水煎服

羌活當歸散

一九一

治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊

或癰疹搔痒膿水淋漓

羌活

當歸

川芎

升麻

防風

白芷

荊芥

鼠粘子蒸

黃連酒炒

黃芩酒炒

連翹

甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散 一九二

治癰疥

防風

荊芥

苦參

地骨皮

薄荷 等分

甘草 減半

右爲末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜九桐子

大每服五七十九食遠茶清送下

烏金散 一九三

敷腎囊破爛下疳等證

麩炭

紫蘇葉

右等分爲末香油調搽用紫蘇葉包裹之

蛇床子散 一九四

治一切風癬疥癩搔痒膿水淋漓

蛇床子

獨活

苦參

防風

荊芥

各三錢

枯礬

銅綠

各一兩二味另爲末

右爲末麻油調搽

金黃散

一九五

敷天泡濕熱等瘡

滑石

粉甘草

此當半用爲足

右等分爲末搽敷○此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙

○嘗以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散

一九六

治諸疳瘡

海螵蛸

三分

白芨

一分

輕粉

一分

右爲末先用漿水洗拭乾傳

滑石散

一九七

治小兒天泡瘡

好滑石

黃柏

右共爲末傳之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者
宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青礬調前二味如泥用
皂刺挑破泡水次敷藥神效

秘方仙遺糧湯

一九八

治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可

取效

土茯苓

卽名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石柏槌碎

用水三碗煎二碗去粗入後藥煎服

當歸

生地

防風

木通

薏仁

各八分

金銀花

黃連

連翹

各一錢

白朮

白蘚皮

各七分

皂刺

六分

甘草

四分

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土草薺湯

一九九

治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰潰爛筋

骨拘攣疼痛皆妙○

用土草薺卽土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐

徐服之○若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以

此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮飲 二百

治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結

毒

當歸

木瓜

生地黃

熟地黃

羌活

薏仁

各一錢

防風

荊芥

赤芍

苦參

大楓藤

各七分

五加皮

二錢

甘草

僵蚕

各五分

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎一碗食前

溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛肉茶酒醋所用

土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散

二百一

一名草薺湯○治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓

五錢或一二兩

當歸

白芷

皂刺

薏仁

各一錢半

木瓜

不犯鐵器

白蘚皮

木通

金銀花

各一錢

甘草

五分

右水煎服○甚者土茯苓用至四五兩更妙

蠲痺消毒散

二百二

治時瘡肢節筋攣

姜黃

土茯苓

獨活

各五錢

白朮

當歸 各一錢半

芍藥 一錢

白芷 五分

右水煎服

七貼方 二百三

治楊梅綿花瘡

防風

忍冬

皂刺

蟬退 去頭足

連翹

白蘚皮

五加皮

荊芥

穿山甲

炒各一錢

生地

木匠

去心忌鐵

殭蚕

炒各一錢半

皂子

七個

薏仁

三錢

土茯苓

四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之○忌牛羊茶酒醋房

事

茯苓膏 二百四

治楊梅瘡並治瘋毒

當歸

白蒺藜

羌活

生地

熟地

甘草

去皮

連翹

木通

各三錢

土茯苓

半斤

右爲粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏晾冷
每服一大酒鍾日三服輕者五六料重者十料全愈熬藥須
用砂鍋○忌房事鷄魚牛肉椒醋等發物

五寶丹

二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀

透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠 炒過三分半 一方用豆腐包蒸

硃砂 透明者三分半

鍾乳石 用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵 炒過三分半

冰片 半分臨時加

右俱爲極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前粗再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內爲一日之用○若病在上者加木香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓

苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時時飲之若飲湯半鍾加五寶丹二釐飲一鍾加四釐體厚者加六七釐一日內服盡此湯爲度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒貼清涼膏或加摻藥收口若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也大忌房事輕者十服重者二七服全愈

醫統

楊梅癰漏方

二百六

不問年深者並效

土茯苓

五兩

金銀花

一兩

皂刺

花椒

牛旁

鬱金

當歸

各五分

黑鉛

三兩

鎔化入水銀五錢乘熱搗爲粉分五分聽臨後

另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從類而出也○此藥每以五貼爲一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風荆芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗自然汗出卽患二三十年者只用此四

料四汗之無不全愈忌牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳
徐春甫得之用以治人一一獲效故詳載之以濟人也

會膿散 二百七

治惡毒便毒初起之妙方也

白芷

殭蚕 炒

川山甲 煨各二錢 大黃 四錢

乳香

沒藥 各一錢

右爲末以當歸四錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量人強弱
或全用或一半調服之○此藥若嫌太多則咬咀爲飲大黃
生加煎服之尤妙

牡蠣散 二百八

治便毒亦名血疳

當歸

酒拌

甘草節

滑石

煨各一錢半

牡蠣

二錢

大黃

三錢

木鱉子

五個杵非有大熱者此味不可用當去之亦不必用

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未瀆

膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室犬
小便秘發熱熯痛或交感時強固精氣以致交錯壅滯而結
為腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚熯痛大小
便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散

二百九

治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感強

忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便秘先用此藥通

解更用調補之劑

肉桂

大黃炒

芍藥

牽牛杵炒

澤瀉

桃仁去皮尖炒

各二錢半

炙甘草

乾薑各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯 二百十

治臀癰腫痛兩尺脉緊按之無力者

羌活

黃柏各二錢

黃芪鹽水炒

防風

當歸尾

藁本

肉桂

連翹各一錢

炙甘草

蒼朮

陳皮各半錢

右水酒煎服

加味瀉肝湯 二二一

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮

脫羣丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草 酒炒

當歸稍

車前子 炒

生地黃

芍藥 炒

澤瀉

黃連 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒

防風 各一錢

甘草稍 五分

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散 二二二

治懸癰不消不潰

人參

黃芪 鹽水炒

當歸

川芎

麥門冬

芍藥 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒