

類證治裁卷之七

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

腸鳴論治

腸虛則鳴。寒氣相搏。或火激其水。腸亦鳴。經曰。中氣不足。腸為之

苦鳴。宜六君子湯加炙又曰。脾虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。香砂

子湯加又曰。腸中雷鳴。上衝胸。邪在大腸。半夏瀉又曰。土鬱之發

腸鳴而為數後。平胃散加茯苓。半夏。木香。又曰。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝

胸。葶藶。木香散。如臍寒有水。理中湯加桂枝。車前。胃寒洩瀉。智半下氣暫止復鳴。

益中。火激動其水。二陳湯加

頁登台我 卷之七 腸鳴



附方

六君子湯

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

香砂六君子湯

六君子湯加

木香

砂仁

半夏瀉心湯

見一卷溫

平胃散

朮

樸

陳

草

葶藶木香散

二苓
木香

朮

澤

桂

爲五苓散再加

葶藶

理中湯

參

朮

薑

草

智半湯

朮

芎

半夏各五分
苓各一錢

加薑煎

蒼朮四錢

防風二錢

益中湯

參

朮

苓

連

薑

枳

草

氣虛升舉飧泄胸痞土鬱熱淫藏寒泄瀉下氣



動痰

二陳湯

陳

夏

苓

草

續登台

卷之

腸瀉

三





南京中医药大学图书馆藏

小大腸癰論治

小腸在臍之左

關元穴屬小腸

患癰則左腿不能伸

大腸在臍之右

大腸

患癰則右腿不能伸。部位雖分。為病相似。治亦畧同。故金匱

金概名腸癰也。其症小腹痞腫。按之痛。小便數似淋。發熱時自汗

出。復惡寒。身皮甲錯。腹皮急如腫狀。脉遲緊者。膿未成。可下之。

承氣湯

脉洪數者。膿已成。

大黃牡丹湯

膿從瘡出。或有出臍者。惟大便下

膿血者。自愈。按小便數似淋。或小便出膿血者。為小腸癰。大便出

膿血者。為大腸癰。膿從臍中出者。為盤腸癰。多不治。此症總因濕

毒瘀血結滯腸內而成。其始發熱惡寒。小腹滿痛。反側不便。或腿

縮難伸。即腸廔確候。其腹皮急。按之濡。不煩渴者。屬陰寒。

壯丹散內托十

宣散其小腹痞堅。按之痛而煩熱者，屬結熱。大黃牡丹湯。或脉遲緊則膿

尚未成，急解毒。通腸飲，或大黃煎。若脉滑數，則膿已成，宜排膿。太乙膏，排膿散。如

脉洪數，小腹脹痛，不食溺濇，為膿壅滯，宜疏通。薏苡仁湯。有瘀血小

腹硬痛。四物延胡湯。若腹濡痛，時下膿，由元氣虛，宜排膿藥中兼補益

丹皮散。或潰後痛甚，淋膿不止，由氣血大虧，須峻補。參耆地黃湯。凡患腸

瘡者，不可驚驚，則腸斷而死。坐臥轉側宜徐緩，飲食不宜過飽，庶

可保生。

腸瘡脉候

腸瘡之脉滑而數，滑則為實，數則為熱，滑則為營，數則為衛。衛數

下降，營滑上升，營衛相干，血為敗濁。脉經：關內逢乳腸裏瘡。

附方

桃仁承氣湯

見一卷疫

大黃牡丹湯

大黃 芒硝各一錢半 一方有冬瓜仁 服下有膿即出

無卽下血

牡丹皮散

參者 苓 丹 薏 芷 歸 芎 天麻 桃仁各一錢 官桂 甘草各五分 木香三分

內托十宣散

參者 歸 芎 防 芷 桔 樸 桂 忍冬藤 爲末調以酒下三錢

通腸飲

草或用黃占礬爲丸 角刺 花粉 乳 沒 芷 薏 大黃 樸硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二

大黃煎

錢下後以參者補托 見六卷胃脘痛

太乙膏

後潰成已成未成未症寒症寒

排膿散

者 歸 防 芷 蕞 翹 草 銀花 甲片各一錢



補峻瘀血滯膿

薏苡仁湯

薏仁

薏仁各三錢

丹皮

桃仁各三錢

四物延胡湯

當歸
桃仁

延胡各一錢
紅花
牛膝各七分

芎

芎

生地各五分
水煎

參耆地黃湯

參
耆

者

苓

地

丹

黃肉

山藥

薑



中國醫藥大學圖書館版

腸瘕

李氏寒熱脉數少腹左偏痛引內臍數日一更衣左足不伸此小
腸瘕也蓋小腸火腑由氣血壅滯經隧發爲瘕毒宜先微泄在
裏瘀熱則痛勢緩而瘕內消用大黃三錢硝石一錢歸尾半錢赤芍二錢
桃仁一錢數服痛減次用乳香甘草節金銀花連翹當歸木瓜薏
米牛膝數服而消

米半煎通服而散

神子發達頭眩胸大用香甘草酒金聚蘇換驥當體木瓜

寒烈熱俱發藥錄可飲內諸風大黃論無論一論翻風論衣論

風濕吐蓋小則火候由來血藥補無潤發益康舊宜代蟬其

李丑寒熱相變少效不驗服內再服煨日一更次益風不特此

題錄



疝氣論治

疝氣者小腹墜痛。控引畢丸。見症於肝。而原於任脉。故經謂在肝。

為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。任起中極之下。上毛際。瘕聚裏上關元。故疝為任病。

即婦人經言七疝。衝狐厥癰瘕瘰癧也。經云。從少腹上衝心而痛。

不得前後為衝疝。言氣上衝心。二便不通。能上而不能下。木香散。

又云。肝所生病。為狐疝。言卧則入腹。立則入囊。仲景用蜘蛛散。後人用二香丸。

又云。黃脉土之至也。大而虛。積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。言脾受肝

克氣逆上升。寶鑑當歸四逆湯。苦楝散。又云。三陽為病。發寒熱。其傳為癰疝。言

小腸膀胱之邪。傳為癰疝。囊丸腫大如栲栳。頑痺不仁。三層茴香丸。荔枝散。

又云。脾傳之腎。病名疝瘕。少腹冤熱而痛。出白。言脾失運化而傳

於所勝。則瘕聚成形。痛出白淫。烏頭梔子湯。加橘核桃仁吳萸。又云。足陽明之筋

病。癰疽。腹筋急。又云。肝脉滑甚為癰疽。言肝木乘胃。或至潰膿下

血。荔枝橘核湯。橘核散。又云。腎脉滑甚為癰瘕。又云。厥陰之陰盛。脉脹不通。

為癰瘕。言內裏膿血。外小便閉。加味通心散。此內經所謂七疝也。全

匱論疝者主寒。至巢氏分厥。厥逆心痛。癰。氣積。寒。食冷。氣。乍滿。臍旁。

腑。臍下。狼。腹。痛。引。陰。七疝。張子和非之。別列寒水筋血氣狐癰七

種。謂諸疝不離乎肝。以肝脉絡陰器故也。其曰寒疝。囊冷如石。陰

莖不舉。寶鑑當歸。四逆湯。水疝。囊如水晶。濕癢出水。加味五苓散。去筋疝。

莖痛。筋急。或挺縱不收。龍膽瀉肝湯。血疝。狀如黃瓜。在小腹兩旁。復元

氣疝。上連腎下及囊。因怒氣脹。氣。疝。飲。狐疝。癰疝。治同。丹溪云。自

素問而下。皆以疝為經絡有寒。收引則痛。不知始由濕熱壅遏。經又感外寒。濕熱被鬱。不得疏散。故痛。蓋醉飽則火起於胃。房勞則火起於腎。大怒則火起於肝。大勞則火起於筋。火鬱濕生。濁液

凝聚。迸入血隧。流於厥陰。肝性急速。為寒所束。宜其痛矣。宜根實

梔。吳。黃。山。查。生。薑。

若濕勝成癰疝。

加。荔。枝。核。

痛甚。

加。鹽。炒。大。茴。香。

痛處可按。

加。桂。

土材論。

寒則多痛。熱則多縱。濕則腫墜。虛亦腫墜。在血分者不移。在氣分

者多動。皆足補前人所未備。今按疝症初起。必由虛寒勞力致之。

積久。腑絡阻痺。遂聚濕熱。用藥不離辛泄苦降。以肝司疏洩也。其

觸寒驟痛。兼犯生冷。

用。荔。香。散。

若火注陰分。而為熱痛。必有熱症。熱脉。

或便閉渴煩。

宜。大。分。清。飲。

若食積疝痛。近臍必有塊梗起。

立。效。散。

瘀血疝。

痛在腹必有形不移。金鈴子散加因怒動肝脇脹必墜入腹。宜木

皮山梔香附。舉重傷力氣虛必下穿囊。舉元煎火腑留邪內行苦

歸鬚青葱管。胃苓湯加枳。腎囊流濕外用湯熏。以蛇床子川椒熟礬煎湯熏

洩。壳山梔黃蘗。小茴未拌勻絹袋盛。氣聚絡虛理須疏導。宜延胡山甲木香歸

安腎囊下。冷則易之。房勞疝發溫攝下元。宜杞子沙

虛濁逆法在溫通。宜乾薑吳黃荻子茯苓鹿角。筋結疝癰治同木腎。宜穿山甲全蠍木瓜葶藶茯苓

膠菰蓉當歸。少腹偏墜散結為先。香橘散加穿山甲或穿荔枝核十枚煨研。別有小腸氣名曰氣瘕痛引腰臍。天台烏

火酒調如糊服效。氣名曰水瘕不得小便。加味五又如奔豚響疝是氣水衝哭下焦

丹溪用理中湯去朮加桂心茯苓或一捏金散或木通川棟各一

若白朮則助土克水。**九癰兒疝。**畢丸。由啼哭動傷陰器。導氣湯。

燥腎閉氣。故宜去之。**錢核。**肉一兩。蜜。**大約疝氣上攻者。**宜吳萸桂心枳。下墜者。

丸彈子大。日一丸。**香附。**橘核。木。**按之大痛者為實。**宜查肉。延胡。青皮。不痛者為虛。

香葫蘆巴等。**茶歸杞韭。****痛處寒者必寒積。**宜川烏。胡椒。官桂。痛處熱者必濕熱。

子核桃等。**宜山梔。**川棟。木通。茯苓。橘核。蒼朮。厚樸。黃蘗等。**莖縮者宗筋受寒。**宜虎潛丸。去知。蘗或鹿茸。沙苑子。菰蓉。補骨脂。

等。**韭子。****腎疝者客邪在腎。**酒煮當歸丸。**卵大小上下不常者屬氣分。**聚香。

肉。**囊腫脹堅頑不移者屬血分。**橘核丸。若結。蓋疝之上攻者衝病。

桂。**下注者任病偏墜者小腸病閉癰者膀胱病卵瘻出白者腎病餘。**

則筋急囊腫瘕聚濁逆肝胃病為多日久沈痼虛滑正氣陷邪氣。

留行立穿囊頑不知痛下焦路遠藥力難到遂成宿疴迄乎無子。

疝氣

丹溪云。不痛斷房事及厚味。不可治。信夫。

疝氣脉候

心脉搏滑急為心疝。肺脉沈搏為肺疝。腎脉肝脉大急沈皆為疝。
 肝脉滑甚為癰疝。心脉微滑為心疝。腎脉滑甚為癰癢。
 者曰疝。癰小腹痛。內經疝癰積聚。脉弦急者生。虛弦小者死。經寸口
 脉弦而緊。弦緊相搏。則為寒疝。正傳脉弦急搏皆疝。弦數宜清熱。弦
 緊宜溫經。兼浮宜汗。兼實宜下。弦細為寒濕。弦濡為濕熱。醫通

附方

木香散

木香 陳皮 良薑 訶子 乾薑 枳實 各一錢
半 草豆蔻 黑牽牛 川芎 各一錢 水煎

蜘蛛散

蜘蛛十四枚 微炒 桂心五分 為末 每服一錢 白湯下

疝 狐 疝 衝

疝狐

二香丸

木香 醋炒

香附各三兩

查肉二兩

三稜

蓬莪

核

桃仁

薑黃

南星各一兩

黃連炒

吳萸

薑汁糊丸

山梔各五錢

疝厥

寶鑑當歸四逆湯

歸尾七分

附子

官桂

茴香

藥胡

茯苓各三分

澤瀉二分

白芍四分

延胡

川楝子

水煎

苦棟散

木香

川楝子巴豆拌炒去巴豆

茴香鹽炒

等

疝厥

蟠葱散

蒼朮

甘草各一錢

三稜

義朮

茯苓

青皮

桂

乾薑各三分

丁香

砂仁

檳榔各五分

延胡

肉

加葱白乙莖煎

疝癰

三層茴香丸

大茴香鹽拌炒

川楝子去核炒

沙參

木

錢空心鹽湯下

日三服服完

接服第二層此名第一層

第

二層前方加

革撥一兩

檳榔五錢

丸法如前

再不愈

接服第三層

第三層即前二方加入

茯苓四兩

川附

一兩丸法如前

此方雖數十年之久陰囊腫大如升如斗

