

增廣
靈驗

驗方新編

上海錦章圖書局
印行

後陰	痢疾	兩股	足部	婦人科	調經門	產後門
大便	脫肛	海底			種子門	雜治
泄瀉 (三)	痔瘡	腿部			胎前門	難產門

增廣驗方新編卷七目錄

後陰

截腸怪病

大腸蟲出不斷

肛門生瘡

蟲食肛門

糞門形如風癰作瘡破流血水浸淫遍體

肛門奇癢難受

大便

大便虛閉

大便熱閉

大小便閉塞不通

大小便不通尾脊骨上

左右疼痛

大小便熱結不通

大便下血

大便下血百藥不效

大便下五色膿血

泄瀉

寒泄

熱泄

久泄不止

五更瀉瀉

老人五更泄瀉

老人虛瀉

脾虛泄瀉

腎虛久泄

脾泄不止泄出食物完穀不化

腹脹泄瀉不止痢物不化

泄瀉不止腹有硬塊消不

小兒水瀉不能服藥

泄瀉口渴

痢疾

痢疾三方

微理妙論

裡急後重欲下痢而不出

痢疾先紅後白

紅痢不止

孕婦痢疾

噤口痢疾

久痢不止

多年痢疾

霍亂吐瀉

脫肛大腸頭自莫門出者是

大腸脫肛不收

小兒脫肛

痔瘡

痔瘡難忍

痔痛難忍

內痔不出

內痔腫痛

內痔治法

痔瘡諸方

增廣驗方新編卷七

後陰

截腸怪病 大腸頭出寸餘痛若難忍乾則自落又出名曰截腸腸盡則不治初截時用盆盛真脂麻油坐入

浸之另飲火麻仁汁數升而愈

大腸蟲出不斷 鶴虱末錢五調水服自愈

肛門生瘡 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡好白蜜一斤猪胆一枚取汁和勻微火煎乾作條三寸長候冷塗油

納入肛門卧下少時必裏急後重通泄而愈○又方 雞內金即雞肫皮燒存性為末乾敷其效如神○又方

枳壳炒 槐角各三錢 黃芩 生地各二錢 連川半錢 穿山甲炒 蒲黃 蠶蠶各一分 作二帖煎服

蟲食肛門 蟲食蠶門肛破腸穿痛癢無時旁生孔竅用 蜣螂又名推車蟲又新牛糞錢五 肥羊肉一兩炒黃同

搗成膏為丸如蓮子大烘熱綿裏納肛門中半日大便中即有蟲出數次即愈 又方 癩蝦蟆一個雞骨分

燒灰敷之大效終身忌食蝦蟆

蠶門形如風癰作癢破流黃水浸淫遍體 當歸錢五 巴豆三錢 去壳用香油熬枯瀝淨藥渣入黃蠟三兩共化離火再

入輕粉錢二攪勻捺之神效 又方 銀青散見癩毒方敷之最妙

肛門奇癢難受 蛇牀子 棟樹根各三錢 防風二錢 甘草一錢 皂角五分共為細末煉蜜成條塞肛門聽其自化一

二次即止癢而愈真神方也幼時被人戲弄致有此病者尤為效驗

大便小便不通外治各方凡大便閉結無論虛熱皆可通用

大便虛閉 連鬚葱頭三個 姜塊鹽錢一 豆豉十餘粒 搗作餅烘熱敷臍中捆定良久氣通即愈不通再敷必效○又

方 食鹽炒熱填臍眼文火燒五次即通○又方 凡大便不通多因寒熱不清用老薑子許如指頭大加

紙包裹火內煨熱取出蘸麻油塞蠶門內快則半日遲則一日必通此方最妙不可輕視○又方 張仲景

傷寒論云陽明病自汗小便便利大便不通者津液內竭也用蜜二合銅器中微火煎之乘熱捻作條大如

指長寸半許候冷塗油納蠶門中少頃即通或加 皂角細辛為末少許和蜜作條其效尤速屢試如神○

納臍中○又方 蜂房燒末酒服二三錢日二服不拘大人小兒皆治

大小便不通尾脊骨上下左右疼痛 方見筋骨門

大小便熱結不通 大田螺_三搗爛加青鹽_三貼臍下一寸三分即通

大便下血 名曰腸紅又名腸風用 猪尾腸_八洗極潔淨以白蓮肉_{二兩}去心灌入用線紮住兩頭煮極爛

取蓮肉少加白鹽日食二三次兩日內血即止而食亦漸加矣猪腸食與不食均可照食七日另用歸脾湯

為丸_{見內外備用諸方} 日日服之即可斷根不服歸脾丸照前煮蓮肉日日食之亦斷根有人下血多年時發時愈

百藥不效後服此方永不復發真神方也○又方 豆腐_{取漿者}炒老黃色攤冷每空心服_{錢三}日服三次

血紫者白洋糖調服血紅者紅沙糖_{黃糖亦可}調服雖患多年面色黃瘦垂危者亦極神效平日多服地黃而下

血者百藥難治用此最效○又方 有人大便下血百藥不效勢甚奇危後食辣椒_{又名青椒五六兩一頓}

飯食後下血更多因此斷根人多以辣椒性熱豈知此物能去大腸之熱故奏功如神也○又方 蠶豆葉

一大搗融熱酒冲入去渣服一碗二三次即愈有人便血垂危百藥不效服此遂愈○又方 黑豆微炒搗

碎泡冰酒飲立效○又方 絲瓜藤_{又名水瓜}燒枯研末淡酒冲服神效○又方 淋症門蜜_{又名羅蔔}方亦

效○又方 真桂圓肉_{二十個}南棗_{十四個}白木耳_{一兩}好白蜜_{四兩}煎服三次即愈因虛便血者神效○又方 蓬

大海_{二個}開水泡發去子加水糖調服甚效因熱便血者甚效○又方 酒煮鯽魚常食最妙○又方 用寒

藥熱藥及補脾藥俱不效用山楂肉為末艾葉湯調下應手而愈或掌薺搗汁兩酒杯兌好酒服數日即愈

○又方 凡下血好而復發不能永除者用久蒸黑芝麻細嚼食二兩日食數次服至數月不但下血斷

根且能補腎益精久服百病不生功效難以盡述

大便下血百藥不效日久不愈 恐是休息痢照痢症治自愈

大便下五色膿血 此腸癰也照腸癰方治

大腸蟲出不斷 方見上後陰門

泄瀉

寒泄 胡椒末和飯作餅敷貼臍上或熱柴灰布包敷 或炒鹽敷 或糯米酒糟和鹽炒敷 或酒炒艾絨

作餅敷 或胡椒大蒜作餅敷 或艾葉炷心土門斗灰吳茱萸共為末醋炒敷均效

久泄不止 燒天樞二穴離臍左右各二寸是氣海穴離臍下寸半是雖泄久垂危不止亦效燒法大蒜辦切片安穴上用艾

葉一小團如豆大在蒜上燒之或用燈草一根蘸油點燃燒之亦可不如艾火之妙艾火每穴可燒三次燈火

只燒一次○又方 大蒜搗貼足心或貼臍中此千金方也○又方 大蒜鬚加銀硃搗融敷臍眼內立止

如神○又方 木鼈丸並治痢疾 上木鼈半斤母丁香四錢麝香一分共為細末并水調為丸如黃豆大納臍中

外用小膏藥貼之立止○又方 新開桃花用針刺取數十朵不可經手麪和作餅煨熟食米湯送下服後其瀉

更甚昏困惡常瀉一二日後再飲涼水立止一人因傷酒有積滑泄數年百治不效用此愈○又方 車前

子鹽水炒七次真山藥炒真雲苓各二錢炙甘草六錢共為末每服二三錢炒湖米煎水調服烏梅湯更妙此神方也○又方

黃丹飛過枯礬 黃蠟各一兩將蠟鎔化小銅器內以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大每服二九空

心白滾水下一切久瀉諸藥不效服此一劑即愈○又方 芡實 淮藥各二兩交猪肚蒸服即愈○又方

白木一車前子錢五兩煎服立止此分水神方也 或車前子一味煎服亦可脾腎虛寒者忌服○又方 燒薑

丸治小兒泄瀉不止雖至面黑氣息奄奄者亦立效回生並治泄出食物不化 沉香 木香 公丁香

花椒 官桂 乾姜 紅飯豆扁而微紅者是砂仁各四錢研為末煮紅棗肉為丸仍以紅棗肉包之再以麪裏煨熟

須看火色俟黑烟轉為藍烟即取出米湯送下

五更瀉瀉 每至五更即瀉瀉一二次經年不止者名為腎瀉此陰盛也用 五味子去梗二兩吳茱萸湯泡七次五錢同

炒香為末每早陳米湯服二錢或為丸服亦可服完一料即愈不愈即係陰虛用後五神丸治之 五神丸

治五更腎泄久不愈者以此丸補命門相火即以補脾也 破故紙炒酒浸蒸四兩核桃肉去皮四兩五味子炒三兩

老人五更瀉瀉 蓮米散 黃老米炒三合蓮肉三兩猪苓 澤瀉炒白木土炒各五錢木香錢半白沙糖一兩乾姜二錢

紙包共為細末每服三錢空心白湯下其效如神此方簡便不大費錢有老親者切宜留心

老人虛瀉 肉豆蔻三錢 熟去殼研末 乳香一兩 為末 陳米粉煮糊 為丸 梧子大每服五七十丸 米湯下 極效

脾虛泄瀉 白米炒土 白芍各一兩 冬月加煨肉豆蔻錢五 共為末 飯丸 梧子大每服五十九丸 米飲下 日二服 甚效

腎虛久泄 破故紙焙乾末一錢 用猪腰子一個 去白筋油膜 破開 將故紙末裝入 裏緊蒸熟 不用水 食二三自愈 極效

效

脾泄不止 泄出食物完穀不化小兒科症可治驗 凡大人小兒泄瀉食物不化 胃無火也 是胃陽虛 生白

木 真雲苓各二錢 川厚朴姜汁炒 砂仁 陳皮各一錢 生益智半錢 水煎 數服即愈 屢用皆效 ○又方 參朮散七

味豆寇散均見症 俱極神效 ○又方 柿餅燒紅放地上 用碗蓋住 不蓋則成 俟冷研末 米湯調服 二錢

即愈 有一小兒由六歲至十二歲 泄瀉食物不化 百藥不效 服三次全愈

腹脹泄瀉不止 痢物不化 此胃寒也用 益智仁二錢 裏煨之 煎服立愈

泄瀉不止 腹有硬塊 不治 此症有氣滯血滯之分 一人患此 照氣滯治之不效 後用 桃仁 大黃 芒硝

甘草 桂枝 白芷 水煎服數劑而愈

小兒水瀉不能服藥亦治 巴豆三錢 黃蠟三錢 共搗爛成膏 貼臍上 用絹帕縛住 半日即愈 如喉口不食者 加麝

香三用 前藥同貼 ○又方 香白芷 乾姜各一錢 共研細末 以蜜為膏 先用酒洗臍溫微熱 後貼膏 用鞋底

烘熱 貼膏上 氣通即愈

泄瀉口渴 七味白朮散見三 屢試如神

痢疾第十七番 草烏末藥方雖休息痢數年者服數

痢疾最忌黃連 服則倒胃 難治 然倪涵初先生痢疾三方 均有此味 似不相宜 胃弱者宜斟酌用之

痢疾三方總氏之論 固屬慎重 然當按倪方合數 痢為險惡之症 生死所關 不惟時醫治之失宜 而古今

治法千家 多不得其道 是以不能速收全效 今立方何以為奇 不泥成法 故奇也 立論何以為妙 不膠成說

故妙也 然其藥品 又不外乎常用而已 有識者切不可更張 勿為庸醫所誤 遵而用之 百試百效者也 初

起煎方 川黃連去蘆條 黃芩 生白芍 山查肉各一錢 陳枳壳去穢 紫厚朴去皮 姜 堅檳榔 青皮去穢 各

上海錦章書局石印

當歸 甘草 地榆各五 紅花各三 桃仁去皮尖研 南木香三分 水二碗煎一碗空心服渣再煎服此方或紅

或曰裡急後重身熱腹痛者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅各四 木香各三 如滯澁甚者或加大黃二錢 用

酒拌勻炒服一二服仍除之若一劑滯澁已去不必再服矣古方用之三五日神效用之於旬日亦效惟十

日半月外則當加減矣另詳於左 加減煎方 川連 黃芩 白芍各酒炒 山查肉錢 橘紅 青皮 枳

榔 地榆各四 甘草各三 當歸各五 桃仁粉 紅花各三 木香二錢 水二碗煎一碗空心服渣再煎服如延至月

餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理具方於左 補理煎方 川連 條苓各酒炒 芍藥酒炒 橘紅各全 當歸

人參無則高麗參 白木土炙草 水煎空心服渣再煎服 以上三方隨用輒效其有不效者必初時投

參木等補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而澀之則助邪欲清而疏之則

愈滑遂至於不可救藥雖有奇方無如之何則初投溫補殺之也如婦人有胎者去 桃仁 紅花 枳榔

等味

微理妙論 古今治痢皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之小便赤澀則分利之此五

者舉世信用如規矩準繩之不可易予謂五者惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也今詳於後 一

曰忌溫補痢之為病由於濕熱蘊結膠積於腸胃中而發宜清邪熱導滯氣行瘀血其病即去若用參木等

溫補之藥則熱愈盛氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可療矣此投溫補之禍為最烈也 一曰忌

大下痢因邪熱膠滯腸胃而成與溝渠壅塞相似惟用磨刮疏通則愈若用承氣湯大下之譬如欲清壅塞

之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩隄塌矣治痢而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而

已正氣傷損邪氣不可除壯者猶可弱者危矣 一曰忌發汗痢有頭痛目眩身發寒熱者此非外感乃內

毒薰蒸自內達外雖有表症實非表邪也若發汗則正氣既耗即邪氣益肆且風劑燥熱愈助熱邪表虛於

外邪熾於內鮮不斃矣 一曰忌分利利小使者治水瀉之良法也以此治痢則大乖矣痢因邪熱膠滯津

液枯澀而成即如用五苓等藥分利其水則津液愈枯而滯澀愈甚甚至纏綿不已則分利之為害也若清

熱導滯則利自愈而小便自清又安用分利為哉予於此一症素畏其險惡用心調治經今二十餘年百試

百驗既而身自患之試驗益精然後能破諸家之迷障而為奇妙之方論用是述其顛末以拯斯人之疾苦而悉登諸壽域也以上係倪氏初集中摘錄○又方 痢症每起於暑天之鬱熱而又感以水濕雨露之氣紅白相間如

血如膿甚者如屋漏水如魚凍水裡急後重崩逐痠痛欲下而不能欲不下而又不待一日夜數十次甚至

百餘次氣息奄奄坐而待斃此痢之概也若驟止其邪則死生頃刻不止其邪則危絕如絲欲補氣而邪氣

轉加欲清火則下行更甚此時惟有因勢利導之方可行或疑人已氣血虛敗更加利導恐其難堪不知邪

氣一刻不去則正氣一日不安古人治痢無止法信不誣也方用 白芍 當歸各三 蘿蔔子一枳壳炒枳

榔 車前子 甘草各三 水煎服一劑即止二劑即安可用飲食矣此方之奇妙全在重用歸芍蓋水瀉忌

當歸之滑而痢疾則正喜其滑也芍藥味酸以平肝木使木不敢再侵脾土又有枳壳枳榔消逐其濕熱之

邪又加車前子分利其水濕而又不耗其真陰之水所以功勝於茯苓也尤奇其用蘿蔔子一味蓋蘿蔔子

味辣而能逐邪去濕且又能通達上下消食利氣使氣行於血分之中助歸芍以生新血而祛蕩其敗污也

少加甘草以和中則無過烈之患此奏功之神奇實有妙理耳○又方 水瀉痢疾均治百發百中不可輕

視 杏仁七十一粒去皮尖去油研蒼朮六兩淘米水浸炒研羌活四兩炒研大黃一兩炒研草烏一兩炒研共為細末空心服忌生冷麪食

葷腥煎炒發物裝入磁瓶勿令洩氣一二三四歲服分八九歲服分十五六歲服分二三十歲服分四五

十歲服分五歲老人服分孕婦忌服 水瀉濃薑湯下 赤痢燈心淡薑湯下 白痢濃薑湯下 赤白

痢淡姜湯下重者日三四服○又方 不拘紅白久近皆治有患痢日夜不止越二十八夜不能睡藥窮待斃矣用

此一服即安三服全愈 蘿蔔連皮自然生老薑自然汁半酒五生蜂蜜一酒細茶陳者佳濃煎一盃和勻服若無蘿蔔多

用蘿蔔子冷水浸過搗取汁亦可○又方 胡椒粒各三布包槌碎用 紅棗一枚打碎大鯽魚一個去頭尾骨腸同椒末搗融敷臍上甚效○又

方 巴豆粒一綠豆 胡椒粒各三布包槌碎用 紅棗一枚打碎大鯽魚一個去頭尾骨腸同椒末搗融敷臍上甚效○又方 見

泄瀉門木斃死 又方 點眼法 初胎小兒黃乾一錢雄黃四錢梅花水片五錢為極細末水調點兩眼內角

無論赤白痢及噤口痢危篤者皆神效○又方 粗草紙捲緊成筒燒燃取下黑灰俟冷加紅糖在石板上

分且粘滯腸胃急難推動若冠伐太甚必傷元氣此方功能推刮積滯而不傷損無論寒熱虛實至穩至當百發百中○又方 元胡索末錢三酒調服有人年五十餘下痢腹痛欲死棺木已備服此而愈○又方 真

川厚朴錢一煎服一日三次兩日即愈神效○又方 生藕即搗爛酒冲服極效○又方 金銀花五錢研末

不論紅白用開水調白糖空心服服後其痢更甚兩日全愈奇效無比小兒一歲服一分○又方 山查炭

研末紅痢加白蜜為丸白痢加紅糖為丸紅白痢加蜜與紅糖為丸空心白開水湯下大人每服八錢小兒每

服三錢一日服三次三日全愈山查炭去積補脾無論虛實久近屢試屢效不可輕視○又方 陳細茶葉

山查炭 紅沙糖 白沙糖各三錢老姜一錢煎服一日服盡即愈甚效○又方 木耳兩紅痢用紅糖炒白痢

用白糖炒紅白相並者用紅白糖炒服之極效

裡急後重欲下痢而不出者是川厚朴錢一煎水調檳榔末服奇效或單服檳榔亦可○又方 穿山甲焙枯研末米

湯調下三五服即愈

痢疾先紅後白 名曰腸蠱用 淮牛膝兩搗碎以酒一泡之每飲一二杯日服三次極效

紅痢不止 鹽梅一胡黃連錢一灶下土錢一共為末茶調服或單用鹽梅好醋調服亦妙有人血痢百餘日用此

而愈屢試神驗 又方 馬齒莧又名小葉搗汁半茶杯凡蜂蜜半酒杯空心溫熱食之煮食亦可有人患紅

痢數年服之即愈○又方 乾薑燒黑存性候冷為末每服一錢米湯飲下神效○又方 穀樹皮又名荆

芥等分為末醋調服一錢極效

孕婦痢疾 雞蛋仁破一孔如指頭大入黃丹五分用銀簪攪勻以紙封口入飯甑內蒸熟食神效

噤口痢疾 生大附子一切片貼無根火上俟熱貼病人臍上冷則再換立愈取無根火法用新石灰一團冷

水淋下自有熱氣出○又方 雄黃 巴豆 硃砂 草麻子 麝香 各等分搗為細末和蜜為丸如父

實大收好不可洩氣放眉心以膏蓋之一炷香久腹內自響即思飲食去藥而愈此人世傳妙方百發百中

活人無數○又方 活麻蝦蟆一隻加上好麝香分搗勻貼臍上用布束半日即思飲食兩日全愈○又方

細辛 肥皂錢一葱根酒藥子半大田螺一共搗成泥敷臍上候乾揭去自能飲食○又方 田螺 麝香

加連壳搗爛敷臍上○又方 黃瓜藤燒灰存性香油調敷臍上極效經霜之○又方 鐵秤錘亦可石燒

紅放瓦缸內好醋淬入令病人聞之一日數次極效○又方 真烏梅一斤打碎熬水十數碗入一桶內令

病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣冲上薰胸如溫即洗其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先

以粥湯半盞食之少頃再食即半碗不宜飽食漸漸加食甚妙小兒烏梅減半用之此神方也○又方 點

眼法見前○又方 白蓮肉煮湯時時服之即能思食石蓮更佳○又方 綠豆粉 白沙糖冷水調服其

效如神○又方 乾蘿蔔葉煎水加紅白糖服最妙或用新鮮蘿蔔煎湯服亦可○又方 陳久火腿骨煎

濃湯緩緩服其效如神○又方 子鴨一隻去毛只將肚皮割開肚中諸物均不動仰放大碗上蒸透只服

碗內流出自然湯不食鴨肉服後即能服藥吃粥此秘方也神效之至○又方 水鴨去毛與腸雜掛在厨

內近煮飯處臘乾愈久更妙每服一大塊煎湯飲之甚效○又方 用金絲鯉魚一尾重一二觔者洗淨照

常用監醫安安排畢入胡椒末三錢煮熟置病人床前令聞香氣欲盡與之連湯吃一飽病即除根屢治有效

○又方 神曲炒山查 白沙糖各二錢川連一錢真烏梅三個甘草五分荔枝肉七個用水三大碗煎溫服且吐且

飲自然思食止痢此方屢試神奇活人無數不可輕視○又方 川烏草烏各等放淘米水中泡四十九日

取出烘乾於石臼內搗成細末最忌鐵器每服七八分小兒每服三四分紅痢加白糖白痢加紅糖紅白相

兼者加紅白糖腹痛者加吳茱萸末少許此藥性雖猛烈但漂過四十餘日其毒已去分量亦輕且此症係由

胃毒內蘊所致非此藥不能見功神效非常百不一失

久痢不止 麻油煎鹹魚食數次甚效此方奇驗莫測其理

多年痢疾名林凡痢症腹不作痛惟下濃血兼流黃膿日久不愈此係平素愛食冷茶水酒所致取 活鱔

魚切段放瓦上焙枯成炭研粉每服三黃糖拌熱陳酒送下數服全愈不拘老幼無不神效忌食生冷水

酒海參海螵等物此林屋山人經驗方也○又方 真烏梅煎水紅白糖調服大有功效或用烏梅煎洗之

法見前亦效○又方 凡痢疾多年不愈其積日久下墜竟至大腸下口直腸下口交界之地有小曲

相隱匿於此為腸臟最深之處藥所不到之地症則乍輕乍重或愈或發便則乍紅乍白或硬或溇任是神

鴉旦子

去壳

以桂元肉包之大人每包

則七包少則五包小兒每包三粒多則五包少則三包空心滾水吞下隨服乾飯一二碗俟大便行時有白

痢如魚腦者即冷痢之根如無白痢一二日後再服一次或加數粒亦可此後不必服矣戒食生冷諸物及甲魚海

參海蜇皮蛋鴨肉三月戒葷酒五日永不再發雖十數年不愈者無不神效服至一二日後如腹中作痛用

白芍一根甘草一根俱重三錢紙包用水浸濕火內燒熟取出搥爛煎水服立愈○又方 豆腐醋煎常常

服之甚效○又方 數十年古松樹上皮研細末稀粥和服一碗日服三次三日必愈○此方治霍亂吐瀉

及角弓反張一切痧症上吐下瀉每日百數回一時昏倒在地牙關緊閉速即照方煎服覓得此方服藥立

愈每逢醫生西黨姜汁不用此致候事不少 木瓜三錢扁豆二錢藿香一錢赤苓三錢杏仁二錢甘草一錢砂仁一錢製厚

朴一錢焦木二錢西黨一錢法半夏二錢灶前土五錢加姜汁二匙井水煎服立效

脫肛大腸頭自真

大腸脫肛不收 蝸牛身有螺蛳壳頭有雙鬚者是瓦上焙枯研末一兩猪油調敷立效桑樹蝸牛更好○又方 腳魚頭焙枯研末

麻油調敷或以紙托患處神效○又方 大螺蛳個入頂上梅花冰片分即時水出敷之甚效○又方 蟬

退研末香油調搽奇效無比○又方 大蜘蛛個去頭足瓦上焙枯研末燈油調敷半刻即收神效○又方

生鐵斤水煮濃汁日洗數次雖脫肛多年亦效○又方 草蓆子七粒去壳搗爛敷額門上少刻即收收後

務即將藥洗去有人脫肛三月一敷即愈○又方 樛上灰塵或銅吊同鼠糞燒煙於桶內坐上薰之數次

即止○又方 後小兒脫肛辣椒方百藥不效服之即愈

小兒脫肛 凡小兒脫肛不收久則堅硬難入用蓮鬚葱新煎湯入桶內坐上乘熱薰之隨後慢慢洗軟再照

以上各方用藥敷之即上○又方 五倍子為末鋪紙上捲成筒燒燃放便桶內令其坐上使煙氣薰入肛

門自上或用五倍子煎湯薰洗亦可後將白礬末搽肛門上可不再脫○又方 辣椒又名青椒多食極效有一小兒脫

肛數月百藥不效後食辣椒數次肛即縮上並不再脫屢試如神此物味宜辣食宜多食少而不辣者不效

並治大人脫肛及痔瘡腸風下血俱極神驗食後下血更多即易愈也

痔瘡

凡人九竅中有小肉突出為痔故有耳鼻牙痔等名不獨肛門一處也肛門痔有數種狀亦不一未破曰痔已破曰漏

一肛門邊生數瘡腫而突出膿破即散者牝痔

一腸口顆顆發癰且痛且癢血出淋漓者脉痔

一酒醉即腫痛流血者酒痔色痔相同

一肛門腫痛遇怒即發怒息即安者氣痔

痔瘡難忍 蠟子不拘多少燒煙薰之極效

痔痛難忍 木鱉子水磨濃搽陳醋磨之更妙初覺痛甚少頃即止痛消腫神效之至或用紙浸汁貼之亦可○又方

蝦蟆頭陰乾燒烟薰之奇效○又方 鼻涕蟲形似蠅牛而無壳者即是搗爛和陳墨敷之極效

內痔不出 草烏為末口水調點肛門痔即反出乃可用藥敷治

內痔腫痛 猪大腸六蚯蚓十餘條又煮融去蚶食腸極效

內痔治法 內痔有大如茶杯形如一箇音音糞從箇心而出痛極上面如盆四邊高中心陷下如箇根糞後用

溫水洗淨以洞天膏見癰毒諸方門攤如菜碗大中剪一孔以一邊煎開熱錫茶壺上盪融套箇根下貼糞門四邊

圍護好肉免沾藥汁用枯痔散見後一二分口水調用筆敷箇之外面四旁日夜二次箇之中心通糞門眼

不可敷藥數則大痛難忍一二日毒水流出血亦漸縮而軟再敷一二日漸硬而異箇邊亦漸脫落然後每

藥一錢再加硃砂一分照前調敷數至箇根落盡全愈屢試如神此林屋山人極驗方也

痔瘡諸方 枯痔散 紅砒放舊瓦上火煨白烟將盡取起淨末一錢枯礬二錢真烏梅肉燒存性硃砂飛淨共研極細末用時以口

浸濕手指蘸藥於痔頭痔身上搓擦一日三次初起不腫五六日出臭水出盡其痔乾枯不用上藥輕者七

八日全愈重者半月收功諸痔皆效自有此藥世上斷無不愈之痔人多以砒霜毒藥不肯敷用不知此藥

有斷根之功且只一錢有益無損切不可疑而自悞也 消管丸 苦參四兩連二兩當歸 槐花 萆澄

茄各一錢五倍子五錢各為細末用小蠶心九兩真柿餅四兩二味共煮溶去蠶骨搗爛入前藥末搗為丸每空

上海錦章書局石印

心服四錢滾水送下其管自出此林屋山人經驗方也 胎元七味丸 專治痔漏不拘遠年近日膿血通

腸者服之化管除根此方傳自異人屢試神驗直寄方也 男婦臍帶 三個瓦上焙乾存性陳棕七錢數十年者犀牛

黃三槐角子五錢肥大者瓦上焙乾存性刺蝟皮三錢象皮四錢地榆三錢共研細末酥油為丸如麻子大者不成丸加

糯米粥少許即成每服空心白滾水下三日化管止痛七日平滿血清膿止十日除根 除痔丸 當歸

川連 直象牙末 槐花各五錢 滴乳香各二錢 露蜂房一個槐樹者佳 共為末黃蠟二錢 溶化入藥末為

丸每空心服錢三漏蘆煎湯送下至五日漏孔內退出肉管待二三指長剪去再出再前唇量肌生而愈神效

之至 完善丸 專治痔漏去管生肌 夏枯草八兩 甘草節四兩 連翹四兩 為末金銀花一斤 煎濃湯為丸每晨

鹽湯送下錢三 初起者一料全愈久者兩料除根○又方 白煮雞雞蛋蘸真象牙末假象牙不效 空心服之每日

二次有人患痔二十餘年服至半月斷根○又方 榕樹上吊生之鬚五兩此樹惟兩廣福建有之 皮硝五錢 煎水放瓦

罈內乘熱坐上先薰後洗數日即愈可以斷根極效○又方 小茴香二錢 研末泡水服輕者數次即愈極效

○又方 脫肛門內辣椒方最為神效

如神千金方 好信石黃明者用三錢打如豆予大 明白礬一兩研末 好黃丹五錢 飛淨七個 瓦草烏光實者去皮 右藥用

紫泥罐先將炭火煨紅放冷拭淨然後下明礬燒令沸次下信石入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看

罐通紅烟起為度將罐擲下待冷研為末方入黃丹草烏蝎梢三味再同研極細收好將痔瘡用甘草湯洗

淨患處然後生麻油調藥以鴨毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則將痔頭漸消年遠者不出

十日消盡日近者數日化為黃水連根去盡再搽生肌之藥全愈此方五痔皆可治珍之寶之○又方 臭

芙蓉根煎水用瓦罐盛之乘熱先薰後洗數次除根臭芙蓉葉大如桐而厚上面青黑色而先背紫色而毛

氣味極臊六七月間開小紫花發疊盤纏成叢陰濕處多有之緣前方榕樹上吊生之鬚恐江淮間難得故

補此以取效而簡便也 鏡堂新增

兩股

坐板瘡

股上生瘡

海底在肛門前陰根後兩相交界之處

縣癰

腿部

脚氣腫痛

脚氣外治法

脚氣衝心

脚氣腿脛紅腫

酒風脚

腿足腫痛拘攣

兩膝疼痛

膝上生癰

腿膝疼痛不能舉步

人面瘡

脚上轉筋暑天腹痛轉筋名霍亂症見霍亂門

腿痛轉筋氣衝入腹

腿面腫瘡

腿脚浮腫破爛似膝瘡而非膝瘡

腿上生瘡破爛多孔

腿足忽然紅腫熱痛或時上時下或爛或不爛

面痛極不紅不腫

大腿外内生疽

小腿腿肚生癰

腿癢難忍

腰臀腿膝疼痛不已

腿足不能起立能食易飢

兩腿不能動作卧床不起

足軟難行

足部

脚氣腫痛

腿足軟弱

酒風瘡

傷寒足痛

兩足痛如刀割

足生疣瘡音隔腫脹骨痛

脚上冷疔初起紫白泡痛疼徹骨漸至腐爛深孔紫黑

黑色水腥臭日久不愈

内外脚蹠生瘡

脚甲腫爛疼痛

脫骨疽

脚了奇癢難受

脚了爛瘡

脚趾縫中生毛痛不可忍

脚根作痛

足生瘤如斗大

脚底瘡有細孔日久不愈

脚底生瘡

脚底生瘡穿爛

脚底皮肉生泡痛難行

脚心腫起堅硬如鐵不能履地膝上毛孔時時流水身發寒戰惟思酒食

手足心俱腫

脚心生瘡

脚板色紅如火不可落地

脚底木硬

脚底開裂
遠行健步

脚上生蹇音切忌用刀

脚生雞眼

脚冷如水

行路脚底生泡