

馮氏錦囊秘錄雜症大小合叢卷八

男

乾元龍

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人孫顯達惟真全較

男 乾貞幹臣

風門 兒科

內經謂新沐中風爲首風、飲酒中風爲漏風、入房汗出中風爲內風、入中爲腸風、在外爲泄風、及心肝脾胃腎胃風之形狀不同、又曰風者百病之長也、清靜則肉腠閉拒、雖有大風苛毒勿之能害、否則天有八風乘虛感襲霧樞目

風從南來名曰太弱風其傷人也內舍於心外在於脈其氣主熱風從西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣主弱風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮膚其氣主燥風從西北方來名曰折風內舍於小腸外在於手太陽脉脉閉則結而不通故善暴死風從北方來名曰太剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與脊之督筋其氣主寒風從東北方來名曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脇腋骨下及肢節風從東來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋紐其氣主身

濕風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外在肌
肉其氣主體重此謂八風聖人避茲如矢石焉經曰虛邪
賊風避之有時賊風者如月建在卯寅卯寅屬木風從西
來則對衝之金冠木月建在巳午巳午屬火風從北來則
對衝之水冠火月建在申酉申酉屬金風從南來則對衝
之火冠金月建在辰丑戌未四者皆爲屬土風從東來則
對衝之木冠土月建在子風從南來對衝之火反勝也月
建在酉風從東來對衝之木反勝也皆爲賊風並宜避之
如肝中風則踞坐而舉頭不得左脇疼痛諸筋繫急頭目

、觸動上視多怒心中風則但能仰臥領側不能發熱失音
其舌焦赤脾中風則腹滿身黃唇黃踞坐四肢不收皮肉
觸動肺中風則餒臥胸滿喘息咳嗽燥闊汗出目能視人
口不能言腎中風則踞坐而浮腰脊痛引少腹風入領頰
之間則口噦而牙緊風客咽喉則出聲之竅塞而失音風
與氣搏則氣被痰隔而出鋸聲搏於筋脉因寒則拘急掣
痛而脉浮緊因熱則弛緩不隨而脉浮洪浮者在表宜汗
實者在裡宜泄促者在上宜吐然治風當先理氣不可專
服風藥攻之愈急則風勢愈甚務調榮衛通暢則風可不

治自愈矣

通關散 治卒暴中風牙關緊急藥不得不下

細辛 薄荷 猪牙皂角 雄黃各二

各二錢爲末每用少

雄黃各二

許吹入鼻中俟噴嚏後然後進藥如不噴者不治牙關緊甚前藥中加麝香少許或用烏梅或自拘去核同藥擦牙酸先入筋使牙關酸軟則開亦未能尅生之義蓋牙齦屬陽明胃土也 或有單用烏梅擦牙齦涎出卽開夫陽明之脉循頰車入齒緣脈寒中之輕則戰慄鼓領重則嘔不開若中風而口開不噤者又是脫症而

筋先絕也不治

稀涎散

主中風暴仆瘓涎壅盛此藥取吐

牙皂

西條去皮弦炙白礬二兩枯柏

共爲末每進三字水下

大清陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆也若濁邪逆
湧清陽失位故暴仆而多瘓先治其標後治其本白礬
酸苦經曰酸苦湧泄故以爲君羌角辛鹹經曰辛以散
之鹹以軟之故以爲佐咽喉疏通能進湯液便止若攻
盡其瘓則無液以養筋令人攀急偏枯此大戒也

加減烏藥順氣飲治中風風瘓壅盛

烏藥

防風

枳殼

陳皮

殭蠶

白芷

麻黃

去

羌活

半夏

白薑

燒

甘草

南星

薑棗同煎

獨活湯

治中風濕日久腰背手足疼痛痙攣不寧

獨活

五錢

當歸

酒炒

白米

炒熟

黃耆

蜜炙

薄桂

去皮

牛膝

酒浸各

甘草

錢一錢

生薑

葱白同煎服

排風湯

治中風昏憊狂語大音

白蘇皮

白朮

芍藥

桂心

川芎

當歸

杏仁

防風

甘草

獨活

麻黃

茯苓

薑棗同煎

小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥

甘草 杏仁

芍藥

甘草

防已 肉桂

各八分

防風

錢附子

炮去皮
分四分

薑棗水煎服

防風通聖散

治諸般風熱或斑疹不快

熱率中不語

蒸梅票陷驚風發

防風 川芎 當歸

薄荷 大黃

芍藥

麻黃

連翹 茵硝 石羔

黃芩

桔梗

滑石

山梔

荆芥 白朮 芫草

剉散每服三錢

生薑葱白同煎

三化湯 治中風內有便溺之阻隔以此導之

厚朴

大黃

枳實

羌活

各等分

水煎服微利則起

方勝中風合參

人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不
死者世以中風呼之方書亦以中風治之考諸內經則曰
風者百症之始也又曰風者百病之長也又曰風者善行
而數變又曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中
或爲驚風或爲偏枯或爲風其至暴僵仆不知人四肢不
舉者竝無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐
伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰
風痺偏枯者半身不遂風痺者身無痛四肢不收風懿者
奄忽不知人風痺者諸痺類風狀金匱中風篇曰寸口脉

浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。囁僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。脊重不伸。邪入於腑。則不識人。邪入於臟。舌卽難言。口吐涎沫。由是觀之。則知卒暴僵仆。不知人。偏枯四肢。不舉等證。固爲因風而致者矣。故用續命排風等湯治之。及後劉河間李東垣朱彥修三賢者所出之論。始與昔人異矣。河間曰。中風癱瘓者。非肝木之風實。甚而卒中之。亦非外中於風。由乎將息失宜。心火暴盛。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽實。

而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆爲熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣云非風者非外來風邪乃本氣病也凡人年踰四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其志者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒爲風所中誠有之矣東南氣溫而地多濕有風病者非風也皆濕土生痰痰生熱熱生風也三賢者之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎濕反以風爲虛象而與昔人所論大異

矣。以三氏爲是，則三氏未出之前，固有從昔人而治愈者矣。以昔人爲是，則三氏已出之後，亦有從三氏而治愈者矣。蓋昔人三氏之論，皆不可偏廢。但三氏以相類中風之病而立論，故使後人狐疑而莫決。殊不知因於風者，真中風也；因於火，因於氣，因於濕者，類中風而非中風也。如內經所謂三陰三陽發病，爲偏枯瘻瘍，四肢不舉，亦未嘗必因於風而後能也。夫風火氣濕之殊，望聞問切之間，豈無所辨乎？辨之爲風，則從昔人以治；辨之爲火氣濕，則從三氏以治，如此庶乎析理明而用治當矣。

氣無所附故隨火而發越矣陰也血也豈不爲陽氣之根本乎經曰腎氣內奪則舌瘡是廢治法之大槩以氣藥治風猶可以風藥治氣則不可以血藥治風以氣藥治痰均可以風藥治血以痰藥治氣均斷不可也

用藥之法寒因熱用熱因寒用乃正治也今中風癱瘓之症本風火陽邪而用烏附等熱藥治之何哉蓋中風癱瘓乃濕痰死血結滯於臟腑經絡之間非烏附等熱藥焉能開散流通此非正治乃從治也經曰從少從多各觀其事則從治之藥只可爲引經而已况風本於熱而生豈可槩

謂虛寒用附子取效者必中寒陰毒之症及肥白人多濕

者丹溪所謂肥白人多濕少用烏附行經是也若中風陽

毒之症忌之但至癱瘓既久則瘧火拂鬱若於辛涼藥中

而無香熱之藥爲之向導則將扞格而不能入也况此時

陽氣多係假象蓋真火既已上升而爲病矣有真陽仍

存坎宮而不動耶能此則雖是痼疾所宜烏附爲對症之

宜但必兼滋補便可制其僭熱矣惟中臟陰寒之症又宜

純陽忌同陰藥蓋畧兼陰藥則陽藥便難小效甚有益余

陽亡試不思無陰則陽無以化當此依希之陽能經陰藥

中風一症輕重有三治各不同中血脉者病在半表半裏外無六經之證內無二便之閉但見口眼喎邪半身作痛不可過汗以虛其衛不可大下以傷其營惟當養血順氣以大秦艽湯及羌活愈風湯和之中府者其病在表多着四肢故肢節廢脈浮惡風拘急不在外有六經之形證內無便溺之阻隔宜諫風湯及小續命湯汗之中藏者其病在裏多滯丸瘕故唇緩二便閉不能言耳聾鼻塞目瞀瘡涎昏冒宜三化湯及麻仁丸下之然凡中血脉中腑之病切勿用龍麝牛黃蓋麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦

卷之三
人腎治骨引風深入骨髓如油入麵莫之能出且閉症或
宜脫症深所切忌也并勿槩用大戟芫花甘遂瀉大腸大
便之藥否則損其陰血真氣愈虛何能驅邪外出

中風之風乃內虛暗風的係陰陽兩虛而五臟本氣自病
爲內奪暴厥也然陰虛者爲更多與外來風邪迥別急者
參者未附固本爲先緩者順氣化痰以救其標補陽養陰
以固其本陰甚虛者偏於陰陽甚虛者偏於陽陰陽兩虛
甚者氣血峻補則雖外有風候之假象不治自愈所謂養
血風自滅蓋指內起之風由於陰虛內起之火耳若用辛

熱風燥之藥焉能治病徒速其斃至於丹溪以癰癧分左右別氣血四君四物爲治皆非至論蓋左半雖血爲主非氣以統之則不流右半雖氣爲主非血以麗之則易散故肝膽居左其氣常行於右脾肺居右其氣常行於左往來灌注是以生生不息也

中絡者邪方入衛尚在經絡之外故但肌膚不仁中經則入榮脈之中骨肉皆失所養故身體重著至中腑中臟則離外而內邪入深矣中腑必歸於胃者胃爲六府之總司也中臟必歸於心者心爲神明之主也風入胃中胃熱必