

馮氏錦囊秘錄
卷九
亨

亥23

37410



卷九 寒門 兒科

濕門 兒科

火門 兒科

方脉寒門合參

方脉濕門合參

方脉火門合參

暑門 兒科

燥門 兒科

方脉暑門合參

方脉燥門合參

馮氏錦囊秘錄 卷九 亨



馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷九

男 乾吉佑民

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人孫顯達惟良

男 乾德進修

寒門 兒科

大嚴冬凜冽萬象收藏犯之者反少以其能知避也若夫
早晚寒熱風雨非時形寒飲冷皆人自致之寒也肺為臟
首受寒則喘嗽氣逆發熱毛焦胃為腑首受寒則嘔逆惡
心渴煩發熱質薄者受即陡成質厚者積久病發如經曰
冬傷於寒春必溫病此積久而發者也如中寒之症手足

兒科寒門



北京中医药大学图书馆版权所有

厥冷寒顛口噤口吐涎沫不能啼哭者此受即陡成者也
更有胎中受寒生下而色青白四肢厥逆盤腸氣釣噤口
不開臟寒腹痛而爲胎寒者此又積之最深者也
最類於熱因逼陽在外在上但知其顯而不知其微切宜
深察如脈數者或飲水者或煩渴動搖者皆爲熱病若
咳嗽者水液清徹而尿不澀者手足厥冷者大便完穀不
化身涼不渴脈遲者皆屬寒症但手足厥冷固多屬寒間
亦有陰陽偏傾不能宣行是以陽氣暫聚於內不能營運
四肢所謂熱深厥亦深者又宜細辨故曰寒熱如水火誤
治即殺人丹溪曰寒症須投熱藥然熱藥須加旁劑以

導之。或熱藥冷飲，使同聲易於相應。經所謂從而逆之也。

理中湯。

加附子名附子理中湯。

治臟腑中寒，四肢強直。

人參

乾薑

甘草

白朮

各等分

水煎服

一方

乾薑

橘紅

半夏

白朮

炒麩

厚朴

炒薑

茯苓

桂心

甘草

水煎服

一方

用食鹽同吳茱萸炒，絹包熨兒臍腹。

方脈寒門合參

夫天氣下降，則清明；地氣上升，則晦塞。故陰邪為害不發，則已其發必暴。是以中寒一症，乃倉卒感受天地大寒，肅

方脈寒門合參

二



殺之氣其病卽發。非若傷寒之邪由表循經以漸而深也。有卒中天地之寒者。有口得寒物者。然邪之所臻其氣虛。治法主乎溫散。多從補中益氣湯用參者。以托其氣。加入溫散藥以治之。氣虛甚者少加附子以行參者之勢。是症多因中氣大虛。膚腠疎豁。故外寒內冷。得以感中。不分經絡。惟當溫補其脈。沉細手足厥冷。息微身倦而懶動。雖身熱而不渴者是也。宜急溫之。遲則不救。必藉姜桂附子之猛方能勝病。卽四君元老之劑不可以理繁治劇也。與熱症相似而大不同。蓋逼陽在外易相類耳。凡陰邪上冲孤陽擾亂急進純陽之劑以驅陰氣。闢乾坤而揭日。

月光明之用豈不彰哉。若脉數有力者。或壯熱飲水者。煩燥動搖者。方爲熱病。寒熱如才火。誤治則殺人。可不細辨歟。

夫寒症。或外受。或內傷。皆當時受病之名。若稍久。而成熱。故傷寒經名病熱也。然有終不能成熱者。由其人氣素虛。向已陰盛。陽微。今一感外寒。微陽益損焉。能有力變熱也。然陰症俗論必歸房勞。又必歸傷寒。而不及雜病。且耑責男子。而不及婦人小兒。殊爲可怪。夫陰症卽虛寒症。亦卽亡陽症也。男女老幼。雜病傷寒。皆有之。如產婦亡血。及崩漏過多。又如卒然大吐血不止。與霍亂吐瀉無度。

或因汗吐下太過。及爲寒涼藥所傷。或暑月恣意追涼。冬
月忍饑勞倦。爲寒所中。凡此之類。皆能令人元氣暴脫。忽
變爲手足厥冷。體疲無氣。脉微欲絕。與房慾脫陽。之證無
纖毫異。而治法總不外人參附子肉桂乾薑救之。危則生。
緩則死。同歸一轍。胡可岐爲二也。能明乎此。則陰虛未嘗
必犯於有慾之人。及傷寒一症也。總之陰陽調和。則百病
不生。及其旣病。則陰陽不調。可知矣。偏之輕者。其病亦輕。
用平和之藥。以調之。偏之甚者。其病必篤。苟非峻用偏寒。
偏熱之藥。以救其偏。何能有濟。今人見病危篤。藥益輕平。
勿任怨尤。重惜名譽。真心救世者。萬勿如此。當寒卽寒。當

熱卽熱當攻卽攻當補卽補倘逡巡退縮不寒不熱不補不攻諺所謂不治病小損命嗟嗟旣不治病復不損命有是理乎

大病有虛而熱虛而寒從未有寒而不虛者蓋虛而熱則非真熱矣虛而寒則爲真虛矣況至純以沉寒病見則爲陽亡氣脫之勢豈特虛而已也故凡一切寒症皆爲虛論縱有外寒直中亦由元陽內虛試思古人中寒必用參朮薑附而曰宜急溫之遲則不救之語可知矣且書曰陽氣一分不盡則不死中寒者陽氣依希之際也故治宜溫補不待言矣然更須審明臟腑蓋臟爲陰必用純陽之藥方馬氏綿囊必錄雜症卷九方脈寒門合參



效。腑為陽。必如陰藥。一二味。制其僭熱。始安然。寒者陰也。夫臟亦陰也。物聚以類。故寒多中臟寒。必傷榮也。

薑附湯

治中寒昏不知人。身體強直逆冷。口禁不語。及腹

乾薑

兩附子生去皮臍細切一枚

每服三錢水煎食前溫服

如挾濕氣虛加參朮

朮附湯

見濕門

理中湯

見前兒科寒門

參附湯

見中風門

生料五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急傷寒發熱

桔梗

蒼朮

米泔水浸去粗皮

陳皮

麻黃

去根節

枳殼

炒



厚朴 乾薑 白芷 川芎 甘草 炙 茯苓

肉桂 芍藥 當歸 半夏 湯泡七次

生薑 葱白 水煎熱服 胃寒用煨薑

夫寒濕屬陰熱燥屬陽善用藥者以苦寒而瀉其陽以辛溫而散其陰未有病之不愈故防風通聖散為四時燥之聖藥生料五積散為散寒濕之聖藥

四逆湯 治陰症脉沉身痛自利不竭

附子 三錢 甘草 乾薑 各一錢 水煎服

脾為太陰而四肢厥冷由於真火無光無氣以布也此方直達中州追復陽氣但寒症必虛此方溫而不補何若理中更為神聖

白通湯 治少陰下利脉微者如服而不應乃陰盛格拒陽藥不能達於少陰加入尿猪胆汁為引取其與陰



同類服後脉暴出者死微續者生
如脉不出如人參
二兩以助之蓋寒未有不極虛者

葱白四兩乾薑兩附子一枚炮
水煎一鍾服服後更

葱熨臍上法或艾炙關元氣海內外協攻務令一時之

內陰散陽回或用醞醋拌炒麤皮袋盛熱熨臍間亦妙

六味附子湯 治寒厥

附子 肉桂 防已各四錢炙甘草二錢白朮各錢茯苓各錢

一方 治陰症用葱白一大握如茶盞大用紙捲緊挾刃

切齊一指厚片安於臍中以熱熨斗熨之待汗出為度

一片未效再一片熨之內服附子理中湯

寒門要藥



北京中医药大学图书馆版权所有

辛散表寒。如防風羌活紫蘇川芎細辛全胡麻黃桂枝生
薑蔥白之類。隨候採用。

溫散中寒。如炮薑厚朴草豆蔻白豆蔻丁香益母

草藁香附子炙甘草煨木香吳茱萸藿香紫蘇艾葉

煨肉果之類。隨候採用。

溫補下寒。輕則如破故紙巴戟天山茱萸枸杞子兔絲子

鹿茸鹿角膠之類。重則如肉桂附子人參炮薑之類。人

參性本溫平。今列於桂附之內者。蓋病有虛而寒。有虛而

熱。未有寒而不虛者。未有虛寒而不溫。補相兼者也。

暑門 兒科



北京中醫藥大學圖書館版權所有

嬰兒之患。夏秋爲甚。蓋火土旺於長夏。正當金水受傷。惟陽陰微已失。天和加之暑熱。陽氣浮於外。生冷戕於中。頭失長養。則不能生金。而病於秋。故素間有夏傷於暑。秋以痲痺亦有卽發爲病。入心則身熱頭疼。心煩口渴。喘滿大腎滿而不知人。入肝則眩暈。入脾則嗜臥。入肺則喘滿。入腎則消渴。更有面垢昏倦。毛聳惡寒。吐利煩渴。狀如傷寒。頭疼身熱。四肢厥冷。但身體不痛爲異。兼暑能耗氣。氣耗則脈虛散無力。然靜而得之者爲中暑。動而得之者爲中熱。更有冒暑以致五心煩熱。頭額亦溫。小便赤少。面合地臥。暑喜傷心。蒙蔽心竅。則昏悶不醒。手足搐掣。用弓反張身。

熱如冷。狀似驚候。名為暑風者。或有吐瀉不已。火性疾也。
元陽驟亡。而變慢驚者。有傷暑暴注。洞瀉。有傷暑。終身
酸者。經曰。諸嘔吐酸暑。注下。迫皆屬於熱。故雖時
之令。實伏陰在內之時。調攝可不慎與。

六和湯 治氣不升降。霍亂轉筋嘔吐泄瀉。寒熱。

縮砂仁 半夏 杏仁 人參 甘草 炙 赤茯苓

藿香葉 白扁豆 薑汁 木瓜 香薷 厚朴 薑汁 製

葛棗永煎服

清膈飲子 治小兒伏熱嘔吐煩渴。五心熱。小便赤少。

香薷 三錢 淡竹葉 人參 半夏 麴 檀香 各二錢 甘草 一錢

馬氏綿囊必錄雜症卷九 兒科暑門諸方



茯苓

錢三 粳米五

薑棗同煎食遠冷服

六一散

一名益元散 一名天水散

治傷暑

一方加辰砂各辰砂益元散 一方加青黛名青黛益元散

滑石

六兩研 細水飛

甘草

一兩 晒燥

為末新汲水或冷燈下

天生白虎湯

治中暑搗西瓜汁濾去滓灌即醒

去杜五苓散

治小兒伏暑作渴

猪苓

白朮

赤茯苓

各五錢

澤瀉

七錢五分

為末用車

煎子燈心同煎湯調服如吐不止加生薑自然汁

方脈暑門合參

暑為陽邪心屬離火故暑先入心從其類也已月六傷盡

出於地上此氣之浮也經曰夏氣在經絡長夏氣在肌肉



表實裏必虛氣熱則走泄故經曰脉虛身熱得之傷暑然
盛熱之氣着人有胃有傷有中三者有輕重之分虛實
辨若腹痛水泄者胃與大腸受之惡心者胃口有熱飲也
此滋者胃暑也可用黃連香薷飲為主隨症加減香薷
退暑執香薷消畜水若身熱頭疼躁亂不寧或身如
者此熱傷在內分爲傷暑也當以白虎湯加柴胡如氣
者加人參若咳嗽寒熱盜汗不止脉數者熱在肺經爲中
暑也此乃盛火乘金急治則可遲則不救宜用天水散之
類卻暑清肺或生脉飲加減主之東垣論暑症同冬月傷
寒傳變爲症不一彼爲寒邪傷形此則暑熱傷氣若元氣