

雄黃

如茶荳大七粒

淮棗七箇去核

右黃每粒藏棗內將鐵線

纏定於油燈上燒以外黑內乾爲度出火氣爲末擦牙根睡去流涎血止爲度

追蟲丸

苦棟根

貢衆

木香

桃仁去皮

尖炒

蕪荑炒

炒

檳榔

各一錢

當歸

鶴虱

炒各一分

輕粉

一錢

角乾蟾

去頭足

黃連

炒各一錢

史君子

肉二十

五粒

爲末細丸

肉汁湯下

疳門要藥

清瘡熱如川黃連胡黃連黃芩梔子地骨皮石斛五穀丹

青黛滑石之類隨候採用○

消瘡化積殺蟲如草龍膽蘆薈雄黃貫眾乾蟾三稜蓬术  
枳實山楂史君子杏仁雷丸檳榔阿魏蕪荑石決明神曲  
香附青皮木香之類隨候採用○

滋陰養血如生地熟地當歸白芍丹皮地骨皮知母黃柏  
澤瀉之類隨候採用○

健脾開胃培元如山藥茯苓白朮縮砂陳皮白豆仁芡實  
人參甘草米仁肉果蓮肉陳米之類隨候採用○

經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔嘔吐者陽明之氣下行則順今逆上行故作嘔吐有熱有寒有食也然始有因傷乳過滿而溢以致導虛胃氣漸成斯症者有之凡有聲有物開口而作者名曰嘔有物無聲者名曰吐有聲無物者謂之噦又有呑乳者乳自流出似簷水射出之象噦者心胸上下氣逆鬱築噦者膈虛胃寒以致噦噦作聲無物可出也然候不一如兒初生有因母有伏痰得之胎氣使然者有因拭口不淨惡水流毒所致者有飲食乍乘又觸驚怒

胃氣受傷。惡食胃痛而致者。若耳後紅紋。兩頰紅紫。氣粗作吐者。此發痘疹之候。如膚削神困。顙動不停。不思乳食。是胃氣虛弱。不能消納。此爲虛吐。如面青唇白。清涎夾乳。喜熱惡寒。四肢淒清。此爲冷吐。至如胃有實火。則吐黃水。而味苦。胸前煩燥。若乘厥陰而入肝。則爲酸。爲逆。多怒煩啼。此爲熱吐。如咳嗽氣急。吐清水而膈悶者。是胃有寒邪。中有頑痰已而成熱。此爲痰吐。若飲食不化。酸臭上逆。惡食不渴。胃痛潮熱者。是傷食傷寒也。若黃痰稠涎。作噫作嘔者。皆火之徵也。如面白毛焦。或面有白斑點子。唇紅或

紫昏困時吐不醒人事。胃口時痛時止而嘔清水者蟲吐也。如唇黑多哭夾痰吐乳者是傷脾也。如身上發熱咳嗽痰鳴夜間煩躁鼻青吐乳者是客風傷肺也。如早晚發熱山根青色吐而不睡者是驚吐也。治吐之法當辨新久寒熱如初吐當導利以順氣下行。吐久者須防胃虛生風故治吐症貴扶胃氣爲要。如吐不已可微止之無使太泄胃氣惟有風疾及夾痰吐者不可遽止否則風無定處更入外風痰熱相生必成驚候其餘諸吐初起及微噦乳便當調治如噦不已卽成吐吐之不已卽成嘔嘔之不已卽成

嘔○嘔之不已卽成嘔○至此胃氣大衰○精神漸脫矣○若至嘔吐不已○日漸沉○困○顙陷○顙腫○青筋大露者○并頻吐不食○昏沉○語塞○喘急○大熱○常嘔腥臭者皆死○又有時時吐唾者○多因腎氣衰冷○不能藏蓄津滋○潤浥心肺○久必漸爲黃瘦○宜煎地黃料浩飲之○又有胃氣衰冷○不能運行津液所致者○此宜溫補胃氣○又有心脾蘊熱○經曰舌縱涎下○皆屬於熱者○宜清理之○屬腎屬胃屬脾○爲虛爲寒爲熱○當以色脉辨之○

論瀉兒科

夫瀉症不同。溏泄滑利洞五瀉是也。溏者似瀉非瀉。糟粕不聚其色似膿泄者無時而作。瀉出不知利者直射濺溜氣從中脘滑者水穀直過腸胃不化。洞者頓然下之如桶散瀆不留當以脉候叅詳而虛實廻別矣。寒瀉者其色必白。熱瀉者色必黃赤。或糞沫射出而遠火性迅速元陽直走毋輕視也。然有久寒之後因虛而生火者。有因熱極而傷寒者。有因實而致虛者。有因虛不運化而似實者。有因渴後頻傷色白似寒者。有因傷久燥澁色黃津液耗亾作渴而似熱者。有因木來剋土色青似驚者。更泄症所屬有

○五有胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄。胃泄者飲食不化其色必黃。脾泄者腹脹滿而泄注。食卽吐逆。大腸泄者食已容迫。大便色白。腸鳴切痛。小腸泄者溲短而便膿血少。腹必痛。大瘕泄者數至圊而不能便。革中亦痛。更有食積瀉者。積聚停飲痞膈中滿。脇肋疼痛。晝涼夜熱。厥口吐酸。豚實者先利而後補。虛者先補而後利。如春月傷風咳嗽而泄瀉者。是表裡俱虛。木旺而土虧也。冬月受寒而泄瀉者。不治卽成慢脾也。中濕而泄瀉者。必腸鳴肚痛手足俱寒。宜宣利其水可也。然泄瀉瘧痢同乎一原。皆由暑月脾。

傷所致飲食爲痰。充於胸膈則爲癰。飲食爲積膠於腸胃  
則爲痢。飲食始傷卽瀉爲輕。停滯既久乃發瘧。痢爲重。又  
凡水瀉而腹不痛。肌肉虛浮。身體重着者。是濕如完穀不  
化者爲氣虛。如腹痛腸鳴。卒痛一陣。水瀉一陣者。是火如  
昏悶痰多。時瀉時止。或多或少者。爲痰如痛甚而瀉。瀉後  
而腹痛減者。爲食積。如面垢煩躁。渴飲水漿。背寒自汗。頭  
熱嘔吐者。爲傷暑。然瀉本屬濕。或飲食傷脾。治法不外乎  
滲濕消導。分利補脾數法而已。然尤宜分寒熱新久。如瀉  
久而元氣下陷者。宜升提之。腸胃虛滑不禁者。宜收瀝之。

利水不可施於久病之後收澀不可投於初起之時而赤  
渴瀉者緩劑宜禁瀉久作渴者涼劑忌投益暴瀉非陰久  
瀉非陽渴者當致不渴方愈謂其邪熱去脾氣復津液生  
也不渴者當致微渴纔痊謂其積滯去陰陽和也如瀉時  
止時發者可發散脾間濕氣後與扶脾可也若交寅時而  
瀉者謂之晨瀉宜爲溫補腎陽益腎開竅於二陰而失閉  
藏之職也故有脾虛肝虛腎虛謂之三虛有因瀉因火因  
痰因虛因暑因積因風因冷謂之八症若吐乳瀉黃是傷  
熱乳也吐乳瀉青者是傷冷乳也糞如臭雞子而肚膨乎

紋紫色而身熱者是瘧瀉也。糞青夜啼或時驚悸者是驚瀉也。初瀉微黃良久則色青者爲臘冷也。便青而夾白膿稠粘如涎者是亦腸寒久則令見腹痛鳴嘯面白形青漸成陰癟總脾者一身之祖百脉之源病則十二經皆病矣。

論吐瀉

見科

凡脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉竝作先吐而後瀉者是中焦之氣不和不能消納必面赤唇紅煩渴溲短厥脈洪數乃受熱之徵也先瀉而後吐者或飲食乍加夜睡肚冷或寒濕傷脾脾傷胃弱而成必面白神倦不熱不渴。

厥脈沉濡是虛寒之可徵矣。又有夏月外傷於暑，內傷於食，陰陽不能升降，乃乖膈而陡發者。又有陽氣不振，而吐瀉不止者。亦有乳母冒暑，兒飲熱乳而然者。凡黃赤紅色爲熱，白色爲寒，青黑爲痛。然吐則傷氣，瀉則傷血，氣虛則發厥，血虛則發熱。氣血俱虛，則身熱而手足厥。繼此必成慢風，可不慎歟。惟痙瀉不成風，候久則亦患無辜，終爲虛乏。如瀉注而脈浮大數者死。或瀉而腹脹，脉弦者死。唇赤生瘡，眼多赤脉者死。久痢作嘔，有聲無物，唇鮮渴逆者死。洞瀉不止者死。瀉如屋漏水而不止，食入則嘔，昏沉眼竄。

手足口鼻皆冷者死舌黑有芒刺此陰竭而孤陽上浮也  
大渴不止者此腎敗也俱死

霍亂大小總論合參

附惡心

霍亂者多得之於夏月外感濕熱風暑內傷飲食生冷陰陽不隔清濁相干上下奔迫氣亂腸胃之間陽不降陰不升邪正相逆中脘節閉擊搏於中卒然吐瀉而揮霍變亂心腹大痛嘔吐瀉利憎寒壯熱頭痛眩暈邪在上焦先心痛則先吐邪在下焦先腹痛則先瀉邪在中焦心腹並痛則吐瀉齊作陽明潤養宗筋吐瀉驟亡津液失其所養甚

則轉筋入腹而癰在小兒脾胃虛弱乳食易停兼外冒寒暑則邪正相攻脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉竝作亡陽變風者有焉治法則宜定吐安胃爲先次以隨症止瀉爲要然濕霍亂死者少乾霍亂死者多乾霍亂者忽然脹滿心腹絞痛上不得吐下不得瀉躁亂昏憒關格陰陽遍體轉筋手足厥冷痰壅腹脹頃刻之間升降不通便致悶絕誤進飲食立致殺人此乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而不能行脾土鬱極不能發越以致火熱內擾所以卒痛手足厥冷惡心嘔噦俗名攬腸沙者言其痛之

甚也。不可過於攻。過攻則脾愈虛。不可過於熱。過熱則火愈熾。不可過於寒。過寒則火悍。格須反佐以治。然後鬱可開。火可散也。北方刺青筋以出氣血。南方括手足以行氣血。俱能散病。然出氣血又不若行氣血之爲愈。况霍亂乃氣病而非血病。刺青筋固能散氣。然血亦因之以傷人之一身。氣常有餘。血常不足。今不足者又從而傷之。是不足之中又不足矣。少壯之人幸或得免。衰老之人多致於死。何則。夫氣爲血之先導。血爲氣之依附。今陰血既虛。則陽失其所依。必然躁越不死。何待。况陽虛必惡寒。陰虛必發。

熱○熱○則○陰○血○愈○消○經○曰○陰○虛○則○病○陰○竭○則○死○惟○宜○以○熟○童○便○入○燒○鹽○少○許○三○飲○而○三○吐○之○宣○提○其○氣○鹽○涌○於○上○溺○泄○於○下○則○中○通○矣○或○有○單○用○淡○鹽○湯○探○吐○之○總○不○出○宣○通○發○越○之○義○蓋○既○有○其○入○必○有○其○出○今○有○其○入○而○不○得○其○出○者○否○塞○也○多○死○得○吐○後○方○可○用○藥○調○理○脈○訣○曰○滑○數○爲○嘔○代○者○霍○亂○微○滑○者○生○瀦○數○凶○斷○又○曰○滑○而○不○匀○必○是○吐○瀉○霍○亂○之○候○脈○代○勿○訝○故○凡○吐○瀉○脈○見○結○促○代○或○隱○伏○或○洪○大○皆○不○可○斷○以○爲○死○果○脈○來○微○細○欲○絕○少○氣○不○語○舌○捲○囊○縮○者○方○爲○不○治○

夫中者上下四旁之樞機若中脘之氣健旺有餘則驅下  
脘之氣於大小腸從前後二陰而出惟其不足則無力運  
之下行反受下脘之濁氣以致胃中清濁混亂爲痛爲脹  
之所由也經曰太陰所至爲中滿霍亂吐下清氣在陰濁  
氣在陽營氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於腸胃則爲霍  
亂○吐瀉之後甚則轉筋此兼風也手足厥冷氣少唇青  
此兼寒也身熱煩渴氣粗口燥此暑病也四肢重着骨節  
煩疼此兼濕也○轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今  
暴吐下津液頓亾內外傷感冷熱不調陰陽相搏而攻閉