

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉 教撰

小兒

小兒病難治

古語曰：宜醫十丈夫，莫醫一婦人。寧醫十婦人，莫醫一小兒。蓋小兒難問，證難察，脈治之尤難。如絲脈，息如毫，易虛易實，易冷易熱，兼之口不能言，手不能指，疾病之莫知非難。

形察色聽，聲切脈，究其病源，詳其陰陽表裏虛實，而能療之者，蓋亦寡矣。（得效）

臟腑生成

夫一月之孕，有白露之稱。二月之脈，有桃花之譬。及其三月，則先生右腎，而為男；陰包陽也。及生左腎，則為女。陽包陰也。其次腎生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，以生其勝。己者腎，屬水，故五臟由是為陰。其次心生小腸，小腸生大腸，大腸生胆，胆生胃，胃生膀胱，膀胱生三焦，以生其勝。己者小腸，屬火。

六府由是為陽。其次三焦生八脈，八脈生十二經，十二經生十二絡，十二絡生一百八十絡。絡絡生一百八十經絡，經絡生三萬四千孫絡。孫絡生三百六十五骨節，骨節生三百六十五大穴。大穴生八萬四千毛竅。則耳目口鼻百骸之身皆備矣。（醫鑑）

初生解毒法：嬰兒在胎口中有惡物，兒纔生不候聲出，坐婆急用軟帛裹手指，蘸黃連甘草濃煎汁拭去口

初生解毒法

中惡物，若燕入腹中，必生諸疾。更以煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中，令嚥下，則一生免瘡痘之患。（得效）

了取黃連甘草煎汁以綿纏下，然後乃飼乳。酌量與之，勿令大飽，恐成吐衄。（良方）

初生洗浴法

三朝洗兒，用虎頭骨、桃枝、猪胆、金銀器煎湯洗之，則兒少驚。尋常澡洗，用猪胆汁入湯中洗之，即不生瘡疥。（良方）

戒之（直指小兒）

初生斷臍法

子在腹中，胞胎十月止於臍中，與母通氣。雖出胞胎，其臍中所通之氣猶未盡絕。斷臍之後，招風致病者有之。其法：初生小兒，綿裹臍帶，離肚五六寸，先用軟綿綳住，腳於線外，將臍咬斷，片

時去線，待血流盡，以手輕輕揉散。父炙臍頭三壯，或五壯，結作紮，給軟帛要裹切，不可常時揭看。待臍根落去，自然無事。（丹心）

初生即將軟綿貼臍根，綳住待第三日離肚。二指許將臍剪斷，用生薑自然汁或香油和麝香臍四圍於臍頭，以艾灸三壯，謂之重臍。後不招風。（丹心）

擇乳母法：凡擇乳母，須精神爽慧，性情和悅，肌肉充肥，無諸疾病，知寒溫之宜，能調節乳食。除汁濃白，則可擇乳母法，以飼兒。不得與餘母大段酸鹹飲食，仍忌饑餒寒暑來，便餵兒。如此，則必成餘癆，或驚疳瀉痢。

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉 教撰

小兒

小兒病難治

古語曰：宜醫十丈夫，莫醫一婦人。寧醫十婦人，莫醫一小兒。蓋小兒難問，證難察，脈治之尤難。如絲脈，息如毫，易虛易實，易冷易熱，兼之口不能言，手不能指，疾病之莫知非難。

形察色聽，聲切脈，究其病源，詳其陰陽表裏虛實，而能療之者，蓋亦寡矣。（得效）

臟腑生成

夫一月之孕，有白露之稱。二月之脈，有桃花之譬。及其三月，則先生右腎，而為男；陰包陽也。及生左腎，則為女。陽包陰也。其次腎生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，以生其勝。己者腎，屬水，故五臟由是為陰。其次心生小腸，小腸生大腸，大腸生胆，胆生胃，胃生膀胱，膀胱生三焦，以生其勝。己者小腸，屬火。

六府由是為陽。其次三焦生八脈，八脈生十二經，十二經生十二絡，十二絡生一百八十絡。絡絡生一百八十經絡，經絡生三萬四千孫絡。孫絡生三百六十五骨節，骨節生三百六十五大穴。大穴生八萬四千毛竅。則耳目口鼻百骸之身皆備矣。（醫鑑）

初生解毒法：嬰兒在胎口中有惡物，兒纔生不候聲出，坐婆急用軟帛裹手指蘸黃連甘草濃煎汁拭去口

初生解毒法

中惡物若燕入腹中，必生諸疾。更以煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中，令嚥下，則一生免瘡痘之患。（得效）

了取黃連甘草煎汁以綿纏下，然後乃飼乳。酌量與之，勿令大飽，恐成吐衄。（良方）

初生洗浴法

三朝洗兒，用虎頭骨、桃枝、猪胆、金銀器煎湯洗之，則兒少驚。尋常澡洗，用猪胆汁入湯中洗之，即不生瘡疥。（良方）

內滲變成風，穠可不戒之。（直指小兒）

初生斷臍法

子在腹中，胞胎十月止於臍中，與母通氣。雖出胞胎，其臍中所通之氣猶未盡絕。斷臍之後，招風致病者有之。其法：初生小兒，綿裏臍帶離肚五六寸，先用軟綿綳住，腳於線外，將臍咬斷，片

時去線，待血流盡，以手輕輕揉散。父炙臍頭三壯，或五壯，結作紮，給軟帛要裏切，不可常時揭看。待臍根落去，自然無事。（丹心）

○初生即將軟綿貼臍根，續往待第三日離肚。二指許將臍剪斷，用生薑自然汁或香油和麝香臍四圍於臍頭，以艾灸三壯，謂之重臍。後不招風。（丹心）

○先斷臍帶，可只留二寸許，以線繫定，然後洗浴。不然，則溼氣入腹，必作臍風之疾。（良方）

擇乳母法

凡擇乳母，須精神爽慧，性情和悅，肌肉充肥，無諸疾病。知寒溫之宜，能調節乳食。除汁濃白，則可擇乳母法。以飼兒，不得與餘母大段酸鹹飲食，仍忌饑餒寒暑來，便餵兒。如此，則必成餘癆，或驚疳瀉痢。



之疾(良方)○如陰陽交接之際切不可餓兒除此正謂之交始必生癖(良方)○餘母不可頻飲酒恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾(良方)○乳母宜謹節飲食飲食下咽乳汁便通情慾動中乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瀉則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治母安子安可消患於未形也(東垣)○夫飲食之擇猶是

小兒乳哺法

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月方圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹(東垣)○凡初乳先須捏去宿乳後與之○母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足也○兒啼未定乳母勿遽以乳飲之恐停滯胸膈而成嘔吐也○乳後不與食哺後不與乳乳食相併則難以化結於腹中作痛大抵成癖成積成疳皆自此始(得效)○小兒血氣俱盛食物易消飲食無時然腸胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕只與乾柿熟菜白粥非惟無病可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可為養陰之助然栗大補柿大瀉亦宜少與(東垣)

小兒保護法

凡嬰兒肌膚未實若厚衣過暖則傷皮膚損血脈發瘡瘍汗出腠理不開風邪易入若天氣和暖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風寒不致疾病令人懷抱小兒不著地氣致令筋骨緩弱之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰臥恐成驚風時作一二豆袋令兒枕兼左右附之可近乳母舊衣作衣服不可用新綿絹只用舊者若太溫煖則筋骨軟弱易致疾病(良方)○天寒時兒用父母常著舊衣作衣服改作小兒衣衫真氣相滋令兒有壽富貴之家切不可新製絨綾羅之類與小兒穿不惟生病抑且折福(回春)○初生三五月宜繃縛令臥勿

養子十法

一要背暖○二要肚暖○三要足暖○四要頭涼○五要心胸涼○六要勿見怪物○七脾胃常要溫○八啼未定勿便飲乳○九勿服輕粉朱砂○十少洗浴(入門)

調護歌

養子須調護看承莫縱弛○乳多終損胃食變則傷脾○被厚非為益衣單正所宜○無風頻見寒暑順天時(入門)

變蒸候

小兒變蒸俗謂之牙生骨長比如蠶之有眠龍之蛻骨虎之轉爪皆同此類變生而長也(醫林)○小兒變蒸是胎毒散也(丹心)○變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前向者長生藏府意智故也何謂三十二日長骨脈添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心一百二十八日四變二蒸生小腸一百六十日五變生肝一百九十二日六變三蒸生胆二百二十四日七變生肺二百五十六日八

變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其子厥陰心包手少陽三焦無形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

氣入四肢長碎骨於十變是矣(錢乙)○變蒸既畢兒乃成人也變者變生五藏也蒸者蒸養六腑也
又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或泄或
煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上唇中心發白泡狀如
魚目珠者是也治法和平之劑微表之宜用惺惺散(方見下)熱實則微利之宜用紫霜五(方見下)
或不治亦自愈切不可妄
投藥餌及針灸(錢乙)

小兒繼病

母有娠乳兒有病如瘡痼他日亦相繼腹大或發或去取百勞鳥毛帶之一名則即傳勞也
又以紅紗袋或皮明砂與兒佩之(海藏)○小兒生十餘月後母又有娠令前兒精神不爽

身體痿痺名為魋病(魋音忌小兒鬼病也)用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五次灸令香熱
嚼哺兒亦效伏翼即蝙蝠也(聖惠)○婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳則作鬼病令
此病魋亦小兒也其證微微下利寒熱往來毛髮鬢鬢不脫者是也宜服龍胆湯三因

龍膽湯

大黃煨二錢龍胆草黃芩胡黃苓桔梗鉤藤皮赤芍藥赤茯苓甘草各一錢錢蟬二個右剉作
一貼水一升煮取五合去滓一月內兒服一合十歲以下服二三合得下利即止(千金)

相兒命長短法

凡兒三歲以上十歲以下視其性氣高下即可知其天壽○兒少時識悟通敏過人者多夭
預知人意回旋敏速者亦夭○兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽○初


生叫聲連延相屬者壽○聲絕而復揚急者不壽○啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如脂膏常
搖手足頭毛不周匝者並不成人○膺中無血者好○膺小者偏身軟弱如無骨者汗血者多厄並不
壽○鮮白長大卻縫通達黑者並壽○目視不正數動者大非佳兆○早坐早行早語早齒皆惡性非
佳人○髮稀小者性強不聽人○頭上有旋毛妨父母或早貴○初生枕骨不成能言而死○尻骨不
成能踞而死○掌骨不成能匍匐而死○踵骨不成能行而死○膺骨不成能立而死○身不收
者死○股間無生肉者死○人中深長者壽○陰不起者死○陰囊下白者死赤者亦死(得效)

虎口三關脈法

初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子(回春)○小兒初生至半歲看頭脈一歲至五歲六
歲曰嬰孩察三關脈三關在二節名曰氣關脈見則病重尚可治○第三節名曰命關脈見則
病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死(入門)○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚

風關無脈則無病有脈則病輕○第二節名曰氣關脈見則病重尚可治○第三節名曰命關脈見則
病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死(入門)○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚
黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風候○第二節紫紋乃驚青紋乃驚
肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑色紋難安○第三節青黑紋三關通度斜歸指印則不治
得效)○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫或作青或作黑青黑之色至純黑則
不可治(入門)○歌曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃則困脾端(本事)

三關圖




三關在虎口次指之側
第一風關第二氣關第三命關也決病輕重死生

診小兒脉法小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣口之脈常以一息六七至為常（入門）○上歲合歲一息五六至為常（入門）○小兒之脈以一指按三部脈而以一息七八至為平十一至十四歲曰童形以

小兒脈亂不須治（不須治藥也）○弦急氣不和○沉緩傷食○促急虛驚○浮為風○沉細為冷（錢乙）○浮緩傷風洪緊傷寒數則為熱遲則為寒（入門）

觀形察色圖



額上屬心火居南○左頰屬肝木居東○鼻準屬脾土居中○右頰屬肺金居西○頰下屬腎水居北

左頰為肝右頰為肺天庭為心地閣為腎準頭為脾凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛○天庭為火色紅主大熱青乃肝風○印堂青者人驚紅白者水大驚紅者痰熱○印堂連準頭紅者三焦積熱○印堂至山根紅者心小腸熱山根至鼻柱紅者心胃熱○鼻居面中為脾紅黃色者無病○脾應唇紅至渴咽蟲咬心頭者唇必反人中唇際也黑者瀉痢死紅色熱痰壅盛或青色驚風黑色為痛中惡黃色傷食吐利○左太陽青色驚輕紅色傷寒黑青色乳積○右太陽青色驚重紅色風搖眼目黑者死○地閣為腎色青食時驚或頭暈夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩頤赤者肺熱○山根青黑顯見哭厄必死黑色痢疾赤黑色吐瀉黃色霍亂紅色夜啼紫色傷飲食○中庭天庭司空印堂額角方廣皆門部位青黑為驚風惡候亦忌損陷(入門)

面上形證歌

赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停○青脈生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微紫熱黑青知是乳多傷○右邊青脈不須多有則頻驚怎奈何紅赤為風抽眼目黑青三日見闔羅(正傳)

五體以頭為尊一面惟神可恃

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目眵無鋒芒如魚鰕眼狀或兩眼閉而黑睛朦朧者死或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或赤者稟弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淡黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱也(入門)

聲有輕重啼有乾溼

聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者神驚也聲寒者痰也聲濁沈靜者疳積也如生來不啼哭聲嘶啞者天○火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必死夜半發者多有口瘡宜看之(入門)○睡中驚啼聲浮者易治聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治(得效)○直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多淚者是驚也慈煎聲煩躁者難愈躁促聲音者感寒(入門)

小兒初生救急

有治法十八條詳見婦人門

噤口撮口臍風證

噤口風者眼閉啼聲漸少舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通此胎中熱毒流於心脾一名鵝口瘡○鵝口瘡小兒初生有白屑滿口如鵝之口鼻外亦有不能吮乳由心脾熱也以亂髮纏指頭蘊薄荷汁拭淨如不脫用保命散朱礬散(入門)○又法用一捻金散又亂髮纏指頭蘊并花水搽拭之又蘊栗煮汁(栗皮也)拭之(湯氏)○辰砂膏最妙(方見下)○又地雞樹水塗之妙(即亂髮也)

又白楊樹枝燒取溼付之神效(正傳)

撮口

凡面目黃赤氣喘啼聲不出乃胎熱流毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用白礬蠶二枚略炒為末蜜調付唇口即差或用蠟梢散(入門)○撮口者初生一臘內之篤疾(一臘三七日也)令

兒氣促口撮如囊而不乳也（直指小兒）○治法牛黃一錢竹瀝一合調和時抹口中即差宜風散亦可（丹心）○撮口證若口出白沫四肢冰冷最為惡候一臘見之尤急（得效）○初生七日內患撮口膈風不得飲乳急看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以手指蘸溫水輕輕擦破即開口便安不用服藥（入門）○小兒口撮不開南星末一錢腦子少許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上立開（綱目）

膈風

凡小兒斷膈後為風溼所乘或尿溼細裙遂成膈風面赤喘急啼聲不出其證膈腫突腹脹滿日夜多啼不能飲乳甚則發搐撮口撮口宜用調氣益黃散甚者用金烏散或宣風散（入門）○亦稱驚在胸堂伸引努氣亦令膈腫發風宜千金龍膽湯（入門）○膈風撮口不得飲乳宜蠟梢餅宣風散（入門）○凡膈邊青黑爪甲黑者死（得效）○初生七日內見撮口撮口膈風三證者危百日內見此證手足踈者亦不治（入門）

臍腫膈瘡治法

臍腫以荊芥煎湯洗淨後取葱葉火上炙過候冷指甲刮薄貼臍處次日便消方服通心散（入門）○斷膈後為水溼所傷或入風冷致令四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜用枳灰皆可付之（入門）○斷膈作瘡白瘡枯龍骨煨當歸末皆可糝上或油調付之妙（綱目）

保命散

治鵝口瘡不能吮乳枯白瘡朱砂各一錢馬牙硝五錢右為末每取一字用白鵝糞搗水調塗舌上及口內日三次即效（入門）

朱攀散

治同上朱砂白礬枯右等分為細末付口舌上日三（局方）

一捻金散

治同上雄黃三錢鵝砂一錢甘草半錢龍腦少許右為末乾煨或蜜調塗之（丹心）

蠅梢散

治撮口風及一切胎風膈風蠅梢四十九枚每個用生薄荷葉卷定以線扣之砂鍋內滾炒以薄荷乾酥為度再入白礬薑四十九個薑汁炒乾入腦麝各少許右為細末調勻以紫雄雞肝二片煎湯調下一（入門）

宣風散

治膈風撮口多啼不乳口出白沫全蝎二十一箇金者酒炙為末入麝香末一字和勻每取半字以金銀器煎湯調下（丹心）

調氣益黃散

治撮口風三證金頭赤足蜈蚣一條酒浸炙蜈蚣四箇白礬薑七箇炒薑麥五分右為末每一字以鵝翎管吹入鼻中噴嚏啼哭則可治仍用薄荷煎湯調一字服之（錢乙）

金烏散

治膈風金頭赤足蜈蚣半條酒浸炙川烏尖三個生麝香少許右為末每取半字以金銀器煎湯調下（入門）○一名麝香散（得效）○一名定命散（丹心）

通心飲 治旋螺風赤腫而痛清心火通小便退潮熱連翹木通瞿麥梔子仁黃芩甘草各四分
右剉作一服入燈心麥門冬同煎服(得效)○臍中腫突出似旋螺故名之(得效)

栢墨散 治臍風臍腫多啼不能乳哺黃栢木釜下墨亂
髮灰各等分爲末乾糝之或油調付之(錢乙)

五通膏 治臍風腫口生地黃生薑葱白蘿蔔子田螺肉右共
搗爛搭臍上四圍一指厚抱住下屁泄而愈(醫鑒)

香螺膏 治臍風腫硬如盤田螺三個入麝香少許右
搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消(醫鑒)

客忤中惡 謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀鮮雜面變五色腹痛反側癰瘕狀似驚風但眼不上竅
客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未識見之人觸之或經神廟佛寺與鬼神氣相忤也故
謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀鮮雜面變五色腹痛反側癰瘕狀似驚風但眼不上竅

耳其口中懸雍左右若有小小種核即以竹針刺潰之或以指爪摘破急作醋炭卓角燒烟薰之
蘇合香丸(方見氣門)薑湯調化頻與服之次服雄麝散兼用黃土散(得效)○中惡者其狀卒然心
腹刺痛悶亂欲死人中青黑即服蘇合香丸未醒以免用末吹鼻兼用辟邪膏又以唾和麝香各錢重

研和醋一合服之即差(錢乙)○客忤取致三合水溼搗爲丸雞子大摩兒顙上及足心各五六遍次
摩臍心及上下良久中自有毛於路上即擲之(得效)○中

馬汗氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏兒面以差爲度(入門)

雄麝散 治客忤雄黃一錢乳香五分麝香一字右爲末每一字
刺雄雞冠血調灌之仍以母衣覆兒身即愈(入門)

黃土散 治小兒卒客忤寤心黃土蚯蚓糞各等分
右研細水調塗兒頭上及五心良(得效)

辟邪膏 治小兒中惡降真香白膠香沈香虎頭骨人參兔箭羽草龍胆各五錢右爲末入雄黃五錢
麝香一錢煉蜜和勻作膏取少許以乳香湯化下兒口中又令免帶及燒臥內尤妙(錢氏)

夜啼 小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰口瘡重者四曰客忤○寒則腹痛而啼面青白口有冷氣手足
冷腹亦冷曲腰而啼又曰下半夜啼者蓋夜則陰盛寒則作痛所以夜半後啼也宜用六神散益黃散

(方見下)○熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹脹或有汗仰身而啼又曰上半夜啼身有汗而啼
面赤身熱者必痰熱也到曉方息導赤散(方見五藏)加黃荳煎服通心飲(方見上)亦可○口瘡重

舌則吮乳不得口到乳上即啼身頭皆微熱急取燈照口若無瘡則舌必重也照口瘡重舌類治之其
啼自止○客忤者犯客忤夜啼或觸生人氣忤犯而啼有口啼驚夜必黃昏前後尤甚者乃客忤中惡

也錢氏安神丸主之(方見下)○依客忤法治之○月內夜啼驚搖者乃胎中受驚所致宜用猪乳膏
鎮驚散有痰者抱龍丸(方見下)○小兒夜啼作心經有熱有虛治之宜用燈心散黃連飲蟬花散(

綱目)○夜啼不止蟬蛻二七枚去足爲末入朱砂末一字蜜調送下(綱目)○又法潛取雞窠草一
握置小兒臥席下即止(丹心)○初生月內多啼者吉胎熱胎驚皆從此散且無奇疾(入門)



六神散

治腹冷痛夜啼白茯苓白扁豆炒各二錢人參白木山藥炒各一錢甘草炙七分右為粗末每取一錢入薑三棗二水煎服（得效）

豬乳膏

治胎驚夜啼琥珀防風各一錢朱砂五分為末豬乳汁調一字林兒口中（入門）

鎮驚散

治同上朱砂牛黃麝香各少許右合細研豬乳汁調稀抹入口令嚥下（回春）

燈心散

治小兒心躁夜啼燈心三四顆研細以燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三〇一方燈心七枚膽砂一字朱砂少許研細蜜調抹唇上立止（三因）〇一名花火膏（正傳）

黃連飲

治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢半甘草炙五分青竹葉十片生薑一片右對水煎取汁灌口中（丹心）

蟬花散

治小兒夜啼狀若鬼祟蟬殼下半截為末初生兒搽一字薄荷湯入酒少許調下即止或以上半截為末依湯調用啼復如初古人格物之妙如此（永類）

五藏所主虛實證

虛則補其母實則瀉其子必先實母後瀉子也〇凡五藏各至本位即氣盛不得通故喜仰臥使氣得上下通也〇心氣熱則合面臥實則仰臥也蓋實則氣上下遊若合面而臥則氣

心主驚

實則叫哭發熱飲水而搖〇心氣熱則合面臥實則仰臥也蓋實則氣上下遊若合面而臥則氣不得通故喜仰臥使氣得上下通也〇心氣熱則合面臥實則仰臥也蓋實則氣上下遊若合面而臥則氣

肝主風

實則目直視大叫呵欠項急煩悶〇實則兩臂俱緊不轉直視凡目青必發驚咬牙呵欠目連筋不搖宜地黃丸（方見五藏）〇肝病風搖拘急實則風搖力大瀉

脾主困

實則困睡身熱飲水〇脾病困睡泄瀉不思飲食〇實則多睡體重昏倦困睡不露睛身熱渴飲飲水泄瀉赤黃色宜瀉黃散（方見五藏）〇虛則吐瀉生風或泄瀉白色睡露睛或有痰宜錢氏

白朮散（方見下）

肺主喘

實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者〇肺主燥自病則喘嗽實則喘而氣盛或渴宜瀉白散（方見五藏）〇虛則哽氣長出氣短〇肺病悶亂哽氣長出氣短虛則唇白色喘而少氣先服益

黃散後用阿膠散（二方並見五藏）

〇肺藏怯則唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣急喘促哽氣者難治肺虛損故也〇脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故曰怯此以唇診

肺之法也唇白色者

肺藏怯也（錢乙）

肺藏怯也（錢乙）

肺藏怯也（錢乙）

肺藏怯也（錢乙）



腎主虛

無實○腎病目無精光○明體骨重○腎虛者兒本虛怯由胎氣不或則神氣不足留中白睛

而致腎虛者非此類也○又腎不足下竅蓋胃重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣虛則畏明皆宜

補腎六味地黃丸主之○方見五藏○腎主寒自病則下竅足熱下竅者骨重惟欲墜下而身縮也

變黑陷則是腎實水尅退心火也○錢乙○腎虛者下竅足熱下竅者骨重惟欲墜下而身縮也

身也足熱者不喜覆衣也○心氣熱則上竅宜導赤散腎氣虛則下竅宜地黃丸○錢乙○

五臟相乘○凡五藏自病者為正邪○妻乘夫為微邪○母乘子為虛邪○子乘母為實邪○夫乘妻為

而調之餘藏微此○入門○所謂乘者猶乘車之乘五藏相乘莫測如肝病必先治肺補腎後者肝藏虛實

從所勝者為微邪○即妻乘夫也○從前來者為實邪○即子乘母也○從後來者為虛邪○即母乘子也○五

藏傳變皆疫為患蓋疫乃風苗火靜則伏於脾火動則壅於肺疫火文作則為急驚或成嗽癰瘰癧火結

滯則為癰釣或為咳嗽痰火來去則為瀉青皆由脾淫而成所以驚風忌純用風藥當以養血藥為使

古方保元湯加白芍藥為慢驚美劑也○入門○

驚風證○小兒之病急慢驚風與夫痘疹等症最為酷疾以其急凶反掌生死頃刻故也○正傳○小兒驚風

三發則為癰乃惡證也○入門○小兒疾之最危者無越驚風之證驚有急驚慢驚慢脾風三者之

異○醫

驚風先見之證○驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸而生風也○得效○驚邪入心則面紅

臉赤惕惕夜啼○驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視○驚邪入腎則面黑惡叫嚙餘咬牙○

驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏○驚邪入脾則面色淡黃嘔吐不食○直小○凡乳兒欲發驚風者

先神志不定恍惚懼人○目上視左顧右盼○手握拳○悶鬱○驚風先證也○直小○凡乳兒欲發驚風者

小○目赤兼青者發驚○肝藏實熱手尋衣領亂捻物目直視必發驚○肝有風目連劄不搖有熱則目

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

圖書

縮○二擗者十指開合擗之不已即成握拳男子看大拇指指其指握在外為順在裏為逆女子反看之
○三擗者肩膊搖擗或連身跳起○四顫者或手或脚或頭或身四體顫動○五反者身首反張○六
引者以手有如挽弓狀男左手直右手曲為順右直左曲為逆女子反看之○七望者眼上竄高男
子上竄為順下竄為逆女子反看之○八視者男子斜目視左為順視右為逆視女子反看之○九

驚風大抵執論虛實證別逆順治有後先

蓋實熱為急驚虛熱為慢驚慢驚本無熱所以熱者虛也然

故曰執論虛實者此也○男搖左視左女搖右視右○男順左竄左眼左下竄○男握指指出外女握指
指入裏○男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有難痊故曰證別逆順者
搖順則無聲搖逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰證別逆順者
此也○熱或生痰痰或生驚驚或生風風或發搐治搐先於截風治風先於治驚治驚先於治痰治痰
先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也○直搐○凡搐
因氣鬱鬱氣順則痰化而搐自止先以蘇合香丸○方見氣門○以薄荷湯入薑汁化下或星香散○方見
入門○

驚搐之證有五

驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒

晨寅卯辰時者肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸○因潮熱發搐在巳午未時者心旺也
當補肝治心補肝地黃丸治心導赤散涼驚丸○方見下○因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之
時也是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散蓋脾病肝強法當補脾恐木賊害故先瀉心肝
以剋其強而後補脾○因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也當補脾治心補脾益黃散治心
導赤散涼驚丸○方見錢乙○

搐搦癇瘳輕重

百日內發搐真者不過兩三次必死假者頻發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋氣

血未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之○方見下○
(錢乙)○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者多是外感或內傷夾驚而成謂之假搐非內
生驚癇也宜參蘇飲○方見寒門○人參羌活散○方見下○入門○○搐搦者手足牽引一伸一縮即瘳
瘳之甚者也○河間○問孝忠曰似搐而不甚搐此名瘳瘳○凡搐男左女右為順男左女右為逆難治○急驚初則搐搦俱作久而搐佳只擗有急有緩但只肩動瘳瘳瘳者候之輕也搐則或也
擗又重也○
(直小)○

驚搐有聲無聲

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發
時證○又曰男反右視女反左視亦皆有聲○錢氏○男為水故左視木位無聲右視金位

相擊則有聲女為金故右視金位無聲左視木位有聲相擊故也（易老）○一童子三歲發搐自脚至已目右視大叫哭錢氏曰此逆也男為陽木發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝來也右肺金也逆則二藏相戰金木相擊而有聲也治宜瀉其肺後治其肝後治其心（錢乙）

驚風發搐不可把捉

小兒急驚風方搐時不用驚擾此肺後治其肝後治其心（錢乙）視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其肝後治其心（錢乙）

胎驚癇風

此乃孕婦嗜慾忿怒驚撲或傷風邪兒初生下即嘔吐搐掣口眼喎斜驚啼聲短腮縮頭開或煩赤或面青噤口咬牙眼合涎潮筋骨拘攣身腰強直臍腹腫起與噤口撮口同證視其肩關氣色紅赤者生青黑者死辰砂膏最妙猪乳膏鎮驚散（二方並見上）太乙散亦佳（入門）

辰砂膏

治胎驚癇風及噤口風辰砂三錢玄明粉二錢鵬砂馬牙硝各一錢半全蝎真珠末各一錢麝香一字右為末油紙封裹自然成膏每取一豆許薄荷湯調下或乳汁調塗乳頭上令兒吮之（入門）

太乙散

治胎驚天葵子天南星白附子天麻防風白茯苓各二錢全蝎朱砂各一錢麝香一字右為末每取五分乳汁化下（入門）

急驚風

急驚者因聞大聲或大驚而發搐過則如故此無陰也當下之宜利驚丸○急驚者內有熱即生風或因驚而發涎潮搐搦身熱與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故用藥利下痰熱心神安寧即愈（錢乙）○急驚乃卒然得之心受驚肝主風致筋脈搐搦肝又主筋宜通心飲（方見上）瀉青丸涼驚丸大青膏（得效）○急驚者因聞不常之聲或遇禽獸之吼以致牙關緊急壯熱涎潮鼠視反張搐搦顛動口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二藏交爭血氣併痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣著感而無所泄故暴烈也（直小）○治法通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後急須和胃鎮心○截風定搐先與開關散○驚風散次與驅風膏鎮心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼化風丹靈神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安心神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂治法（直小）○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸（得效）○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐（直小）

神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安心神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂治法（直小）○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸（得效）○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐（直小）

神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安心神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂治法（直小）○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸（得效）○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐（直小）

神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安心神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂治法（直小）○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸（得效）○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐（直小）

神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安心神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂治法（直小）○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸（得效）○急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去則無風風散則不搐（直小）

利驚丸

治急驚身熱面赤口中氣熱大小便黃赤宜下用此黑丑頭末五錢天竺黃青黛輕粉各一錢右為末蜜丸豌豆大一歲兒用一丸薄荷湯化下(錢乙)

溫驚丸

治急驚虛證牛胆南星四兩天竺黃一兩朱砂一錢半胭脂半錢龍腦五分右末牛胆汁和丸艾實大砂糖水化下(一名粉紅丸)(錢乙)

涼驚丸

治急驚風黃連一兩草龍胆防風青黛各三錢龍腦五分牛黃麝香各一字右為末麴糊和丸粟米大每取一十九金銀泡湯下(錢乙)

瀉青丸

治肝熱急驚搐搦(方見五藏)退(得效)

大青膏

治急驚風宜用此發散白附子一錢半天麻青黛各一錢烏蛇肉蝎梢各半錢朱砂天竺黃麝香各一字右細末生蜜和成膏月內兒糲米大半歲兒半皂子大一歲兒一皂子大以薄荷竹葉煎湯化下

(得效)

開關散

治驚風口喙不開蜈蚣一條炙白殭蠶南星炮各一錢麝香一字猪牙皂角三錢略燒存性右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥三兩點於口中涎出自開(得效)

懷驚散

治急驚慢驚昏迷不省半夏生一錢皂角半錢右為末取豆許吹入鼻中即醒(得效)

驅風膏

治肝風發驚搐及胎風辰砂蝎梢當歸草龍胆川芎梔子大黃羌活防風甘草各一錢右為末入麝香少許砂糖和丸艾實大每一丸薄荷竹葉蜜湯化下(丹心)

鎮心丸

治急驚風安心止驚散邪京廂山藥白茯苓各一兩寒水石甘草炙各七錢半甜硝白者朱砂各五錢人參一錢半龍腦麝香各五分右為末蜜和每一兩作五十九金箔為衣薄荷湯下丸(錢乙)

鎮肝丸

治急驚風熱天竺黃生乾地黃當歸竹葉草龍胆川芎大黃煨羌活防風各二錢半右為末蜜丸艾實大每一兩作五十九金箔為衣薄荷湯下丸(綱目)

錢氏安神丸

治急驚風及心執驚啼麥門冬馬牙硝白茯苓山藥寒水石甘草各五錢朱砂三錢龍腦二字右為末蜜和兩作三十九每服一丸砂糖水化下(得效)

鎮驚丸

治急驚風鎮驚寧神退熱化痰牛胆南星五錢朱砂三錢半琥珀天竺黃雄黃各三錢牛黃二錢真珠一錢麝香半錢金箔十片右為末麴糊和丸梧子大金箔為衣薄荷薑蜜湯下五六丸(正傳)

保幼化風丹

治驚風四證八候去風痰驚熱南星半夏川烏白附子各一兩鬱金五錢右為末裝入臘月黃牛胆內陰乾百日取出研為末每一兩入雄黃朱砂鵬砂焰硝各一錢片腦麝香各少許

共為末蜜丸豌豆大燈心薄荷湯研化下一二丸(醫鑑)

靈神膏

赤茯苓朱砂各一兩麥門冬五錢麝香二錢半右為末蜜和作小餅子每一餅臨睡以薄荷湯化下神效○一老醫乃三世小兒科家傳只有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜使用



驚風藥只以導赤散(方見五藏)加防風竹葉同煎用二三貼道去心經邪熱其搖便止次服靈神膏(集驗)

抱龍丸

治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心脾用藥也牛胆製南星一兩無胆星則只取生者製熟用之天竺黃五錢雄黃朱砂各二錢半麝香一錢右為末煮甘草膏和丸如芡子大(錢七)抱龍丸

截風丸

治驚風痰搐天麻白蠟蠶南星炮各二錢蜈蚣一條白附子防風朱砂全蝎各一錢麝香一字右為末蜜丸梧子大每一丸薄荷湯化下(入門)

金箔鎮心丸

治驚風鎮心安神全蝎大個以薄荷葉包裹慢火炙乾天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角朱砂麝香甘草各一錢右為末蜜丸丸如芡子大金丹箔為衣每取一二丸薄荷湯化下(入門)

寧心膏

治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭睡中驚覺朱砂一錢人參白朮茯苓茯神山藥羌活甘草各一錢龍腦麝香各一字右為末蜜丸丸如芡子大以薄荷湯化下(入門)

防風溫膽湯

治驚風消痰疎風順氣半夏枳殼赤茯苓各五分陳皮防風各二分半人參二分其藥一分半右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚丸小驚丸服之(得效)

大驚丸

治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去皮蚌粉炒甘草炙各五錢人參赤茯苓白朮朱砂麥門冬木香代赭石醋煮各二錢半白礬蠶桔梗尾各一錢二分半全蝎三個金銀箔各三片右為末蜜丸梧子大金丹箔為衣薄荷湯化下(得效)

小驚丸

治驚風驚金龜角水浸煮黃連馬牙硝木香藿香草龍胆各二錢半全蝎三個右為末麴糊和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金銀箔為衣薄荷湯化下(得效)

急驚風不治證

眼睛翻轉口中出血兩足攣跳肚腹搖動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下通關不噤心中執痛忽大叫者皆不治(醫鑒)

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼目上視手足痠痲面色青白渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風木瓜仁煎服(得效)○慢驚者因吐瀉日久中氣大虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠痲蓋脾虛則生風風盛則筋急宜用黃音湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子加腦脂銀粉巴硝等一切禁衛(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

也○凡兒瀉出青色者由脾土受肝木克勝而見本色由其藏之虛寒黃者益黃散主之○小兒慢驚或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用來復丹(方見寒門)五粒研碎米飲送下即效(得效)○慢驚宜用溫驚丸神效散觀音散全蝎觀音散三味天漿子散補脾湯保生丹降生丹參朮半夏湯防風丸銀白散(諸方)○延威宜奪命散(方見下)雙金丸南星飲(諸方)

白朮散 治吐瀉日久不止津液枯竭煩渴引飲欲成慢驚風葛根二錢人參白朮白茯苓木香藿香甘草各一錢右粗末每二錢水煎任意服○泄瀉加山藥白扁豆肉豆蔻已成慢驚加天麻細辛全蝎白附子○驚風泄瀉煩渴皆津液內耗也不問陰陽多煎滿意取足飲之彌多彌好○一名錢氏白朮散(錢乙)○一名青寧散(得效)

益黃散 治慢驚風黃者二錢人參陳皮各一錢白芍藥七分甘草炙甘草各五分白茯苓四分黃連一分右粗末水煎時服○一名黃者益黃散凡驚風瀉青色大禁涼驚丸蓋風木旺必尅脾土當先實其土後瀉其木也當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼使脾土中金旺火衰則風木自虛矣(東垣)

黃芪湯 治慢驚風大便泄青色黃者二錢人參一錢甘草炙甘草五分右作一貼水煎服加白芍藥一錢此證風木旺必尅脾土宜先實其土後瀉其木是為神治之法○一名保元湯(東垣)

溫白丸 治慢驚風白瀉瀉必白附子生南星炮各一兩天麻生五錢全蝎一錢右為末麩糊和丸藜豆大生薑米飲下五七丸至二三十丸(錢乙)

加味木附湯 治吐瀉後變成慢驚或因藏寒洞泄得者附子炮白朮各一兩肉豆蔻二個木香甘草炙各五錢右粗末每一錢薑三棗二水煎服(入門)

醒脾散 治脾困胃沈吐瀉不止漸成慢驚人參白朮白茯苓白附子白礬薑木香各五分全蝎二分半右粗末每一錢薑三棗一水煎漸漸服不可頓服(綱目)

釀乳方 治慢驚風人參木香藿香沈香陳皮神麴麥芽各一錢丁香五分右剉作一貼入薑五片紫蘇五葉棗三枚同煎乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥雲時次令兒吮數口不可過飽如嘔定急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散此良法也如此調理無不愈者(湯氏)

八仙散 治慢驚虛風天麻白附子白芍藥肉防風南星半夏麩冬瓜仁全蝎各二分半加川烏一分右剉作一貼入薑二棗一薄荷二葉同煎服(湯氏)

烏蝎散 治慢驚純陰吐瀉不止四君子湯(方見氣門)加川烏

蟬蝎散 治慢驚風證尚在宜用此藥全蝎七個蟬退二十一個南星一個甘草二分半右粗末每一錢入薑三片棗二枚水煎服(入門)

神效散 治慢驚風○歌曰一粒丁香一個蝎一字辰砂一點血○右三味俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸藥末擦兒唇上即愈(綱目)

觀音散

治脾困多瀉不思乳食精神昏困四肢冷欲成慢驚人參一錢蓮肉神麴各二分白茯苓一分半白朮黃耆木香白扁豆甘草各一分右剉入薑二葉一薑香三葉同煎服（入門）

金蝎觀音散

治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風即前方加羌活防風天麻全蝎也（入門）

三味天漿子散

治慢驚風天漿子白蠟蠶全蝎各三分右為末每服一字薄荷湯調下（直小）

補脾湯

治慢驚風白朮一錢三分白芍藥酒炒一錢白茯苓半夏各七分陳皮黃耆蜜水炒人參各五分肉豆蔻煨乾葛神麴炒各五分黃連炒甘草炙各三分右剉作一貼水煎稍服（醫鑑）

保生丹

治慢驚風朱砂天麻白附子炮白蠟蠶炒全蝎微炒各二錢乾薑炮牛黃麝香各一錢右末蜜丸麻子大薄荷湯下三丸（直小）

延生丹

治同上南星炮二錢半朱砂牛黃羌活各一錢二分半麝香六分蝎梢七枚白蠟蠶三枚右為末蜜肉和丸菜豆大薄荷湯化兩丸服之（直小）

參朮半夏湯

治慢驚風子母俱服人參白朮各二錢半夏天麻各七分白茯苓陳皮各五分細辛薄荷甘草各二分全蝎炒一枚右剉作一貼薑三水煎服（正傳）

防風丸

治慢驚風天麻防風人參各五錢全蝎白蠟蠶甘草各二錢半朱砂雄黃各一錢七分半右為末蜜丸艾實大參湯或冬瓜仁湯化下（得效）

銀白散

治慢驚風祛風助胃蓮肉白扁豆白茯苓各二錢白附子炮人參天麻全蝎炒木香薑香甘草炒各一錢陳米炒三錢右粗末每二錢入薑二片冬瓜仁七粒同煎服（得效）

南星飲

治慢驚脾困涎涎不思乳食大南星一個炒赤冬瓜仁白扁豆薑汁炒各三錢右為末每二錢以薑二片防風少許同煎服（得效）

雙金丸

治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風金液丹（方見寒門）與青州白丸子方見風門等分同碎生薑米飲調灌之惟多服乃效雖至危者往往死中

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）

驚風治驗

方見本書其兒即開目而至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯服方驗（綱目）○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也（入門）



精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也(寶鑑)○
慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸粗大脈來浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復真與喉
藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫誤咎之此不
識覆燈將絕之候雖不下藥亦無生理矣(直小)

急慢驚風通治

宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命丹千金散聖香散朱粉散奪命散探生散

備急丸

治急慢驚風五月五日取白蠟蛇蝎不拘多少去泥焙乾為末加朱砂等分糊丸菜豆大分二服
衣每一丸白湯下○一法取蚯蚓以竹刀中斷之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚各另研為

和朱砂末作丸菜豆大分二服
貯之記而用之神妙(丹心)

牛黃抱龍丸

治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神牛胆南星一兩天竺黃五錢雄黃辰砂各二錢半麝香
真珠琥珀各一錢牛黃五分金箔十片右細末水煎甘草膏和丸芡實大金錢為衣每三歲

兒服一丸五歲二丸十歲服三五丸薄荷湯化下
(醫鑒)○此方與上鎮驚丸同而錢數異(醫鑒)

保命丹

治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰全蝎十四個防風南星蟬退白殭蠶天麻琥珀各二錢
白附子辰砂各一錢麝香五分有熱加牛黃片腦各五分右為末粳米飯搗丸皂子大金錢為衣

乳汁或薄荷湯化
下一丸(入門)

千金散

治急慢驚風痰喘雖至死但灌藥下咽即活黃連天麻朱砂各四分全蝎白殭蠶各三分
牛胆南星甘草各二分牛黃龍腦各六釐右為末每用五七釐薄荷湯下(回春)

星香散

治急慢驚風搐搦視涎湖南星炮二錢半木香橘紅各一錢全
蝎二個右剉作一貼薑四片水煎頻灌大便去涎即愈(得效)

朱粉散

治急慢驚風○歌曰一粒朱砂一片雪(輕粉也)又個殭蠶三個蠟不問驚風與慢風服時須用
生人血(乳汁也)○右先將蠟蠟微炒燥取出待冷同砂粉研為細末却以母乳乳汁調抹於兒口

內立效
十三方

奪命散

大能控風痰不問急慢驚風痰塞咽喉其響如潮名曰潮涎百藥不能遇咽命在須臾但用此藥
入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也青礞石一兩同煅硝一兩入鍋內火煨待硝盡候礞

石如金色取用右細末急驚風身執用薄荷汁入蜜調微溫服其藥自藥痰墜下從大便出如稠涕膠
粘乃藥之功也次服去風退熱截驚等藥慢驚極危者用此藥以青州白丸子再研為末薑汁調煎如

糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服蛇蝎蜈蚣川烏等藥○此藥治急慢驚利痰之聖藥以器盛水吐痰
水上以藥少許糝之痰隨藥而下須用木香湯調下(湯氏)○礞石雖利痰非胃家所好故以木香佐