


赤水玄珠第八卷目錄

瘡門

泄痢辨

泄瀉門

痢門



赤水玄珠第八卷

新安王生子孫一奎著輯

瘧門

內經黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆和如破渴欲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也

巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰
氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛
則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故飲
冷也此皆得之夏傷暑熱氣盛藏於皮膚之內
腸胃之外此營氣之所舍也此令人手足逆冷
理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍
於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽
夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外
相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯

曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著
陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其
作日晏與日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客
於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府
其明日下一節故其作也晏此先客於脊背
也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪
氣入則病作以此作日稍晏也其出於風府日
下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊
內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之

中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪
氣內薄於五臟橫連募原也其道遠其氣深其
行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃

也作

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發、則邪
氣入、則病作今衛氣日下一節其氣始發
也不當風府其日作者柰何岐伯曰此邪氣客
於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所
則不當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項
而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至

腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之發必開其腠理邪氣之所舍則其府也

帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑

其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏

於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒陰

氣也風陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒

而後熱也病時以作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒

者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後

寒也亦以時作名曰溫瘧帝曰夫病溫瘧與寒
瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬傷
於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪
氣不能自出因遇大暑腦髓燄肌肉消腠理發
泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其
氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛
陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則
寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧其但熱不寒者
陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲

嘔名曰痺瘡帝曰痺瘡何如岐伯曰痺瘡者肺
素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄
因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉
之間而發、則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣
其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而
外舍於分肉之間今人消燂肌肉故名曰痺瘡
帝曰瘡未發其應何如岐伯曰瘡氣者必更盛
更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰
則寒而脉靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得

休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日發者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘡者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有

餘寒為不足夫瘡者之寒湯火不能溫也及其
熱水水不能寒也此皆有餘不足之類當此時之
良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願
聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾
之脉無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也天
瘡之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰
盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽
陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴
夫瘡氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝

則寒陽勝則熱瘧者風寒之不常也病極則復
至病之熱也如火之熱如風雨不可當也故經
言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之
謂也夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而
調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發
為其氣逆也帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯
曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四時始也
陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不
得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血

者皆取之此真徃而未得并者也

經已上俱內
瘧論

保命集云夏傷於暑秋必瘧瘧蓋傷之淺也近而
暴傷之重也遠而深瘧瘧者久瘧也是之夏傷
於暑溫熱閉藏而不能發洩於外邪氣內行至
秋而發為瘧也初不知何經受病隨其受而取
之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其
症各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧
其治各別太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽
明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之

風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧也
發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴
也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太
陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重
者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧

丹溪云風暑之瘧當發汗夏月多在風涼處歇遂
閉其汗而不泄故也 惡飲食者必自飲食上
得之無汗者要有汗發散為主帶補 有汗者
要無汗扶正氣為主帶散邪 瘧病感虛者須

以人參白朮一二帖托住其氣不使下陷後使
他藥內傷挾外邪同發必內生痰外以汗解
散二陳湯加柴胡黃芩常山草菓煎服久瘧
不得汗者二陳湯加檳榔倍加蒼朮一方加
柴胡葛根川芎一補一發不可直截老瘧係
風暑入於陰分用血藥引出陽分則散當以當
歸紅花黃柏川芎白朮蒼朮甘草白芷水煎露
一宿空心服

按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟

傳出至府亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎葛根蒼朮升麻茈胡之屬此丹溪治瘧之微旨也

心法附餘曰世用砒霜等毒藥截瘧差悞甚矣且俗名曰脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅為主

脉訣舉要曰瘡脉自弦弦數多熱弦遲多寒隨時
變遷 心法附錄曰有病久脉極虛微而無力
似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手
耳細察可見也

生生子曰世俗皆視瘡為小病不分外感內傷勞
倦虛弱在陽在陰之旨率以砒丹常山等毒劑
劫之或以葷藥膏之又或指為鬼祟而以符水
巫咒禁之稟受厚邪輕者偶中僥倖稟弱邪重
者愈劫而愈陷矣於是迂延歲月咳嗽潮熱飲