

S2651-7
896

脾藏方下

熱痢 冷痢 疳溼痢 小兒痢

千金方衍義 拾捌



孫真人千金方衍義卷十五下

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

脾臟方下 凡四類

熱痢第七 論一首

論曰余立身以來三遭熱痢一經冷痢皆日夜百餘行乃至移狀就廁其困篤如此但率意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治但中陛之徒率情矯倨良藥苦口不能克己早餌朝遇暮過望其自瘥疾勢日增胃氣漸弱心力俱微食飲與藥皆不能進既不時



愈便稱痢病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨然
此病隨宜服一物皆使得瘥惟須力意苦已服食以
瘥爲限則無不愈也又大須慎口味重者百日次者
一月常恃驕恣者不能自慎輿言於此以爲至慨矣
古今痢方千馮首不可具載此中但撮其效者七八
而已如陟釐丸烏梅丸松皮散等暴痢服之何有不
瘥其溫脾湯建脾湯方出下
冷痢篇久下得之焉能不愈大
凡痢有四種謂冷熱瘡蠱冷則白熱則赤瘡則赤白
相雜無復節度多睡眼澀蠱則純痢瘀血熱則多益
黃連去其乾薑冷則加以熱藥瘡則以藥吹灌下部



盡毒則以盡法治之藥既主對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也凡服止痢藥初服皆劇愚人不解卽止其藥不服此特不可但使藥與病源的相主對雖劇但服不過再三服漸漸自和非其主對者慎勿服也

凡痢病通忌生冷酢滑猪羊雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖醫不能救

下痢脈滑而數有宿食當下之

下痢脈遲而滑者實也利爲未止急下之

下痢脈反滑當有所去下乃愈

下痢不欲食者有宿食當下之

下痢而腹痛滿為寒實當下之

下痢腹中堅者當下之

下痢而讖語腹內有燥屎宜下之

下痢二部皆平一作浮按其心下堅者急下之

下痢已瘥至其年月日時復發者此為下不盡更下

之愈風寒重者不可下下之後心下堅痛脈遲一作浮

此為寒但當溫之脈沉緊下之亦然脈大浮弦下之

當已



下痢脈浮大此爲虛以強下之故也設脈浮革者因
爾腸鳴當溫之

下痢脈遲緊爲痛未欲止當溫之得冷者滿而便腸
垢

下痢身軀疼痛急救裏諸溫之屬可與理中四逆附
子湯熱藥急投之美

下痢大孔痛者當溫煖之

下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表

下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿

下痢氣者當利其小便



下痢脈反浮數尺中自瀉其人必清膿血

下痢脈數而渴者令自愈設不瘥必清膿血有熱故也

下痢脈沉強者下重其脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱必不死

下痢脈沉而遲其人面少赤身有微熱

下痢清穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者

面戴陽下虛故也

下痢有微熱而渴脈弱者令自愈

下痢脈數有微熱汗出冷自愈設脈緊爲未解



下痢脈弦發熱身汗者自愈

下痢脈大浮弦下當已

下痢舌黃燥而不渴胸中實下不止者死

下痢後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生不

不溫者死生死之決此之謂也

下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負趺陽者爲順

凡六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者下利不禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一下病體略例如此耳



素問曰春傷於風夏為膿血比下多滯下也夏傷於
 風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及
 水穀實而下者以大黃湯下之強人勿過兩劑善消
 息五六日更進一劑其補澀湯不效者三兩日可進
 一劑


陟釐丸 治百病下利及傷寒身熱頭痛目赤四

肢煩疼不解協熱下利或醫已吐下之腹內虛

煩欲得冷飲飲不能消腹中急痛温食則吐乍

熱乍冷狀如温瘧或小便利氣滿吐逆下痢

不止方



水中陟釐

兩五

紫石英

兩三

漢中木防已

兩六

隴西當歸

兩四

厚朴

兩一

黃連

兩二

上好豉

三升

三歲醇苦酒

五升

右八味以苦酒二升漬防已極令潤出之切以板

瓦覆著炭火土以厚紙藉瓦土令色槁燥有餘苦

酒復漬之更出熬盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令

極燥各搗為末又以餘苦酒三升浸豉一宿明日

以瓦盆盛以一盆覆蒸五升土下須土氣通熱出

之研絞取濃汁和藥搗為丸如雞豆子大懸合陰

乾勿見風塵此藥以三丸為一劑平旦服一劑晝



服一劑暮服一劑皆以水服之若病重藥力未
者但益服之日可四五劑合腹中有藥力飲
是其效也新服藥未安調當稀糜助藥力心
然後可作羹臠微冷食之若有時不喜冷食藥
盡耳若欲不復藥者但稍温食藥力自盡矣服藥
不必強多飲水禁熱食魚肉蒜菜酒及辛物肥膩
若有風病加防風一兩入虛羸加石斛一兩若宿
有下利腸胃損弱者加大一禹餘糧二兩半取石
中黃軟香者若婦人產後疾加石硫黃一兩小便
黃赤不利加薔黃一兩依方消息之無不得效也



義陟釐生水 中蒙茸如髮而性甘溫能利水散邪
浮萍之利水發汗也 日華搗汁治天行心悶別錄
言溫中消穀千金陟釐丸治協熱不利腹中急痛
溫食則吐狀如溫瘧兼紫石英治心腹咳逆邪氣
漢防已治風寒溫痺除邪利大小便厚朴治中風
傷寒頭痛寒熱當歸治咳逆上氣溫瘧寒熱黃連
治腸澼腹痛下利皆本經主治內經腸澼便血雖
有身熱則死之證以腸胃受病加以身熱則表裏
俱困故主以死 腸澼初起往往有表邪內陷而
致下利但當先微外熱然後專力治裏多有得生

者非久利胃氣竭虛陽發露之比斯義惟干
得之尤妙在苦酒酸收防已香豉之性以盡緩
之力此方不特時師所昧并不識陟釐爲何物也
烏梅丸 下痢熱諸治不瘥方

烏梅 一升

黃連 一斤
色者

右二味蜜丸如梧子服二十九日三夜二

衍義

黃連苦寒本經主腸澼腹痛專取苦燥以堅腸胃

配以烏梅益津開胃不使木邪橫干脾土近世醫

師每謂初痢後重未除不可便用酸收而千金用

此以治暴痢不致熱毒上攻全賴酸收之力詳此



治例又未可一槩論也

松皮散 治積久二三十年常下痢神方

赤松皮去上蒼皮切一斗為散麩粥和一升服

之日三服瘥不過服一斗永瘥三十年痢服之

百日瘥

符義

松皮燥澀善辟濕熱除脹滿而方書罕用千金獨

取以治久痢以痢久諸藥罔效故別出手眼乃以

醫所不用病所未嘗之品以療之而前論中又云

暴痢服之何有不瘥以其燥而能通澀而不滯故

久痢暴痢無不宜之然須用根去外粗皮方有健

脾之功但蒼瘦之人津血不充而多火者切禁

苦參橘皮丸 治熱毒痢方

苦參

橘皮

黃連

黃蘗

鬼臼

一作鬼箭羽

藍青

獨活

阿膠

甘艸

右丸味等分為末以蜜烱膠并手丸之加梧子候乾飲服十九日三後稍如卒下注痢者大良

衍義

苦參治心腹結氣黃連治腸澼腹痛黃蘗治五臟

脾胃結熱鬼臼辟惡氣不祥藍青解諸毒蠱豉獨

活治風寒所擊橘皮除胸中痰熱逆氣利水穀下



氣阿膠止五臟內崩甘艸治五臟六腑寒熱邪氣
 合本經諸治則此方辟除毒熱最迅而丸服
 最緩不過藉以為應敵之需非但不可峻用而
 服尤為不宜所以先哲有久服黃連苦參反從火
 化之說以苦先入心久而增勝逮所必至至於癩
 久胃氣駸衰飲食艱進慎勿誤投以取虛虛之咎
 三黃白頭翁湯 治諸熱毒下黃汁赤如爛血滯
 如魚腦腹痛壯熱方

黃連 二兩

黃芩

黃蘗

升麻

石榴皮 各六分

艾葉 三分



白頭翁

桑寄生

當歸

牡蠣

犀角

甘艸
各一兩

右十二味咬咀以水六升煮取三升分三服

衍義

前苦參橘皮湯治毒痢方張此治熱痢勢劇故劑

三黃祛熱歸艾和血甘草犀角解毒白頭翁散結

氣桑寄生除風濕升麻升清降濁牡蠣固脫斂津

所下已多因以榴皮酸瀝收之與前方中之用獨

活鬼曰截然兩途此方張全盛之攸分也

龍骨丸 治下血痢腹痛方

龍骨

龍膽

羚羊角

