

金匱要略
法經九章



金匱要略 註卷九

漢張仲景原文

閻長樂陳念祖修圖註

婦人妊娠病脉證治第二十

男元蔚古愚 全校字
元犀靈石

師曰婦人經斷而得平之脉和脉關後為陰脉視關前小弱是胎元其人渴

非上焦有熱乃不能食非胃家有病乃無寒熱外無表名曰妊娠凡

陰火上壅也切溫涼補湯之劑桂枝湯主之於法六十日胎已成而當有此證設

皆未盡善唯以有醫者不知為孕而治之逆者却一月先見此加吐下者當明告其

再誤前為則絕之易所謂勿藥有喜是也絕禁絕醫藥也



尤在涇云平脉脉無病也卽內經身有病而無邪脉之意陰脉小弱者初時胎氣未盛而陰方受蝕故陰脉比陽脉小弱至三四月經血久蓄陰脉始強內經所謂手少陰脉動者妊子千金所謂二月尺脉數是也其人渴妊子者內多熱也一作嘔亦通今妊婦三月往往惡阻不能食是已無寒熱者無邪氣也夫脉無故而身有病而又非寒熱邪氣則無可施治惟宜桂枝湯和調陰陽而已徐氏云桂枝湯外證得之爲解肌和營衛內證得之爲化氣調陰陽也今妊娠初得上下本無病因子室有礙氣溢上下故但以芍藥一味固其陰氣使不得上溢以桂甘薑朮扶上焦之陽而和其胃氣但令上之陽氣充能禦相侵之陰氣足矣未嘗治病正所以

治病也否則以渴爲熱邪而解之以不能食爲脾不健而燥之豈
不謬哉六十日當有此證者謂妊娠兩月正當惡阻之時設不知
而妄治則病氣反增正氣反損而嘔瀉有加矣絕之謂禁絕其醫
藥也婁全善云嘗治一少婦惡阻病吐前醫愈治愈吐因思仲景
絕之之旨以炒糯米湯代茶止藥月餘漸安○又一本絕之謂當
絕其病根不必泥於安胎之說而孤疑致誤也亦通

婦人

行經時經未淨或遇冷氣房事六淫邪氣沖斷其
經則餘血停留凝聚成塊結於胞中名爲癥病如

宿有癥病或

在子宮則仍行經而仍經斷未及三月而得漏下不止胎
受孕經斷即是孕矣乃經斷未及三月而得漏下不止胎
若經斷下則胎直臍上者此爲每月湊集癥氣
動大欲落矣今動胎上者此爲每月湊集癥氣
無所入而下漏其實非胎病也雖然經斷原有胎與血之異欲知
其的證必由今之三月上週前之三月統其以六月爲準若妊

娠六月動者問而前三月經水順利應時而無前後參差其胎也若

之三月其期經水遲下血者乃後斷三月所積血胎而非也然既知有

早不定便知今之為漏下而不知舊血未去則新所以血不止者其癥不去故也

血不能入胞養胎而下走不止胎終不當下其癥以桂枝茯苓丸主之

安必此為妊娠宿有癥病而出其方治也

桂枝茯苓丸方

桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 芍藥

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

婦人懷妊六七月脉弦發熱有似其胎愈脹乃頭與身腹痛皆不惡

惡寒甚少腹陣陣作如被扇所以然者子臟開而不能闔而風故也

惡寒甚少腹陣陣作如被扇所以然者子臟開而不能闔而風故也

惡寒甚少腹陣陣作如被扇所以然者子臟開而不能闔而風故也

惡寒甚少腹陣陣作如被扇所以然者子臟開而不能闔而風故也



夫臟開風入其陰內勝則其弦為陰氣而發
熱且為格陽矣胎脹者熱則消寒則開也
當以附子湯溫其臟

此為胎脹少腹如扇者出其方治也

李氏云子臟即子宮也臍下三寸為關元左二寸為胞門右二寸

為子戶昔人謂命門為女子繫胞之處非謂命門即子臟也金匱

明明指出少腹何荒經者之聚訟紛紛也

師曰婦人有漏下者妊娠經來俗謂之激經也有四五月墜胎謂之半產半產後傷其血海因續

下血都不絕者有妊娠下血者如前之因癥者固有之假令妊娠無癥而下血惟見腹

中痛者則為胞阻胞阻者胞中之氣血不和而阻其化育也以膠艾湯主之推而言之凡婦人經水淋瀝及

胎產前後下血不止者皆衝任脉虛陰氣不守也此方皆可補而固之

此為胞阻者而出其方治也然此方為經水不調胎產前後之總



方

膠艾湯方

乾地黃

六兩

川芎

阿膠

甘草

各一兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

婦人懷孕腹中疝痛當歸芍藥散主之

此爲懷妊腹中疝痛者出其方治也

徐忠可云疝痛者綿綿而痛不若寒疝之絞痛血氣之刺痛也乃正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而求伸上氣不



南京中醫藥大學圖書館版權所屬

調則精細綿矣故以歸芍養血苓朮扶脾澤瀉瀉其有餘之舊水
芎藭暢其欲遂之血氣不用黃芩病痛因虛則稍挾寒也然不用
熱藥原非大寒正氣充則微寒自去耳

當歸芍藥散方

當歸

芎藭各三兩

芍藥一觔

茯苓

白朮各四兩

澤瀉半觔

右六味杵爲散取方寸七酒和日二服

妊娠

胃中有寒飲則嘔吐

嘔吐不止

則寒而且虛矣以

乾薑人參半夏丸主之

此爲妊娠之嘔吐不止而出其方治也半夏得人參不惟不碍胎

且能固胎

乾薑人參半夏丸方

乾薑

人參各一兩

半夏二兩

右三味末之以生薑汁糊爲丸梧子大飲服十丸日三服

妊娠小便難飲食如故以當歸貝母苦參丸主之

尤在涇云小便難而飲食如故則病不由中焦出而又無腹滿身重等證則更非水氣不行知其血虛熱鬱而津液滯少也當歸補血苦參除熱貝母主淋瀝邪氣以肺之治節行於膀胱則邪熱之氣除而淋瀝愈矣此兼清水液之源也

當歸貝母苦參丸方

當歸

貝母

苦參各四兩



有三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至一丸

妊娠有水氣

謂未有腫脹無其形但其氣也水氣在內則

身重小便不利

水氣在外則

洒淅惡

寒

水能阻遏陽氣上升故

起即頭眩

以

葵子茯苓散主之

是專以通竅利為主也葵能滑胎而不思

有病則病當之也

此為妊娠有水氣者而出其方治也

葵子茯苓散方

葵子一升 茯苓三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日二服小便利則愈

婦人妊娠

無病不須服藥若其人瘦而有熱患熱氣耗血傷胎

宜常服當歸散主之

徐忠可去生物者土也而土之所以生物者濕也血為濕化胎尤

賴之故以當歸養血芍藥斂陰肝主血而以芎藭通肝氣脾統血而以白朮健脾土其用黃芩者安胎之法惟以涼血利氣爲主白朮佐之則濕無熱而不滯故白朮佐黃芩有安胎之能是立方之意以黃芩爲主也胎產之難皆由熱鬱而燥機關不利養血健脾君以黃芩自無燥熱之患故曰常服易產胎無疾苦并主產後百病也

當歸散方

當歸

黃芩

芍藥

芎藭

各一斤

白朮

半斤

右五味杵爲散酒服方寸七日再服妊娠常服卽易產胎無疾苦產後百病悉主之

妊娠肥白有寒養胎白朮散主之

尤在涇云妊娠傷胎有因濕熱者亦有因濕寒者隨人藏氣之陰陽而各異也當歸散正治濕熱之劑白朮散白朮牡蠣燥濕川芎溫血蜀椒去寒則正治濕寒之劑也仲景並列於此其所以詔示後人者深矣

白朮散方

白朮

川芎

蜀椒

三分去汗

牡蠣

右四味杵爲散酒服一錢七曰三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芍藥心煩吐痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥

汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水狀懷身七月大陰當養不養此心氣實當刺寫勞宮及關元小便微利則愈

尤在涇云傷胎胎傷而病也腹滿不得小便從腰以下重如有水氣而實非水也所以然者心氣實故也心君火也爲肺所畏而妊娠七月肺當養胎心氣實則肺不敢降而胎失其養所謂太陰當當養不養也夫肺主氣化者也肺不養胎則胞中之氣化阻而水仍不行矣腹滿便難身重職是故也是不可治其肺當刺勞宮以寫心氣刺關元以行腎氣使小便微利則心氣降心降而肺自行矣勞宮心之穴關元腎之穴

徐忠可云按仲景妊娠篇凡十方而九散居七湯居三蓋湯者湯也妊娠當以安胎為主則攻補皆不宜驟故緩以圖之耳若藥晶無大寒熱亦不取泥膈之藥蓋安胎以養陰調氣為急也

婦人產後病脈證治第二十一

問曰新產婦人有三病一者病瘧一者病鬱冒一者大便難何謂也

師曰新產

之婦畏其無汗若無汗則營衛不和而為發熱無汗等證

雖欲有汗又恐其

血虛

氣熱熱則

多汗出

汗出則腠理愈開而

喜中風

風又動火

故

令病瘧

新產之婦畏血不行若不汗則血瘀於內而為發熱腹痛等

也然雖欲血下

亡血

血亡其氣無復

汗

寒氣自內生而

寒多

血為陰陰

亡失守氣

為陽陽

故令

不省人事而

鬱冒

新產之婦雖欲其汗出

亡津液

胃

胃



乾
腸燥故大便難三者不同其為亡血傷津則一也

此為產後提出三病以為綱非謂產後止此三病也

上言新產之病其綱有三然瘕病有竹葉湯之治法另詳於後試先言鬱冒與大便難相兼之證

產婦鬱冒

邪少而虛多故

其脉微弱

中虛故

嘔而

不能食

胃液乾故

大便反堅

身無汗

但頭汗出

此數證皆鬱冒

中兼有之證也究其鬱冒之

所以然者血虛

則陰虛而

上陽氣

厥厥而必冒冒家欲

解必大汗出

是陽氣鬱得以外洩而解也然其所以頭汗奈何

以血虛

為下之陰

厥則陽為

孤陽上出故頭汗出

又或不解其

所以

然者請再申之蓋

產婦

出又

喜

其通汗

出解者亡陰血虛陽氣獨盛故當

損陽令其汗出

陰則

陰陽乃

而復知

其大便堅

不為實熱而區不為胃氣寒而為津少也其口為膽氣逆也其

不能食

不為熱不殺穀而為胃氣不和也以

小柴胡湯主之

此湯為邪少虛多之對證也

此為鬱胃與大便難之相兼者詳其病因而出其方治也

小柴胡湯方見嘔吐

鬱胃病既解而能食至七八日更發熱者然發熱而不惡寒便知其不在表而在裏矣因能食

而更發熱便知其非虛病而為食復矣此為胃實宜大承氣湯主之

此言大虛之後有實證即當以實治之也若畏承氣之峻而不敢用恐因循致虛病變百出甚矣哉庸庸者不堪以其事也若畏承氣之峻而用穀芽麥芽山查神麴之類消耗胃氣亦為害事

大承氣湯方見瘕

產後屬虛客寒阻滯氣血則腹中疝痛以當歸生薑羊肉湯主之併治腹中寒

疝虛勞不足



衆各家說疴痛者緩緩痛也。然屬客寒相阻，故以當歸通血分之滯，生薑行氣分之寒。然胎前責實，故當歸芍藥散內加茯苓，以瀉其水濕。此屬產後大槩責虛，故以當歸養血而行，血滯生薑散寒而行，氣滯又主以羊肉味厚氣溫，補氣而生血，俾氣血得溫則邪自散而痛止矣。此方攻補兼施，故并治寒疴虛損。或疑羊肉太補而不知孫真人謂羊肉止痛利產，婦古訓鑿鑿可據。又何疑哉。

當歸生薑羊肉湯方

見寒疴

然痛亦有不屬於產後腹痛。若不煩不滿，爲中虛而氣壅，胃不虛者不之知。然動也，今則火上逆而滯而和而不得卧。此熱下鬱而枳實芍藥散主之。

此爲腹痛而煩滿不得卧者，出其方治也。方意是調和氣血之滯。