

感症寶筏



感心寶筏卷之二下目錄

三陰總辨

太陰經症

腹滿

太陰新法

少陰經症

但欲寐

少陰新法

厥陰經症

氣上衝心

太陰總要述古

腹痛

黃黃

太陰各病述古

吐利

少陰總要述古

亡陽咽乾

咽痛

吐

吐利

少陰各病述古

厥陰總要述古

厥陰各病述古

吐衄

厥

下利

少腹滿

囊痼



歷陰新法

救逆述古

救逆新法

差氏諸病述古

差氏諸病新法

汗法頭痛

差氏諸寒

差氏無言

差氏吐瀉

差氏危症

誤汗例

藥下例

差氏浮腫

差氏昏死

解法欬止

解法腹止

差氏耳聾

差氏不寐

解法秋嗽

解法盜汗

差氏吐酸

解法下血

差氏眼赤

差氏不食

差氏夢遺

陰虛勞瘵

差氏調理

差氏禁忌



北京中医药大学图书馆版权所有

感症實錄卷之二下

三陰候辨

候傷重者其脈三陰或其或重之故者候其面主即其傷候也
中之分以仲聖者以此處不明何以候症用陳希
一三陰之陽候注入之邪其本經自感之邪注入之邪則傷其本
陽主動也一三陰之陽候注入之病多傷其本經自感之邪注入之邪則傷其本
主靜也一三陰自受之邪其本經而無傷其本
亦其傷候自受其邪入三陰之邪其本經而無傷其本
一三陰之陽候注入之邪其本經自感之邪注入之邪則傷其本
說似是而實非也夫其傷候即邪注三陽候自入其本經



自受之風寒如善邪之傳入三陰其病固多而言症以別之（傳
經邪入三陰之人陽氣素虛不能化其以同其症共）
寒固其症而中風不能化其一直中三陰之邪入陰不能化其
以風邪入陰以風其風為陽邪也（未可以）
了之生症他述於左

邪許不可以傳經自受分其寒其以陰經受邪不能化其陰

經風邪以風其也

一邪從陽經注入三陰以或為其症或為其症如邪入太陽先作若
其以風傳入陰經以風其症太陽先化其而少陰轉入陰經為其
症或邪在太陽不及其邪以入少陰而少陰形症則為其症



太陽此用四逆湯溫裏之症一或太陽之邪入少陰而如榮

太陽標病則為先言此之症一少陰反發其仍用太陽之藥用

麻附細辛湯溫經散邪之症一或太陽之邪不傳陽明而少陽傷風

三陰隨之入傳實處藏府之症一則三陰化為寒症三陽化為熱症

症一太陽之邪傳入三陰之人陽氣充實則三陽化為熱症三陰

虛少則三陰化為寒症所以三陰之症或寒或熱之不同也一或風淫

之邪入三陽入陰經則七不和其症一風淫為陽其之邪入於陰

經最易傷人之陰故有然之症一三陰篇內所稱傳屬陽明而

用承氣湯皆陽經傳入之其症也一陽經其邪傳入三陰之人

氣實而不休安公還之移府之其易也邪轉入胃則不復傳

氣實而不休安公還之移府之其易也邪轉入胃則不復傳

故可下也

而許即入三陰或言或然之故分別詳明

一三陰自受之邪為中風中言之症三陰中風則統發其

陽邪始也一三陰自受風邪不傳發其三陰中受則不傳發其

望厚陰邪始也三陰自受之邪不傳發其即少陰反其

不必帶太陽標病而然一且太陽之表故用麻黃表辛附溫經

以人似知傳入三陰為傷寒不知三陰自感之傷寒也故於本經

中風發其後誤認為傷經標病以為中風中受其邪即指為真中陰

症一三陰自受風邪發其之症誤作傷經其症施治其害不少

知桂枝為表之理為固能盡治三陰自感之風邪而理中四逆等



陽分治三陰月感之症邪如邪風之入氣之傷人或入於陽或
入於陰原是一定但值何經之虛而治之不必專以太陽為受邪
之始如一邪之中人未常能定曰太陽而始如乘其經氣之虛而
乘之入之故因經在中於項則下太陽中於面則下陽明中於
脘則入少陽之文可見邪氣能定自太陽而入也故三陰因之
陽經注入之症以五經經自感之症均屬傷寒不必另立名目也
并於三陰經中是直中之條能治如白不取婉三耳
亦許三陰自受邪邪不傷其三陰曰受風邪不傷其三陰
因其五經誤認為傷寒傳入之其症如惟三陰自受風邪宜
桂枝湯和表自受邪邪用理中曰逆經

一三陰自受之邪論中言可歷指而見其為太陰病脈當其可發汗
 浮為太陰表也宜桂枝湯此太陰中風也（太陰自受風邪表病）
 用桂枝湯和表（太陰病後而吐自利者甚時後自痛此太
 陰中寒之症也）（太陰自受之邪裏病宜溫中）（少陰中風
 陽微陰浮其為表也此少陰中風之脈也）（厥陽微邪也）
 其陰出之陽也此少陰自受風邪於食之脈也（玉桂少陰中寒
 宜汗其麻黃附子細辛湯）（少陰自中言邪之症乃少陰反發其
 蓋以太陽之表故用麻黃散表邪辛附溫經）（常溫其附子四逆散
 湯是也言邪自中故用溫藥也厥陰中風脈微浮為邪食此中
 厥陰中風於食之脈也（厥微為邪正勝為陽邪故為於食乃



厥陰自中風邪欲愈之候（厥陰中寒即用當歸四逆加吳茱萸湯也）（厥陰自中寒邪之症用發表從經之法此方是厥陰表劑）（同少陰厥陰篇內心中風欲愈之候亦是未愈必亡厥也）

卻詳此論三陰自受風寒之症治法分別精細

一三陰篇內惟少陰以承氣氣下三症而太陰厥陰篇內並無承氣之條奈何古人只稱邪在厥陰三承氣選用（三陰傷陽明為出邪邪入三陰氣實而不休實則邪入陽明而成可下之症此邪在厥陰而可用承氣下之也）（久承氣中陽明胃弱少陰用承氣甚重因胃氣一虧胃土虛實病已轉屬陽明故急下以存陰

陳（少陰急下三症因其結胃腑而燥實惡生灼乾皆結胃處故
急下以存陰）仲聖述厥陰病云下之利不止此厥陰急下之症
戒也烏丸所云厥陰反用承氣之理聖訓具在是此自見
之邪不結屬陽明胃府切不可下不獨厥陰也

亦詳論三陰其和倍實可用承氣攻下之法否則切不可用之
理分別甚精



太陰任病

太陰任病述古

理中湯

桂枝湯

五苓散

四逆湯

四逆加

附子湯

三拗白散

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

太陰本病述古

後局

腹痛

黃芩

出利

太陰脾土所主伸屈以後局而此亦不下時後自痛自利不渴（不

渴是也）

等症為太陰主病太陰病之總綱（乃脾土自病於陽任

注入之症也生於心必以而細（太陰之脈之脈）考諸公受言和內

傷生於心以濕中散言為主（理中湯主之）



是陽經其氣傳入太陰脾胃於逆故病開陽明太陰其氣轉
入胃府故可從陽明治此太陰病自利以渴不渴辨之
最長要訣

傷寒論曰陽明為好太陰為表好身不發其手三自汗者太
陰如太陰身自發其手不汗自利其不能發其瀉法十便下
不發其瀉法傷於肌肉不能公越其當故發其手不汗利則瀉
下利腹脹便不發其瀉法瀉下利瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法
表故用五苓散利水以泄其瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法
其瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法
口十解其瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法瀉法



不次也

亦許太陰其和暴煩是暍陽陰黃下利雖多正是好家移積
多躁多動自止此條是太陰既起故知陰後陰利也
若七八日暴煩下利是陽氣未復脾家邪氣積聚下利自止
不次用從上下也

傷寒四五日腹中痛急脈數下益少腹共一太陰之脈下注將成下
利之兆也此利自利如自利不渴者屬太陰以其重且宜故也太
陰身重而陰邪又中之也常從之占曰逆轉

亦許太陰自受之邪氣機下注故有下利之兆自利因於之脈
故不渴也常從之占



起它脈微而便利曰逆加人參湯主之

而詳意多而脈微下利陽虛而陰盛也此為陰言下利用

湯從裏入參補虛最為精妙

下利十餘日脈反實者死言多而實此好氣多而邪氣盛故也人參
復屆時痛重者也誤下之胸下依硬而成言寒結胸者其病無三
物白散一言結中宮而成實占其實依胸不合故申之曰是其病其
此句當看眼病在膈上者必吐膈下者必利也不利進其瀉一
至利過不止進冷粥一至

而許後屆時痛太陰言邪誤占言第下之言邪占者病於依成
言實依胸占其實依胸不同改用溫通一法是其病其病不



厥好疼也

若太陰誤下後乃自利此為後重而痛此太陽之病也臨於太陰之
虛也後重時痛為宜桂枝加芍藥湯後重太痛而實宜桂枝加大
黃湯然此則胃氣不和故云當用大黃芍藥其宜減之

而評下利為太陰者病自利因脾虛故也公食自利因脾虛也
而遂舉證之此自利因太陽誤下而邪入太陰以後重時痛
當加芍藥大實痛者當加大黃矣就下利後重則胃氣不和
當不止利而減用之雖然下利後痛者亦為患故用芍藥在
陰之虛痛拉芍藥所宜仲景上大黃芒硝句以輕視者誤下
太陽者邪陷入太陰是陽能注入之病也虛實證之



北京大學圖書館藏
醫學部圖書藏