

一九六六年

七六老人敬贈

方景仲醫師存

女科經帶胎產

女科經帶胎產

○月經症治

先期有

五因

固經涼血如安然

後期有

只因血少故來遲隔少無瘀大補之色淡脈

血主

養血歸芍及參茸

不孕有

氣陰血主多望歸飲子可調和勞傷冲任宜膠艾

三

得血參芪藥下術

来少者
少
偏少原来阴滕阳或临经临着寒凉虽然不足宜滋补

津津虚另有方

血热先期

先期而来及紫色者血热也黄连为君槐花山梔香附
四物为佐

血虚后期

后期而至及色淡者皆血虚也四物为君
玄参五味麦冬为佐

血虚后期

后期色紫有块者血热也四物为君赤芍丹皮

血寒后期

后期不来作痛者血寒也四物为君肉桂桃仁

後期辨

經水後期瘦人責之血少四物加花益母子以

痰六君加芎歸

疾阻

或前或後色淡而稠粘去痰也二陳為主

蘇梗四物薑砂為佐

氣滯

或止或來無定期主因氣不調故血亦隨之

時為君陳皮香附砂仁蘇艾四物為佐

氣虛血耗

或一月兩次或數日一至去氣虛血耗也八物為主黃連

山梔亦附龜板砂黑蒲黃為佐

血重

或經年之後是數日而不能止者乃血為火迫也至提為君

瘀血

黃連地榆牡蠣似指赤附四物炒黑蒲黃為佐
經心後隔二三日而後之去舊血未去之四物赤附陳

壯

經以腫滿

為虛

經閉腫滿

為實

倒經為火

血風

經水過多不止遍身腫滿者宜補脾

經水不行發腫者宜調經乃痊

經水不行口鼻出血者宜載血上之

經水適眩或冒風邪頭眩者人參

人參
國藥典
自題
公

自題
公

成赤班名曰血風最急症也四物為主桃仁

芥天麻舊荷白朮為佐

寒痛

經來冲任傷風冷腹內綿綿痛不停是

桂枝桃核及淫經

血瀰痛

經血如豆汁形腹中疔痛不安字腫浮水大旨沉細

四物湯並合五苓

氣滯痛

經先有腹中疼血濡目而不即行漸痛來移趨下

調營順氣可和平

氣滯痛

章沛胞門經不通腹中疼痛泄來攻厥次走注牽脇

抑章延胡大有功

虛痛

經來腹痛無二延胡緣何痛不休照弱痛綿手可也

必然血少是根由

實痛

痛阵攻冲血不行按之硬滿手難迎便

章血法以痛自平

失血心疼人罕知只因血統在心脾去多則心脾

心痛分

虛實

治標先將失笑醫

氣實而痛

氣虛而痛

氣滯而痛

氣逆而痛

氣鬱而痛

氣結而痛

氣聚而痛

氣散而痛

氣陷而痛

氣浮而痛

氣沉而痛

經前痛為

實

將來而先腰痛去血滯而氣不至也木系為

皮香附四物為佐

經後痛為

虛

行後而後腰痛去血虛而氣不收也

升芎歸芍附陳皮為佐

經後身痛

右經行身痛去芎歸芍附陳皮為佐

陰虛發

熱

平時發熱必偏陽入血陰虛火自狂能戒五辛茹沙食

膝水並服地黃湯

血虛發

熱

血去陰虛內熱生口乾煩躁不和平以過初至頃分治

客室虛游另有名

勞傷後

血虛氣

血俱虛

外感發

血虛氣

血俱虛

血虛

實

實血虛

血癰

曰勞後血為勞血肢體痠疼盜汗多煩躁不寧神困倦
急投良劑免貽病

客主皆由元氣虛損六淫薄邪邪居心煩口渴

加味道遙治有解

要知游血陽明實血至如游不定期者

能仁承掌可以之

脈洪有力名為實熱在先天經未行便秘者

可並玉燭托衣更

照來無力便知虛陰不足子氣已解必果

虛虛
血虛

六神補血自能除

寒熱有

寒熱雖云外中風陰虛陽弱不相同更

四目

言之交爭又一宗

外感寒熱

經以言熱頭痛身重一觸經或冒心直發散

血入血室

經水適時裏熱內入結未言熱名熱入血室四物為主

赤苓芩翹麥冬丹皮為佐

經後發熱
目昏屬虛

經後發熱倦怠物目不明者此肝陰虧極不能收斂於

血熱經
閉

目只宜補中為肝調補養血目得血而能視矣
補虛瀉火出東垣說云一經必熱煩五濁三和分上下

血寒經
閉

量以通後必調元

血必宣通冷則凝腹中痼氣結如冰或勞役過度

久則傷肝言血壅

痰阻經
閉

痰滯胞門氣不流久而食少熱言生肥人華山論脂滯

玄積消痰經自以

血凝經

閉

血結胞中病背陶精神減少欲成癆言宜醫

立用羅君血極膏

氣滯經

閉

婦女偏多執性懷懷隱曲不舒伸停經六半由

瑞珀當歸効如神

血虛經

閉

娶冲玄娥及女危心公耗教致肝腎虛培血陰潤

胎子仁丸最合宜

肝換經

閉

肝癆支滿妨於食時晝夜間弓身腰脇痛目眩或唾血

苦茹烏賊載於經

血寒經閉

經行時因渴飲水或食生冷或水中洗浴血得寒而凝令
人經閉宜桂附為主乾薑木香厚朴赤附查肉紅花桃
仁肉稍牛膝為佐如血而脈

血虛經閉

思中伏火消穀善飢而體漸瘦脈數疾者此胃燥不
生血也宜浮大養胃而生血潤燥

痰阻經閉

形侏肥舌濕痰壅重令人經閉枳實白朮蘇木半
陳皮赤附烏藥厚朴牛膝桃仁為佐

氣滯經閉

因憂怒而經閉者宜散為君香附木香

血癖

血蠱

血虛經閉

捐红花查肉桃仁牛膝蓬朮蘇木為佐好酒煮服

經閉不通積成血癖為痔於兩脇小腹
蓬朮為君

三稜桃仁红花枳實官桂山甲牙皂為佐醋煮為末以

艾煎汁浸酒麴研爛加醋調和煮陳米飯為丸好酒送下

經閉不通積成血癖小腹尖脹上及中脘去筋緩落桃仁

為君红花枳實牛膝蓬朮蘇木為佐牙皂

山甲為佐腹皮湯煎

或曰墮胎多產或曰潮熱盜汗血脈消耗令人經閉四物

血枯經閉

為主木火二附厚朴甘枳為佐久而自通

血枯經閉多身熱身痛脈必濡數肌膚乾燥內無噎膈

四物加桃仁紅花

血虛經閉

或目昏胃不和飲食減少不能生血令人經閉八珍湯

木火二附調之久而自通

血虛經閉

大病後經閉屬虛宜補脾養血元氣後自通

陰虛經閉

脈數而弦細日漸羸弱漸熱倦怠去陰八珍丸

蘭湯

受胎經閉

月水閉飲食形寒如故或惡心阻隔物入其力去之胎也以

芎末空心艾葉湯下搗之腹中漸動去胎也

血崩為

尺脈虛微陰不足寸如弦急陽反熱必熱失血崩中症

血

物所膠黑地極

血崩為

冲任原來主月經經傷言淫不為停留金匱子宜調

左

大創芎歸極靈

血崩為

痰涎凝津背胸中壅遏經隧不通血不歸經因漏下

疾

金柳葉可收功

血崩回
凡

風熱乘肝血妄行以癰脇痛目羞明莎柴四物之類
一服數君疾自平

血崩回
辛

夏熱思慮傷肝佳
二貪賊食不思肝土卑豈難得血
歸所加減氣相宜

血崩回
怒傷肝

血氣傷肝血不藏忽然崩下甚傷裡
舌淡赤附地黃
白芍芎歸及地黃

血崩宜
補

血旺多時事必虛陽生陰長理相宜
甘性
歸州升柴參朮芪
血潤肝胃