

醫方便蒙下

敬恕堂張訂



中華民國卅三年閏四月上澣

醫方便蒙

下卷

古彭張宗震訂讀



醫方便蒙卷五目錄

婦女科

經閉

崩漏

五帶

經常

月經

常之

月經異

胎前

約忌

惡阻

子瘡

子懸

子癰

子鳴

子嗽

胎墜

胎動

胎不長

妊傷寒

子腫

子煩

漏胎

妊皴脚

臨產

小產

產後

乳不行

乳自湧

乳癰

吹乳

乳巖

妬乳

乳懸

陰腫

陰痛

陰癢

陰瘡

陰挺

陰痔

陰冷

陰吹

交出血

熱入室

血分腫

水分腫

夢鬼交



梅核氣

血風瘡

臙瘡

足跟

回乳



南京中医药大学图书馆藏书

醫方便蒙卷之五

婦科

經行經閉證治

一月一行自古同。不用施治自和平。四五十日名落後。十日半月。趲前名。三月五月全無信。非是受孕即閉。經氣凝。血聚癥瘕起。施治之期。須用攻。淡黃紫黑色不正。虛實寒熱。漫調停。受孕經閉。設疑是加減。逍遙兩收功。若是認透。是經閉。自製開鬱湯最靈。

婦人之病。與男子治同。惟行經胎產。崩漏淋帶。不相同耳。故另立婦人科。以分辨之。經胎產。崩漏淋帶。不相同。女子十四則天癸至。四十十九則天癸盡。天者先天之氣。癸者。壬癸之水。天癸者。即經血來期也。一月一行。是其常也。二七至七七盡者。乃天地之常理也。有十五六而至者。四十以後而盡者。不能一律而然也。



有十八名乾血癆又一名童子勞者此本無血將成蒸熱虛勞之證
經二血之月一者如月盈則虧若二十七八一行三
十勝之日一行為至經調不則必拘拘一月也三十五六
有血勝之人二不調趙前非血熱即氣虛不能收攝也
日一行亦不為不調落後非血熱即氣虛也皆為不調也
有十四日半月一月一行名落後非血熱即氣虛也皆為不調也
有兩月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
若熱腹痛無經閉痛為非受孕即經閉也受孕則經閉也
蒸熱腹痛無經閉痛為非受孕即經閉也受孕則經閉也
痛為經閉痛為非受孕即經閉也受孕則經閉也
血塊聚成塊名曰癥瘕經閉者血結為癥者氣凝為瘕
更難治時醫不悟有經閉而任為之脉亦多見為受孕而
認為經閉者每身無熱體無恙為可辨即以順氣安
氣鬱血不活也然身無熱體無恙為可辨即以順氣安
胎為主淡者氣虛也血色紫者血熱也血色黑者血極
血色淡者氣虛也血色紫者血熱也血色黑者血極
也俗醫不識以紫黑為寒者此懶讀書道聽塗說之
流耳經行黃水或行如黑豆汁者乃血之不化也以上
均屬不調總要挑旺銀紅為正色也血不通血自和氣
血自隨氣轉凡調經必先通氣虛血有氣熱血通血自和氣
血自隨氣轉凡調經必先通氣虛血有氣熱血通血自和氣

亦寒經行如期身無熱而腹無痛原不醫治至於遺前
落後紫黑黃水黑豆汁等此皆不調之症必用藥調
之若經閉蒸熱腹痛者必用藥以通之血聚成塊
癥已成必用藥雖有脉滑之分肌熱腹痛之別然
但經閉受孕雖有脉滑之分肌熱腹痛之別然
變化不齊每有相反莫如加味逍遙散通經安胎
所忌若胎切記之劑
必然墜胎切記之劑

加味逍遙散

經閉可以通經受孕可安胎乃婦科經脉之平方更能退熱

逍遙散開氣血凝經血方聚熱自成柴苓白朮薄荷草歸
芍活血在調經

柴胡 當歸 杭芍 薄荷 甘草 白朮 茯苓

柴胡 疎肝 白朮 退肌 熱 肝藏血肝疎則血活 當歸 活血 白芍 斂陰 薄荷 疎肝 白朮 茯苓 乃補氣之劑 補則血更瘀而經更閉 古
人偏用之
余每減去

加減法



鬱悶香附心熱芩氣虛黃耆養陰參趙前血熱加生地氣
虛黃芪建功熱落後血瘀行不利腹痛紅花並桃仁落後
氣虛無腹痛加上黃芪與党參方中柴胡須少用恐生外
發散將功分黃水豆汁胃濕熱猪苓澤瀉同黃芩利濕清
熱色宜正再加紅花並丹參熱蒸地骨須當用有塊鱉甲
正宜吞氣氣朮苓莫可減血凝丹紅須要遵

香附 辛 黃芩 辛 黃芪 辛 丹參 辛 生地 辛 紅花 辛 桃仁

党參 辛 柴胡 辛 猪苓 辛 澤瀉 辛 鱉甲 辛 丹皮 辛 骨皮 辛

氣滯鬱悶加香附以通氣心內熱加黃芩以清熱趙前
血熱加生地以涼血趙前氣虛者加黃芪以補氣血虛形體怯
落後血虛者臨行則腹痛不利者加紅花桃仁落後血
虛者步而無腹疼者加黃芪以補氣氣旺自能生血再
以養陰血而方中柴胡須去二錢恐生發散反無功也
黃水豆汁者胃有濕熱血不化也加猪苓澤瀉以利濕



加黃芩以清熱加紅花丹參以正其色蒸熱盛者加地
骨皮以退蒸有塊者加驚甲軟堅消塊並退熱氣虛者
方中白朮茯苓莫減亦不可多用不過每樣以補之
血凝腹痛者加丹皮紅花下以活血丹皮紅花破血傷胎少用些許
又可活血安胎

自製開鬱湯 詳血瘀門

四物湯 詳血虛門 加減法

加減法

血虛丹皮地骨蒿經閉紅花高桃仁高閉甚蒲黃寒元脂

血聚三稜義朮消

血虛生熱者加丹皮地骨皮辛青蒿以退熱經閉
不通者加紅花桃仁以開之閉甚者再加蒲黃
血寒凝結而腹疼者血熱則妄行血寒則經閉
加三稜義朮以破之血聚塊而成癥瘕者

有塊蒸熱用驚甲胡連同用效堪誇三稜義朮二味解五

靈性熱配無差



有塊必蒸熱再加
我術辛熱助火凡有塊必熱若見二味其熱更甚必須
驚甲胡連亦消塊熱以助之而驚
甲胡連亦消塊熱以助之而驚

崩漏證治

婦人何故有漏崩只因勞傷任與衝淋漓不斷為之漏忽

然大下以崩名加味膠艾皆能治血虛熟地血熱生

忽然大下為之崩俗名血山崩也即此證非大傷氣血
即血熱也滲滲不斷為之漏此亦血熱所致者多而或
是微傷者崩輕重漏輕均非易治待至血盡則死矣急
用加味膠艾湯以塞之

加味膠艾湯
即治崩漏
即膠艾四物湯也

加味膠艾湯
熟地當地榆陳棕灰崩漏第一良

大熟地
富歸
川芎
杭芍
阿膠
蒲黃炒

陳棕灰
艾葉
地榆灰
水煎服



崩者血分受傷也。故用四物湯以養血。加膠艾棕榆以塞血耳。
婦人懷孕見紅者。胎必墜也。服此或救十中之一二。孕婦見紅。胎必受傷。可知不能許之。必救。

五帶證治

婦人帶下有幾因。古人却有五色分。總由肝經濕熱致柴

苓十服建功勲。還有單方是丸藥。燥濕清熱是椿根。

帶名白帶。言其下如白涕也。此因肝腎濕熱。使飲食之精汁不能化血。則帶久之則血乾。血乾則內蒸成勞矣。古人雖有五色之分。亦不必拘拘。

自製柴苓散 專治白帶之症

自製柴苓散。將白帶管。鴻單丹。紅草。柴苓。地骨選。

柴胡。地骨皮。猪苓。澤瀉。萆薢。丹參。

紅花。甘草。水煎服。必須十餘服後方能見功也。



帶乃肝經濕熱故用柴胡疎肝地骨皮清熱猪苓澤瀉
草解以利濕濕去則精汁自變復加丹參紅花以正其
色
古書每用辛燥之劑助熱耗血每用無功反成蒸熱以
速勞症
予故自製此方每用甚效

椿根皮丸治帶甚效

椿根皮

切片晒干為面麪糊為丸每服一錢白水送

婦科經常經異之變錄明醫指掌

婦人天癸有常經血滿衝任迎月行不及期來知是熱過
期血少自分明若或色淡因痰滯熱極多來紫黑形氣滯
未行先作痛虛時行過腹中疼去多不住加涼血來少無
疼大補榮經閉要推虛實候血枯氣膈熱痰凭

夫經者常也然衝任二脉為經脉之海血氣之行內循
經絡內榮藏府氣血調適運行不息一月之間衝任血

多或行經云月事以時下此常經也其或太過不及或
多或少或紫或淡則失其常候而調之復令其氣以
寒熱之殊善治者必審其因而調之復令其氣以
復其初斯無病患必至調十年無男子合則不調未
按褚氏云男女合亦不調十年無男子合則不調未
踰十年思男子合亦不調十年無男子合則不調未
或潰而入骨或變而為腫冠氏云室女經閉多因脾
多由積想在心故也王節齋曰婦室經閉不行多因脾
胃傷損不可便作經閉血凝輕用通經破瘀之藥過有
此症便須審其脾胃如何若因飲食勞倦傷脾胃少
食惡食泄瀉疼痛或誤服汗下攻剋之藥傷脾胃少
致血少而不用行甘宜補養脾胃用白朮為君茯苓
芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等
藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食停滯致損脾
胃者亦宜消食補脾若脾胃無病果有血塊凝結者方
宜行血過期而行血不足也四物湯加黃芪陳皮八珍湯
調而色淡黃者血少四物湯加人參黃芪香附腹中不
再加蘄艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱閉經不行
四物湯加艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱閉經不行
經水不來而血色紫黑者丹溪云紫黑熱極從火化故
附經水不來而血色紫黑者丹溪云紫黑熱極從火化故

也經水來必多或作痛四物湯加黃芩黃連黃柏倍香
 附經水去多十數日經水不止者此血熱也用地黃三補丸
 主之多黃芩黃連黃柏加莎草敗龜板荊芥生地柴胡之
 痰多人佔住血海地因而多日必漸昏星矛丸主之
 肥人經閉是疾膈導疾湯加黃連川芎瘦人經閉是氣
 滯四物湯加木香檳榔只壳香附桃仁紅花經水過期
 色淡痰也二陳湯加川芎玄胡索蓬朮只壳木香桃仁
 痛氣滯血實也四物湯加玄胡索蓬朮只壳木香桃仁
 附香

月經之常錄金鑑

月經三旬時一下兩月為並三居經一年一至為避年一
 生不至孕暗經

女子陰類也水血為主其血上應太陰下應海潮月有
 盈虧潮有朝夕月經一三旬一與之相符故又為之月有
 水月信也然亦有兩月一者其常也或先或後乃
 其病也一年一行名並月者三月一者謂之居
 月者有一年一行謂之避年有一生不至而依
 育謂之暗經此所稟之不同而亦非病不須治也

月經異常

經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰垢胎受

胎下血漏胎名

婦女月經一月一下此其常也若經而吐血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月其血忽下而胎不損者是為漏胎此皆月經之異常也

又有避年之名一月一行身無熱而體無恙脉仍通透不

可以經閉攻之此亦恒有之經却不碍乎受孕

起又及至此抄錄他書以為備考以後仍是黃先生的解釋

胎前證治

婦人經有孕經不行不問脉之澹滑通但以肌膚無熱者便當順氣將熱清

蛇蛻水蛭与
蛇虫烏头附
子配天雄野
蜀水銀并巴
豆牛膝薏苡
与蜈蚣三棱
代赭羌花射
人戟蛇蛻黄
雌雄牙硝芒
胡丹皮桂槐
花牽牛皂角
同丰夏南星

婦人有孕經即不行不問脉之滑濇只以肌膚無熱者
便是受經為因血瘀經閉必發熱也婦人有孕胎氣盛
必實而內熱故順氣清熱便是安胎
內熱者自覺心熱與經鬱肌熱不同也
孕婦忌服之藥

溫熱動血胎必傷川烏肉桂合丁香更有一味是附子米

片射香與硫黃

川烏 肉桂 丁香 附子 冰片 射香 硫黃

牽牛動血善攻水大戟芫花並甘遂巴豆性烈最為上大

黃芒硝葶藶隨

牽牛 大戟 芫花 甘遂 巴豆 大黃 芒硝

葶藶

破血桃仁蒲紅花乾漆五靈元胡查三棱莪朮益母草丹

与通炸瞿麦
干姜桃仁通
脚爪地胆茅
根莫用好

皮蘇木神麥芽

桃仁

蒲黃

紅花

乾漆

五靈

元胡

山查

神曲

麥芽

三棱

莪朮

蘇木

丹皮

益母

墜胎礞石與南星。廂牛膝滑石瞿麥通。硃砂雄黃破故紙。

金箔半夏紫石英

礞石

南星

牛夕

滑石

瞿麥

木通

硃砂

雄黃

金箔

半夏

紫石英

破故子

惡阻證治

妊娠惡阻內停痰。不欲飲食心悶煩。縱然強食仍嘔吐。半夏湯治保安然。

婦人懷孕有痰惡心。阻食食下片時復吐出也。