

卷貳
叁

傷寒論淺註



張仲景傷寒論原文淺註卷二

閩長樂陳念祖修園集註

辨太陽病脈證篇

○在表在外病各不同麻黃桂枝湯亦各判請彙集而參觀之

太陽病

皮膚為表肌腠為外

外證未解

之氣為邪所傷其脈

因浮弱者當以

甘溫之藥資助肌腠之氣血從

汗而解宜桂枝湯

此一節言桂枝湯為解外之劑也○張令韶曰自此以下十五節言病有在表在外之不同湯有麻黃桂枝之各異也

柯韻伯曰桂枝溫能散寒甘能益氣生血辛能發散外邪故麻葛

青龍凡發汗劑咸用之惟桂枝湯不可用麻黃而麻黃湯不可無

桂枝也何也桂枝為汗藥中沖和之品若邪在皮毛則皮毛實而

無汗故主麻黃以直達之令無汗者有汗而解若邪在肌肉則肌肉實而皮毛反虛而自汗故不主麻黃之徑走於表止佐以葶棗甘芍調和氣血從肌肉而出皮毛令有汗者復汗而解二方之不同如此今人不知二方之旨以桂枝湯治中風以麻黃湯治傷寒失之遠矣

在表之邪未解尚見太陽頭痛等病醫者誤下之猶幸裏氣未奪反上逆與表邪交錯於胃中而為微喘

者表未解故也蓋肌也表也氣原相通邪從表而入肌亦從肌而出表故仍用桂枝加厚樸杏仁湯

主之蓋杏仁降氣厚樸寬胸方中加此二味令表邪交錯者從肌腠出於皮毛而解矣○按時人往往於肌表二字認不清所以終

身憤憤

此一節言表邪未解者不可下若誤下之仍宜用桂枝加味令其

從肌以出表

桂枝加厚樸杏仁湯

即桂枝湯加杏仁五十枚厚樸二兩炙去皮

右七味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗

在外之邪未解尚見太陽頭痛等

病其須知外證未解不可下也下之為逆欲

解外者宜桂枝湯主之

此一節言誤下後還用桂枝湯救外證之逆次男元犀按桂枝湯本為解肌誤下後邪

未陷者仍用此方若已陷者當審何逆從其變而治之然則外症未解救誤如此而內症未除者誤之當何如師故舉一隅以示人

焉

未汗而遽下之既以桂枝湯為救誤之法
太陽病先以麻黃湯發汗
既汗而猶

不解正宜以桂枝湯繼之而竟不用桂枝湯而復下之此粗工泥守先汗後下之法不知脈理故也脈浮者

不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則

愈宜桂枝湯主之

此一節言先汗後下察其脈浮病不解者仍宜用桂枝湯以解外

也言外見麻黃湯後繼以桂枝湯為正法也

請再以表病明麻黃湯之法而言太陽病脈浮緊是麻黃證的脈無汗發熱身疼痛是麻黃證的證

醫者不知用八日當陽明九日當少陽主不解表證仍在此雖為日久還

麻黃湯至主氣之期當發其汗麻黃湯服前藥已只是表邪微除而三陽之陽熱內其人

陽盛發煩陰虛目瞑劇者必逼血上衄衄出而經絡乃解所以然者

以太陽主巨陽之氣陽明主悍熱之氣陽氣重故也麻黃湯主之

此一節言病在太陽得陽明少陽之氣化合并爲熱之治法也但

言發熱不言惡寒者主太陽之標陽而言也

三陽氣盛汗之而不解者既可使其從衄而
解矣而太陽本經之熱亦有自衄而解之證 太陽病脈浮緊發熱身

無汗

不因發汗

自能

衄而解者

其病比上條三陽合并稍輕而易

愈

蓋血之與汗異名同類不得汗必得

血不從汗解而從衄解此與熱結膀胱血自下者同一局也

此一節言不因三陽之氣盛不用麻黃之發汗而太陽標陽之熱

若得衄則無不解矣○男

蔚按發熱無汗則熱鬱於內熱極絡

傷陰絡傷血并衝任而出則爲吐血陽絡傷血并督脈而出則爲

衄血此督脈與太陽同起目內背循督絡腎太陽之標熱借督脈

作衄爲出路而解也

二陽併病

緣

太陽初得病時當發其汗汗先出不

通

徹因轉屬陽明

故謂之并病夫既屬

陽明則水穀之汗相續

不絕肌自見微汗出

若不惡寒

則太陽之證已罷可以議

下

矣

若太陽

惡寒

病證不罷者不可下下之為

治逆

必須發汗

如此當知

有小發汗更

可小發汗

為偏於陽明

設面色緣緣正赤者

即面色有

熱色之象

發汗二法

為陽明

為陽明

氣怫鬱在表當

汗以解之

解之而不盡

熏之

則已

若

經氣

俱病之

重證

發汗不徹不足言

為陽氣怫鬱不得越

緣前

當

發太

汗而

汗熱邪無

其人

內擾不

煩躁

此煩躁由於不汗所致與大青

龍證之煩躁同列邪無定位

不知痛

處

腹中四肢皆陽明之所

主太陽之病邪并之或

乍在腹中

或在四肢按之不可得

其定

出為陽吸入為陰陰

其人短氣

然其人所

陽之氣不相交故

其人短氣

以短氣者

但坐以汗出不徹

以致陰

陽之氣

不交出

故也更發

其

汗則愈何以知汗出不徹以脈

滯

瀉

不流

故知

人不利

故知

其汗液也

此一節言太陽之病并於陽明也○龐安常擬補麻黃湯喻嘉言

擬桂枝加葛根湯二方俱隔靴搔癢

病由汗不徹且有小法更發之法況其為應汗不汗脈浮數者必發熱乎然亦有法雖當汗而獨取尺脈為憑為法外之法脈浮數者法當汗出而愈若誤下之雖幸其邪尚未陷而無如氣被傷而身重血被心悸者蓋衛氣營

血外循行於經絡之間而肺衛心營內取資不可發汗當聽乎水穀之氣今下後為陽明水穀之氣不充乃解所以然者尺中脈微尺為陰此裏之虛漸復胃陰又依內經之

說月郭滿則氣血實肌肉須表裏氣實而津液自和便自

汗出而愈此法外之法也

此一節言汗乃血液血液少者不可汗也

由此法而推之脈浮數之外更有脈浮緊之證脈浮緊者法當身疼痛宜以麻黃湯發汗解之假

令尺中遲者不可發汗何以知之然以營者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑乃能入之

於脈今尺中遲營氣不足血液少不能入故也前云脈浮數因誤治而虛其陰尚可勿藥

乃知中焦之營氣不足血虛少於脈故也而虛其陰尚可勿藥

而俟其自愈今則浮緊之脈不易出汗陰氣本虛不因誤治所致又

不能俟其自復而作汗若云先補後散補散兼用更爲妄語吾觀虛

人欲未病時服人參地黃等藥無數尙且未見大效以邪盛無汗之

際得之卽能補虛而不助邪乎是必無之理也當於本原處而求其

治則得矣

此一節承上節而續言脈浮緊之證以見血液少者不可發汗言

外見雖發之而亦不能作汗也

二者於尺中之脈既知其脈浮而緊其尺者病在表而營不可以發

汗宜麻黃湯遲發之不脈浮而數其尺中者爲裏不可以發汗宜麻

黃湯遲發之又不一他慮也

此一節承上文兩節之意而申言之

上言營言裏而診於尺中者以營為陰也營陰而衛陽和合而循行於肌表今請再言衛氣

為營氣本和然營氣和者證奈何蓋因衛外氣不諧以衛氣虛

不能共營氣和諧故爾蓋衛為陽營為陰陰陽貴乎和合以致營自

行於脈中衛自行於脈外兩不相合如夫婦之不調治者當乘其汗

以氣食入於陰氣長於陽既汗復發其汗則陽氣振作營衛因之和則汗不復愈宜桂枝

湯

此一節因上文營氣不足而復及於衛氣也

病人藏府無他病唯有時發熱因有自汗出有熱則汗出與無熱而

惟其所以不愈者即內經所謂陰虛者陽必此衛氣因陽熱之奏而不和也治先
 於其熱之時發其汗欲從汗以泄其陽熱並以啜則愈宜桂枝湯主之

上節言衛氣不和乃衛氣不與營氣相和此節言衛氣不和乃衛氣之自不和也張令韶云此二節言桂枝湯能和營衛而發汗亦能和營衛而止汗也柯韻伯云一屬陽虛一屬陰虛皆令自汗但以無熱有熱別之以常汗出時汗出辨之總以桂枝湯啜熱粥汗之

前言邪從衄解一在八九日三陽熱盛服麻黃湯之後而解也一在太陽本經熱盛亦有不眠麻黃湯可以自衄而解也然二者皆於衄後而解亦有衄後而傷寒脈浮緊不發汗因致衄者其衄點滴不成不解者不可不知

未解仍以麻黃湯主之

俾元府通衄乃止不得以衄家不可發汗為辭謂汗後有額上陷脈紫目直視不能轉不得眠之變

也然彼為虛脫此為邪盛彼此判然且衄家是素衄之家為內因致衄此是有因而致為外因

此一節又補言衄後邪不解之證也然邪解而脈微邪不解而脈

浮以此為辨

以上兩言得衄而解又言得衄而仍不解大旨以汗之與血異名同類不從汗解必從衄解既衄而不成衄者又當從汗而解之言之詳矣然衄證又當以頭痛為提綱以頭為諸陽之會督脈與太陽同起於目內眥邪熱盛則越於督脈而為衄也然頭痛病在上也而察其病機則在於下一曰傷寒不大便六日六經之七日又值太陽頭痛大便一曰小便若傷寒不大便六日六經之七日又值太陽頭痛

有熱者

熱盛於裏而上乘於頭

與承氣湯

上承熱氣於下以泄其裏熱

其

頭痛有熱而

小便清者

知熱

不在裏仍在表也當須發汗

以麻黃湯泄其表熱此一表一裏之證俱見頭痛

若頭痛

不者必

逼血上

衄

此可於未衄之前以頭痛而預定之也然猶有言

已者必行而為衄之未盡者病在表者固宜麻黃湯至於病在肌腠

其邪熱從肌腠而入宜桂枝湯於未解之前而解之

此一節以頭痛者必衄五字為主而言在裏在表在經之不同欲

學者一隅而三反也

總而言之桂枝與麻黃功用甚廣傷寒服麻黃發汗服後汗出身解

而桂枝湯更有泛應曲當之妙至半日許復發熱是表邪解而肌邪脈仍不見桂枝之浮弱浮數者

知非麻黃證未罷乃肌腠之邪不解動君可更易麻黃湯之峻而用

發其汗宜桂枝湯主之解肌以止煩

此一節總結十五節病有在表在外之不同湯有麻黃桂枝之各

異而申言桂枝之用更宏也

柯韻伯云桂枝湯本治煩服後外熱不解而內熱更盛故曰反煩

麻黃證本不煩服湯汗出外熱初解而內熱又發故曰復煩凡曰
麻黃湯主之桂枝湯主之者定法也服桂枝湯不解仍與桂枝湯
汗解後復發煩更用桂枝湯者活法也服麻黃湯復煩可更用桂
枝服桂枝湯復煩者不得更用麻黃且麻黃脈證但可用桂枝湯
更汗不可先用桂枝湯發汗此又活法中定法矣

○汗吐下三者攻邪之法也凡病若發汗若吐若下用之得當則若汗吐下用亡
津液而且有亡陽之患雖其汗吐下之證仍在邪去而病已若之太過為亡
陰陽氣自和者邪氣亦

必自愈

此一節言汗吐下三法不可誤用張令韶云以下十三節皆所以
發明首節之義以見汗吐下之不可誤施有如此也

天下之後復發汗以致小便不利者亡津液故也勿用利小姑便之藥治之其津

得小便利則陰陽和而必皆自愈

此一節言汗下逆施重亡津液也

下之後復發汗則氣虛於外不能必振寒血虛於內不能脈微細所以

然者以誤施汗下內外氣俱虛故也

此一節言汗下後不特亡津液并亡其內外之陰陽氣血也○男

犀按此言倒施下汗之誤病在外當汗解而反下之傷陰液於內故脈微細復發汗又虛陽氣於外故身振寒此為內外俱虛陰陽

將竭視上節病較重

下之後復發汗亡其晝日為陽陽虛欲援同氣煩躁不得眠夜為陰

則相安而安靜其不嘔不渴知其非傳裏無表證知非表不解脈沉於陰分

微氣虛於身無大熱者陽虛於表也此際不急扶其陽則陽氣先絕而不可救以乾薑附子湯主之

此一節言汗下之後亡其陽氣也

乾薑附子湯方

乾薑二兩 附子二枚生用去皮破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後邪已淨身猶疼痛為血虛無以榮身且其脈沉遲者沉則不浮不浮則非表邪矣遲則不

數緊不數緊則非表邪之疼痛矣以桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

痺血運則痛愈

此一節言汗後亡其陰血也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝 三兩 去皮

芍藥 四兩

甘草 二兩 炙

人參 三兩

生薑 四兩 切

大棗 十二枚 劈

右六味以水一斗二升微火煮取三升去滓分溫服餘依桂枝湯法

且汗吐下不如法而誤施之既已增病亦恐傷及五藏之氣先以熱邪乘肺言之蓋太陽之氣與肺金相合而主皮毛若麻黃證標陽盛者竟用桂枝湯發汗後切不可更行桂枝湯何也桂枝之汗出而能啜粥以促其汗發汗後切不可更行桂枝湯熱雖能令其汗出而能

除麻黃喘究竟汗為熱汗而麻黃無大熱者熱盛於內上乘於肺而外熱反輕也本證之汗未嘗出也取石膏止桂枝熱逼之汗仍用麻黃出本證未出之汗也

黃杏仁甘草石膏湯主之

取石膏止桂枝熱逼之汗仍用麻黃出本證未出之汗也

此一節言發汗不解邪乘於肺而為肺熱證也張令韶云自此以下五節因誤施汗吐下致傷五藏之氣也柯韻伯云溫病風溫仲

下五節因誤施汗吐下致傷五藏之氣也柯韻伯云溫病風溫仲