

醫述卷四 傷寒析疑

新安杏軒程文圃觀泉輯

門人

倪許

榜殿標
樓詠堂

校

倒序

太陽病。脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服湯已。微除。其人發煩。目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。

麻黃湯主之句。讀當在發其汗之下。吳靈樞

麻黃湯主之五字。不當在陽氣重之下。豈有衄乃解之後。而用麻黃湯之理乎。張兼善



醫述卷四

傷寒析疑目錄

倒序

錯簡

傳誤

脫佚

衍文

字訛

註辨

方考

會通

醫

述

卷四

目錄

中華書局印



問難

闕疑

平

文

分

論

論

論

論

論



北京中医药大学图书馆版权所有

醫述卷四 傷寒析疑

新安杏軒程文圃觀泉輯

門人

倪許

榜殿標
樓詠堂

校

倒序

太陽病。脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服湯已。微除。其人發煩。目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。

麻黃湯主之句。讀當在發其汗之下。吳靈樞

麻黃湯主之五字。不當在陽氣重之下。豈有衄乃解之後。而用麻黃湯之理乎。張兼善



北京中醫藥大學圖書館版權所有

解後復煩。煩見於內。此餘邪未盡。故用桂枝更汗。微除復煩。是煩見於外。此大邪已解。故不可更汗。仲景每有倒句法。前輩隨文衍義。謂當再用麻黃以散餘邪。不知得衄乃解句。何處著落。○粗工不知倒序等法。又溺於風寒二字。而曰是雖熱甚。邪猶在經。以麻黃治衄。是發散經中邪氣耳。請問邪氣寒乎熱乎。若寒邪則血凝不流。焉得有衄。若熱邪則清降不遑。而敢升發耶。柯韻伯

傷寒。脈浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。

脈緊無汗者。當用麻黃湯發汗。則陽氣得泄。陰血不傷。所謂奪汗者無血也。不發汗陽氣內擾。陽絡傷則

衄血。是奪血者無汗也。若用麻黃湯再汗。液脫則斃矣。言不發汗因致衄。豈有因致衄更發汗之理乎。觀少陰病無汗。而強發之。則血從口鼻而出。或從目出。能不慎哉。愚故急爲校正。恐誤人者多耳。柯韻伯

傷寒。不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其大便溲者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。宜桂枝湯。

宜桂枝湯句。讀當在發汗之下。吳靈樞

本條當有汗出證。故合用桂枝承氣。有熱當作身熱。大便溲。從宋本訂正。恰合不大便句。他本作小便清者謬。宜桂枝句直接發汗來。不是用桂枝止衄。亦非

用在已衄後也。勿以詞害義可耳。○太陽衄血證。宜桂枝湯句。語意在當須發汗下。麻黃湯主之句。在當發其汗下。二句皆於結句補出。是倒序法也。夫桂枝乃行血之品。仲景用桂枝發汗。不是用桂枝止衄。是用在未衄時。非用在已衄後。且奪血者無汗。此理甚明。麻黃乃上升之品。夫既云衄乃解。又云自衄者愈。若復用升提之藥。衄流不止可必矣。且衄家不可發汗。此禁甚明矣。柯韻伯

傷寒。心下有水氣。咳而微喘。發熱。不渴。服湯已。渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。

小青龍湯主之句。讀當在不渴之下。吳靈樞

小青龍主之。語意在服湯已上。豈有寒去欲解。反用燥熱之劑。重亡津液。令渴不解乎。且云服湯已者是。何湯耶。柯韻伯

小青龍湯主之句。是繳上文。他書曾易經文。今仍古本。周禹載

傷寒五六日。中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或咳者。小柴胡湯主之。

小柴胡湯主之句。讀當在喜嘔之下。吳靈樞

傷寒。十三日不解。過經讎語者。以有熱也。當以湯下之。



若小便利者。大便當鞭。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。調胃承氣湯主之。

調胃承氣湯主之句。讀當在當以湯下之之下。吳靈樞少陰病。二三日不已。至四五日腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或咳。或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。

末句真武湯主之。語意直接有水氣來。後三項。是真武加減證。不是主證。柯韻伯

少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥冷。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脈

不出者。通脈四逆湯主之。

通脈四逆湯主之句。讀當在其人面赤色之下。吳靈樞
少陰病。四逆。其人或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或
泄利下重者。四逆散主之。

四逆散主之句。讀當在四逆之下。吳靈樞

少陰病。四逆。洩利下重。其人或咳。或悸。或小便不利。或
腹中痛者。四逆散主之。

條中無主證。而皆是或然證。四逆下必有闕文。今以
洩利下重四字。移至四逆下。則本方乃有綱目。或咳
或利。或小便不利。同小青龍證。厥而心悸。同茯苓甘
草證。或咳。或利。或腹中痛。或小便不利。同真武證。種

種是水氣爲患。不發汗利水者。洩利下重。故也。洩利下重。又不用白頭翁湯者。四逆故也。此少陰氣分之下劑。厥應下之者。卽此方也。柯韻伯



北京中医药大学图书馆版权所有

錯簡

趺陽脈浮而濇。少陰脈如經者。其病在脾。法當下利。何以知之。〔若脈浮大者氣實血虛也〕今趺陽脈浮而濇。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脈〔沉〕而〔浮〕。纔見。此爲調脈。故稱如經也。若反滑而數者。故知當屎膿也。

按若脈浮大者。氣實血虛也二句。與上下文義不屬。當刪之。少陰脈弦而浮。豈可謂如經乎。當改沉滑二字。醫宗金鑑

問曰。翕奄沉。名曰滑。何謂也。師曰。沉爲純陰。翕爲正陽。陰陽和合。故令脈滑。關尺自平。陽明脈微沉。食飲自可。

少陰脈微滑。〔滑者緊之浮名也此爲陰實〕其人必股內汗出。陰下溼也。

按滑者。緊之浮名也。此爲陰實二句。與上下文義不屬。當是錯簡。醫宗金鑑

太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。

以飲水多。接太陽病句。小便利者。接下句。吳靈樞

發汗後。不可更行桂枝湯。無汗而喘。舊本有無字大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯。

下後。不可更行桂枝湯。若無汗而喘。大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯。

二條無字。舊本訛在大熱上。前輩因循不改。隨文衍義。爲後學之迷途。仲景每于汗下後。表不解者。用桂枝更汗。而不用麻黃。此則內外皆熱。而不惡寒。必其用麻黃湯後。寒解而熱反甚。與發汗解。半日許復煩。下後而微喘者不同。發汗而不得汗。或下之而仍不汗。喘不止。其陽氣重者。若與桂枝加厚朴杏仁湯。下咽卽斃矣。故於麻黃湯去桂枝之辛熱。加石膏之辛寒。佐麻黃而發汗。助杏仁以定喘。一加一減。溫解之方。轉爲涼散之劑矣。柯韻伯

傷寒。吐下後。發汗。虛煩。脈甚微。（八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉）眩冒。經脈動惕者。久而成痿。

按八九日心下痞鞭。脇下痛。氣上衝咽喉三句。與上
下文義不屬。註家皆因有此三句。不得不支離蔓衍。
牽強解釋。每見此病。總因汗出過多。大傷津液而成。
當用補氣補血益筋壯骨之藥。經年始愈。三句必是
錯簡。當刪之。醫宗金鑑

傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小
便利。其病欲愈。此肝乘肺也。名曰橫。刺期門。

此肝乘肺。讀當在腹必滿之下。自汗出小便利當在

刺期門之下。吳靈樞

太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱。汗出。復惡寒。不嘔。但
心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒。而

渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞭。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水。少少與飲之。但以法救之。渴者宜五苓散。

但以法救之一節。讀當在醫下之也之下。吳靈樞

陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤。反譫語。若加燒鍼。必怵惕煩躁不得眠。若下之則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯主之。

心中懊懣一節。讀當在身重之下。吳靈樞

陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。此處當接梔子豉湯主之句。若發

汗三段。因不用此方。而妄治所致。仍當梔子豉湯主之。仲景但于結句一見。是省文法也。後人竟認梔子豉湯爲汗下救逆之劑。否則未汗下前。仲景何法以治之乎。柯韻伯

病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令已下。脈數不解。合熱則消穀善飢。至六七日不大便者。有瘀血也。宜抵當湯。若脈數不解。而下利不止。必協熱而便膿血也。

若脈數已下。讀當在可下之下。吳靈樞

傷寒。四五日。脈沉而喘滿。沉爲在裏。而反發其汗。津液越出。大便則難。表虛裏實。久則譫語。

