

梔子豉湯方

梔子

十四枚

香豉

四合

右二味。以水四升。先煮梔子得二升半。內豉。煮取一

升半。去滓。分爲二服。溫進一服。得吐者止後服。

此條結痛。比上條微煩則較重。一證而爭差分也。前以差輕。故散之以乾薑。此以差重。故解之以香豉。蓋香豉能主傷寒寒熱惡毒。煩燥滿悶。然則二條者。大同小異之分也。

③發汗若下之而煩熱。胃中窒者。梔子豉湯主之。

此條亦與上同。窒者。邪熱壅滯而窒塞。未至於痛。而此痛較輕也。心居胃膈。所以同爲一治。

④發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。梔子豉湯主之。

虛煩不得眠者。大邪乍退。正氣暴虛。餘熱悶亂。胃中乾而不和也。劇極也。反覆顛倒。心中懊懣者。胃膈壅滯。不得舒快也。所以用梔子豉。高者因而越之之法也。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。

梔子甘草豉湯方

於梔子豉湯方內。加入甘草二兩。餘依前法。得吐止後服。

豉子生薑豉湯方

於梔子豉湯方內。加生薑五兩。餘依前法。得吐止

後服

少氣者。氣傷也。故加甘草以益之。嘔者。氣逆也。故加生薑以散之。

⑤凡用梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。

梔子酸苦。大寒而湧泄。病人舊微溏者。裏氣本虛而藏府寒也。裏氣虛則易湧。藏府寒則易泄。故揭示禁止如此。

⑥下之後。復發汗。必振寒。脉微細。所以然者。以內外俱虛故也。

內。謂反下則亡陰而裏虛。所以脉微細也。外。謂復汗則亡陽而表虛。所以振寒也。

⑦下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。乾薑附子湯方

乾薑 一兩

附子 一枚去皮生用破八片

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

反下亡陰。陰既虛矣。又復發汗。以亡其陽。則陽之虛。比之陰。爲尤甚。然陽用事於晝。熱之煩。陽之亢也。躁雖陰。陽之擾也。不得眠者。陽不能勝陰而爭奪於陰也。陰用事於夜。安靜者。無陽事也。不嘔不渴。無表證。脉沉微。身無大熱。則陽大虛。不足以勝陰。爲諦矣。故用乾薑附子。偏於辛熱。以爲湯者。恢復重虛之陽。而求以協和於偏勝之陰也。

⑤傷寒若吐。若下後。心中逆滿。氣上衝胃。起則頭眩。脉沉緊。發汗則動經。身爲振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓

四兩

桂枝

三兩
去皮

白朮

二兩

甘草

二兩
炙

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

心下逆滿。伏飲上溢。搏實於膈也。氣上衝胃。寒邪
土湧挾飲。爲逆也。動經。傷動經脉。振振。奮動也。蓋
人之經脉。賴津液以滋養。飲之爲飲。津液類也。靜
則爲養。動則爲病。病宜制勝之。不宜發汗。既吐下
後。脉又沉緊。而復發汗。則重亡津液。氣血衰耗。故
變如此。朮與茯苓。勝濕導飲。桂枝甘草。固表和中。
故發汗動經。所
需者四物也。

傷寒吐下後。發汗。虛煩。脉甚微。八九月。心下痞鞭

脇下痛。氣上衝咽喉。眩冒。經脉動惕者。久而成痿。

此申上條而復言失於不治則致廢之意。上條脉
沉緊。以未發汗言也。此條脉甚微。以已發汗言也。

經脉動。卽動經之變文。惕。卽振振。大抵兩相更互發明之詞。久言旣經八九日。若猶不得解而更失於不治。則津液內亡。溼淫外漬。必致痺而成痿。痿者。兩足痿軟而不相及也。

⑤ 太陽傷寒者。加溫鍼必驚也。

溫鍼者。鍼用必先燒溫。以去其寒性也。驚者。心有所動而惶懼也。蓋心乃神之舍。故謂心藏神。榮氣通於心。故榮與心皆主血。寒邪傷於榮。鬱而蒸熱矣。溫鍼以攻寒。火之性大熱。血得熱則耗。耗則虛。血虛則心虛。心虛則舍空。舍空則神無所依而氣浮越於外。故失守而驚惶也。

⑥ 傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。

小建中湯方

桂枝

三兩
去皮

芍藥

六兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

膠飴

一升

大棗

十二枚
擘

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用。建中湯以甜故也。

二三日。當傳之時。不傳不變。但心中悸而煩者。邪雖衰微。正亦虛弱。不足以退散之。所以持也。小建中者。桂枝湯倍芍藥而加膠飴也。桂枝湯扶陽而固衛。衛固則榮和。倍芍藥者。酸以收陰。陰收則陽歸附也。加膠飴者。甘以潤土。土潤則萬物生也。建中法也。定法惟中。不偏不黨。王道蕩蕩。其斯之謂乎。

⑤傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。

甘草

炙 四兩

生薑

切 三兩

桂枝

三兩 去皮

麥門冬

半升

麻子仁

半升

大棗

擘 十二枚

人參 二兩

⑤地黃 一斤

阿膠 二兩

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味取三升。去滓。內膠烱消盡。溫服一升。日三服。一名復脉湯。

脉結代而心動悸者。虛多實少。譬如寇欲退散。主弱不能遣發而反自徬徨也。人參甘草麥冬益虛以復結代之脉。地黃阿膠麻人。生血以寧動悸之心。桂枝和榮衛以救實。薑棗健脾胃以調中。清酒爲長血氣之助。復脉乃核實義之名。然則是湯也。必欲使虛者加進。而馴至於實。則實者自退散。而還復於元之意也。○本條結代下文無代而有代陰中間疑漏代一節

脉。按之來緩而時一止。復來者名曰結。又脉來動而中止。更來小數。中有還者反動。名曰結陰也。脉來動而中止。不能自還。因而復動。名曰代陰也。得此脉者

必難治。

結陰也。下當有代脉一股。

此承結代而推言結陰代陰以各皆詳辨其狀與辨脉下第四章意同。

〔罕〕傷寒八九日。風溼相搏。身體疼煩。不能自轉側。不

嘔不渴。脉浮虛而澀者。與桂枝附子湯主之。

桂枝附子湯方

桂枝

四兩 去皮

附子

三枚 炮 去皮破八片

生薑

三兩 切

甘草

二兩 炙

大棗

十二枚 擘

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

風溼相搏。見上篇。此以得之寒因。故身體疼煩。不嘔不渴也。不能自轉側者。溼主重著也。浮。風也。虛。則汗後之不足。澀。溼也。與上篇小異而大同。桂枝附子湯者。即上篇之甘草附子湯。以薑棗易朮之

變制也。去木者。以寒本無汗。不似風之自汗而溼多也。用薑棗者。以寒屬陰。不如風陽之能食也。然去彼取此。雖少殊。而其所。以爲散風除溼。則均耳。

若其人大便鞭。小便自利者。去桂枝加白朮湯主之。
脉經末句湯名無白字

桂枝附子去桂枝加白朮湯方

於桂枝附子湯方內。去桂枝加朮三兩。餘依前法。
大便鞭。裏實矣。故去桂枝。惡其主表而不知裏也。
小便自利。濕勝也。故加朮。以其益土而能燥溼也。
○此加減
舊闕今補

㊟太陽病。項背強。几几。無汗惡風者。葛根湯主之。

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節

桂枝 二兩 去皮

芍藥 二兩

甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

右七味。㕮咀。以水一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。及禁忌。

太陽病項背強几几與上篇同者。風寒過太陽之榮衛。初交陽明之經絡。經絡同。所以風寒皆然也。無汗者。以起自傷寒。故汗不出。乃上篇有汗之反對。風寒之辨別也。惡風乃惡寒之互文。風寒皆通惡而不偏有無也。夫以太陽中風項背強几几汗出惡風用桂枝加葛根而論之。則此太陽傷寒項背強几几無汗惡風當用麻黃加葛根。而用葛根湯者何哉。蓋几几乃加陽明之時。喘已不作。故去

杏人。不用麻黃湯之全方。不可以麻黃加爲名。而用麻黃桂枝甘草葛根以爲湯者。實則是麻黃加之規制也。用薑棗芍藥者。以陽明屬胃。胃爲中官。薑棗皆和中之物。芍藥有緩中之義也。不須啜粥。麻黃類例也。

⑤ 太陽與陽明合病。喘而胃滿者。不可下。麻黃湯主之。

合病見上篇。肺主氣。氣逆則喘。喘甚則肺脹。胃滿者。肺脹也。胃乃陽明之部分。喘乃太陽傷寒之本病。以喘不除。甚而至於胃滿。故曰合病。然肺不屬太陽。陽明而太陽陽明合病之傷寒。病全在肺。何也。曰。肺爲五藏之華蓋。內受諸經百脉之朝會。其藏金。其性寒。寒邪奏於榮。肺以寒召寒。類應故也。不可下者。喘來自太陽之初。滿惟在胃。不在胃也。夫麻黃湯者。主治太陽傷寒之初病。有陽明。何以獨從太陽之主治也。曰。麻黃固善於散寒。其功尤能瀉肺家之實滿。杏人惟其利於下氣。故其效則

更長於定喘。桂枝雖佐。其實有綱維之妙。甘草雖使。其才有和緩之高。是故太陽表之治行。則陽明胃之功自奏矣。

（聖）太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。

必。定然之詞。自。謂自然也。蓋太陽者。膀胱也。膀胱主水。陽明者。胃經也。胃主穀。寒為陰。陰氣主下降。故傷寒無他故。自然而下利者。太陽陽明合病。經中之邪熱甚。胃氣弱不化穀不分清。雜逆而走注。所以謂之必也。以必定自然。而然下利。故但用葛根湯散經中之寒邪。而不治下利。以不治治利者。麻黃散太陽之表。葛根解陽明之肌。桂枝主榮衛之和。薑棗健脾胃之弱。甘草者。和中之國老。芍藥者。緩中而佐使。夫如是而經中之邪散。則胃中之正回。不分清者自分清。不顯治者而治在其中矣。噫。王者不治夷狄。而夷狄自治。聖人無為而無不為。所謂仁之盡義之至。吾於是乎重有感焉。彼以煦煦為仁。子子為義。竊聖人之王道以亂名實者。謂不自欺以欺人。公孫龍不能為之說也。

悲哉

⑤二陽併病。太陽初得病時發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之爲逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之熏之。若發汗不徹。不足言陽氣怫鬱不得越。當汗不汗。其人躁煩。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脉澀故知也。

轉與傳同見第五問。併病見上篇。太陽初得病時至不惡寒。是原致併之因。若太陽證不罷至解。

之熏之。是言治之之次第。若發汗不徹。至未是。反復申上文之詳。微。除也。去也。不徹。言汗發不如法。病不除去也。越。散也。言怫鬱不散也。澀。為血虛。血虛者。汗出過多也。所以轉陽明也。

【望】傷寒六七日。結胸熱實。脉沉緊。心下痛。按之石韮者。大陷胸湯主之。

沉為裏。緊為寒。結胸。故心下痛。熱實。故石韮。方見上篇。蓋證同也。

【望】小結胸。病正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胸湯主之。

小陷胸湯方

黃連 一兩

半夏 半升

栝蒌實 一枚

右三味。以水六升。先煮栝蒌取三升。去滓。內諸藥。煮

取二升。去滓。分溫三服。

正在心下。言不似大結。胃之高而在上也。按之則痛。言比不按亦痛。則較輕也。浮則淺於沉。滑則緩於緊。此結胸之所以有大小之分也。黃連苦寒。以泄熱也。半夏辛溫。以散結也。栝蒌實苦而潤。苦以益苦。則致熱於易泄。爲可知。潤以濟辛。則散結於無難開。可必。所謂有兼人之勇而居上功者。惟此物爲然也。

⑤傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胃無大熱者。此爲水結在胃脇也。但頭微汗出者。大陷胃湯主之。

水卽飲也。以不實鞭。故曰水結。胃脇亦裏也。以熱結不高。故曰在裏。此條兩節。上節以往來寒熱。故用大柴胡湯。下節以水結無大熱。故用大陷胃湯。然熱結與水結。胃脇與裏。皆互詞。大同小異。皆下

法也。○二方
俱見上篇

㊟太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩湯方

黃芩 三兩

甘草 二兩
炙

芍藥 二兩

大棗 十二枚
擘

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再。夜一服。

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內。加半夏半升。生薑三兩。餘依黃芩