

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洄溪著

傷寒

素問

素熱論篇。帝曰。今天熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六七日之間。其愈皆以十日以上者。何也。岐伯對曰。巨陽者。諸陽之屬也。其脉連於風府。故為諸陽主氣也。人之傷於寒也。則為病。熱雖盛。不死。其兩感於寒而病者。必不免於死。帝曰。願聞其故。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。二日。陽明受之。陽明主肉。其脈俠鼻。絡於目。故身熱目痛。而鼻乾不得卧也。三日。少陽受之。少陽主膽。其脈循脇。絡於耳。故胸脇痛。而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入於臟者。故可汗而已。四日。太陰受之。太陰脈布胃中。絡於嗌。故腹滿而嗌乾。五日。少陰受之。少陰脈貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日。厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡於肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。除之。厥陰脈循陰器而絡於肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。除皆連五臟。故曰入臟。非風寒直入臟中也。其不兩感於寒者。七日。巨陽病衰。頭痛稍愈。八日。陽明病衰。身熱稍愈。九日。少陽病衰。耳聾微聞。十日。太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日。少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而嚏。十二日。厥陰病衰。囊縱少腹微下。大氣皆去。病日已矣。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之各通其臟脈。病日衰已矣。其未滿三日者。可汗而已。其滿三日者。可泄而已。水熱穴論。帝曰。人傷於寒。而傳為熱。何也。岐伯曰。夫寒甚則生熱也。

兩感。素熱論。帝曰。其病兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯曰。兩感於寒者。病一日。則巨陽與少陰俱病。則頭痛口乾而煩滿。二日。則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫言。三日。則少陽與厥陰俱

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洄溪著

傷寒

素問

素熱論篇。帝曰。今天熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六七日之間。其愈皆以十日以上者。何也。岐伯對曰。巨陽者。諸陽之屬也。其脉連於風府。故為諸陽主氣也。人之傷於寒也。則為病。熱雖盛。不死。其兩感於寒而病者。必不免於死。帝曰。願聞其故。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。二日。陽明受之。陽明主肉。其脈俠鼻。絡於目。故身熱目痛。而鼻乾不得卧也。三日。少陽受之。少陽主膽。其脈循脇。絡於耳。故胸脇痛。而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入於臟者。故可汗而已。四日。太陰受之。太陰脈布胃中。絡於嗔。故腹滿而嗔乾。五日。少陰受之。少陰脈貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日。厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡於肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。陰脈皆連五臟。故曰入臟。非風寒直入臟中也。其不兩感於寒者。七日。巨陽病衰。頭痛稍愈。八日。陽明病衰。身熱稍愈。九日。少陽病衰。耳聾微聞。十日。太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日。少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而嚏。十二日。厥陰病衰。囊縱少腹微下。太氣皆去。病日已矣。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之各通其臟脈。病日衰已矣。其未滿三日者。可汗而已。其滿三日者。可泄而已。水熱穴論。帝曰。人傷於寒。而傳為熱。何也。岐伯曰。夫寒甚則生熱也。

兩感。素熱論。帝曰。其病兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯曰。兩感於寒者。病一日。則巨陽與少陰俱病。則頭痛口乾而煩滿。二日。則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫言。三日。則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥陰水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病

素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交

素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒發熱而脈躁急不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰

病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也遺證素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀋熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之散瀋溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈

陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未出也陽盛陰虛者身熱汗閉燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也此以有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脈證

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病也其脉上連風府故頭項痛腰脊強發熱汗出惡風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒 發於惡寒者發於陽也無熱惡

寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊惡寒未罷太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能卧 陽明外證身熱汗自出不惡寒反

惡熱也邪氣已離太陽陽明脈太明以上皆陽病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明 傳三條皆太陽陽明者

脾約是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也 陽明之為病胃家實也陽明

明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌甘目眩也 尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽

中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽頭痛

發熱與太陽同而三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗已極傷寒六七日無大熱內熱重則其

人躁煩者此為陽去入陰也躁則病欲速愈矣傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為

三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛 尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於嗌

故腹滿而嗌乾 傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰 同乃太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉自利不

渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩 此自利而不利而渴熱入下焦也

少陰之為病脈浮細但欲寐也 衛氣行於陽則寐少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少

陰也 尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

傷寒

傷寒

傷寒

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐蚘下之利不止尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈

此本陶節庵最為明晰

足太陽脈起於目內眥從頸下後項連風府行身之後終於足其外證頭疼項強腰脊痛骨節痛惡寒發熱惡寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤小便不利者當利自利者不可利利之引氣入膀胱其人如狂不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌故其證目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便祕腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脈起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨證加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰脈弦數者是本經證

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈連喉也頭不疼陰脈至頸而還也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心胸行身之後也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑為寒也初病大熱至此變為厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰又難拘定法因分直中者

寒證傳經者熱證大抵六經中惟此難辨有直中真陰者有夾陰中寒者有夾陰傷寒者有虛陽伏陰者有陰極發躁者有漏底傷寒者前二證身不熱厥冷全似少陰傳經而冷者後四證身熱面赤又全似陽大要口燥舌乾渴而謔語大便實者傳經熱證也足冷嘔吐瀉痢不渴或惡寒腹痛者直中真寒證也足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇與督脈會於顛頂行身之側也其證煩渴囊拳消渴舌捲謔語大便不通而頭疼手足乍冷乍溫者此是陽經傳來熱邪本病宜急下若發熱惡寒狀如瘧疾此是熱邪在經標病宜和解若不嘔使清當有大汗至而自愈頭疼者以督脈會於顛頂故也抵熱深厥亦深則舌捲囊縮也陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足冷不冷脈沉實沉細別之誤人多後人皆指為極寒概用溫熱誤人無算熱證傷寒論自知

傷寒六經治法方傷寒類方中不更贅

桂枝湯俱本傷寒論治太陽中風頭疼發熱汗出惡風

桂枝去三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右五味以水七升微火煮取三升去滓

通寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身熱微似有汗者益佳不可令如水流瀉病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小

促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物此服外感風寒之藥服法俱當如此

麻黃湯治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃三兩桂枝二兩甘草二兩杏仁七十箇湯右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須吸粥餘如桂枝法將息

附方

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身暴

桂枝一兩十六 芍藥酒洗 生薑切

甘草炙 麻黃去節 一兩

大棗四枚 杏仁去皮尖及兩仁 湯去

七味以水五升

先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強几几反汗出惡風

葛根四兩 芍藥二兩 甘草二兩 生薑切 三兩

大棗十二枚 桂枝去皮 三兩

右六味以水一斗先煮葛根減二

升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法黃則為葛根湯矣

無已本誤加

葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者又治太陽陽明合病自下利者

葛根四兩 麻黃三兩 桂枝去皮 芍藥二兩 甘草二兩 生薑切 三兩

大棗十二枚 右七味以水一斗

先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將

息及禁忌

葛根黃芩黃連湯 治太陽證誤下利遂不止喘而出汗者此主之

葛根半斤 甘草炙 黃芩各二兩 黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升

去滓分溫再服

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也此主之

桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩 生薑切 三兩

大棗十二枚 右五味以水一斗

先煮桂枝芍藥減二升去滓溫服一升

適寒溫服一升此即桂枝湯加芍藥一倍即另成一方而以之治

大青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱身疼不汗出而煩躁者

麻黃六兩桂枝二兩甘草二兩杏仁四十粒生薑三兩大棗十二枚石膏如雞子右七味以水九升

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗此風寒兩傷之方汗出多者溫粉撲之按載大青龍何以不載小青龍蓋

停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也此青龍治傷寒不解心下有水氣之證非傷寒正方也

桂枝加桂湯 治燒針令其汗針處被寒核起微赤必發奔豚灸其核上各一壯與此湯即桂枝湯加

桂二兩

小柴胡湯 治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔腹痛心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室

等證

柴胡半斤黃芩人參甘草各三兩半夏半升生薑三兩大棗十二枚右七味水一斗二升煮

取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實一枚若渴

者去半夏加人參合前成四兩半枳實根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞鞭去

大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂

三兩溫服取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾姜二兩此方加減

大柴胡湯 治傷寒十餘日柴胡證仍在嘔而心下急心中痞鞭而痞熱結在裏往來寒熱等證

柴胡半斤黃芩三兩芍藥三兩半夏半升生薑五兩枳實四枚大棗十二枚右八味以水

一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

大承氣湯 治傷寒十餘日吐下後不解晡時發潮熱獨語如見鬼狀尋夜攪床胃中有燥屎也此下之

大黃四兩厚朴半斤枳實五枚芒硝三合右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取

二升去滓納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服明言即所謂胃中實是也乃腸胃之總名



小承氣湯 治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便鞭謔語者與此湯微和胃氣

大黃厚朴二兩去炙枳實三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更

夜不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯 治胃氣不和不惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩去炙甘草二兩芒硝半斤

右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝

更上火微煮令沸少少溫服可下此仲景乃外邪已盡之要法

桃核承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝

解外外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個桂枝二兩大黃四兩芒硝

甘草各二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓納芒

硝更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利

抵當湯 治傷寒六七日少腹鞭小便自利其人如狂善忘大便黑此有蓄血

水蛭熬蟅蟲各三十個桃仁三十個大黃酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一

升不下再服

抵當丸 治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭二十蟅蟲二十桃仁二十大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

時時當下血若不下者更服

大陷胸湯 治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞭舌上燥渴小有潮熱心下至少腹痛不

可近



大黃兩芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘

遂末溫服一升得快利止後服。結胸乃水飲為患傷寒論云此為水結故用甘遂

大陷胸丸 治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之

太早故也

大黃半斤葶藶子煮芒硝

杏仁去皮尖熱右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散

取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢已白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿下如不下更服取

下為效

小陷胸湯 治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩半夏半升括婁實一箇右三味以水六升先煮括婁取三升去滓納諸藥煮取二升去

滓分溫三服

白虎湯 治脈滑而厥裏有熱也又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

陽極於內發散則路遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯 治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節細辛二兩附子一枚泡去皮破八片右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

四逆散 治少陰傳經熱邪四逆或發或慄或小便不利或腹中痛或泄痢下重者

甘草炙枳實破水漬芍藥各十右四味搗篩白飲和服方寸匕三日服效者加五

枳實破水漬柴胡

芍藥各十

右四味搗篩白飲和服方寸匕三日服效者加五

傷寒

五

味子乾姜各五分并主下痢。悸者加桂枝五分。小便不利者加茯苓五分。腹中痛者加附子一

枚炮令拆。泄痢下重者先以五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升

分溫再服。熱邪入深乃見四逆誤認為寒貽害非淺。薤白能治下重以能瀉大腸之氣也。

四逆湯治脈沉體痛溫溫欲吐下利清穀手足厥冷內寒外熱脈微欲絕等證。

甘草二兩乾姜一兩附子一枚皮破八片生用去右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強

人可大附子一枚乾姜三兩四逆湯不可輕用一症決用無疑。細審必諸症皆全方可決用無疑。

四逆加人參湯治痢後亡血本方加人參。

通脈四逆湯治下痢清穀脈絕汗出而厥本方加乾姜一倍。

通脈四逆加猪膽汁湯治汗出而厥脈絕拘急本方加猪膽汁。

當歸四逆湯治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因而腸鳴者。

當歸桂枝芍藥各三細辛二兩大棗二十枚甘草通草各二右七味以水八升煮取

三升去滓溫服一升日三服。此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主。

理中凡及湯治霍亂頭痛發熱身疼痛寒多不用水者理中湯若大病瘥後喜唾久不了了胃上有寒

者用理中丸。

人參甘草炙白朮乾薑各三右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一

丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升者

取三升去滓溫服一升日三服。四逆乃溫下焦中焦之法各有部位也。

附子瀉心湯治心下痞而復惡寒汗出。



大黃二兩黃連

黃苓一附子一枚泡去皮

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去

澤。納附子汁。分溫再服。

治上焦用生藥故漬而不附子能回陽止汗

梔子豉湯

治汗吐下後

虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子豉湯

治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

進一服得吐者止後服

即在高之分以此吐之所謂在上者此吐方之最和平者

真武湯

治太陽汗出不解仍發熱心忪頭眩身動振振欲倒地者

又治少陰至四五日小便不利

四肢沉重疼痛自下痢此為有水氣

茯苓

芍藥

生薑各三白朮二兩附子一枚泡去

右五味以水八升煮取三升去滓溫服

七合日三服

此治水逆之正方

若欲者加五味半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓若下痢者

去芍藥加乾薑二兩

若嘔者去附子加生姜足前成半斤

大黃黃連瀉心湯

治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服凡治下焦之補劑當多

瀉劑當不煎以生為主此亦治至高之熱邪故亦用生藥

白通湯

治少陰下痢

葱白四莖乾薑一兩

附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服此為

白通加豬膽汁方

治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成納人尿五合豬膽汁一合分溫再服

豬膚湯

少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之

猪膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

陰虛下達

瓜蒂散 治太陽病胸中痞硬氣上冲胸不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能

食病在胸中並當吐之

瓜蒂散 赤小豆各一 右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮

作稀糜去滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後脈逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不利吐膿血泄利為難治主之

麻黃二兩半升麻 當歸各一分 知母 黃芩 姜豉各十銖石石膏碎綿 白朮 乾姜

芍藥 天冬去心桂枝 茯苓 甘草六銖 右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上

沫納諸藥煮取三升去滓分温三服令汗出愈

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞硬噫氣不除此主之

旋覆花三兩人參二兩生薑五兩 半夏半升 代赭石一兩 大棗枚十二甘草三兩 右七味以水一斗

煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者

半夏洗破十 雞子苦酒煮散中 右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去

甘草二兩 右一味以水二升煮減半去滓温服七合日二服 桔梗湯加桔梗一兩煎法同此方



北京中醫藥大學圖書館藏

滓少少含燕之。不差更作三劑服之。製法

枳實施子鼓湯 治大病瘧後勞復

枳實三枚 施子十四枚 鼓一升

者五六沸去滓溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者加大黃如博棋子大五六枚。作大瘧後勞復用降氣

清火之品 當細參之

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者
方見通治 壯火食氣 故少氣者多羸火症

燒視散 治陰陽易病其人身重少氣少腹裏急陰中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脛拘急

右取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈。婦人病取男子視

當燒灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中

蜜煎導法 以蜜煎老捏作指大一條納穀道中以手按之

右二方俱治傷寒大發汗小便利津液內竭大便雖難不可攻之用此法

治男子新病起房內復者方針 取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治交接勞復陰卵腫腹中絞痛便欲死方針 取所交接婦人衣服以覆男子立愈

竹皮湯針 治交接勞復卵腫腹痛便絕欲死

青竹皮一升 右一味水三升煮五六沸絞汁頓服立愈此方范汪亦治大便後勞復

瘵食勞方針 杏仁五十 右一味以酢二升煎取服之取汗則差

治結胸灸法 本方



巴豆四寸連皮用

右搗細末。用津唾和成膏。填入臍心。以艾灸其上。腹中有聲。其病去矣。不

拘壯數。以病退為度。纔灸了。便以溫湯浸手帕拭之。恐生瘡也。俱可依法外治。

鵲石散本事

治傷寒發狂。棄衣奔走。踰牆上屋。

黃連

寒水石各等

右為細末。每服二錢。濃煎甘草汁調服。

蠶甲散治人

治傷寒八九日不瘥。名曰壞證。傷寒不能治者。宜此療之。

升麻

前胡去蘆烏梅去核枳實麩炒犀角鎔黃芩各半生地黃切甘草一分蠶甲醋炙

用升麻升麻

右剉如麻豆大。每服抄五錢。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。

升麻蠶甲湯

陽毒之為病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。此湯主之。

升麻二兩

當歸一兩蜀椒炒去汗甘草二兩蠶甲手指大雄黃研

右六味以水四升煮取一升。

頓服之。老小再服取汗。

升麻蠶甲去雄黃蜀椒

陰毒之為病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻蠶甲

湯去雄黃蜀椒主之

肘後千金方。陽毒用升麻湯。無蠶甲。有桂。陰毒用甘草湯。即本方無雄黃。活人

陽毒升麻湯。用犀角射干。黃芩。人參。無當歸。蜀椒。蠶甲。雄黃。麩炒。犀角。等四味。頗切當。

梔子仁湯治人

治陽毒傷寒壯熱。百節疼痛。

梔子仁一兩

柴胡半兩升麻黃芩各二兩赤芍一兩大青一兩石膏二兩知母一兩甘草半兩

杏仁二兩湯浸去皮尖及

右件搗為粗末。每服抄四錢。以水一盞入生姜半分。豉一百粒。煎至六

分。去滓。不計時候溫服。

還陽湯本事

治陰毒面色青。四肢逆冷。心燥腹痛。用硫黃末。新汲水調下。良久。或寒一起。或熱一起。



更看緊慢再服一二錢。則為汗出差。

姜蕤湯治風溫。兼瘡冬溫。及春月中風傷寒。發熱頭眩痛。喉咽乾。舌強。胸內疼。痞滿。腰背強。

姜蕤三分石膏一斤白薇麻黃乾梓川芎葛根二兩大羌活去蘆甘草炙

杏仁去皮尖雙仁青木香春用半兩。炒右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎二盞。日三四服。

此清散之劑。可治時疫。

白虎加蒼朮湯治濕溫多汗。

知母五兩甘草二兩石膏一斤蒼朮

取汁溫服。粳米各三右為末。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓。

黑膏治溫毒發斑。

好豉一升生地黃切右二味。以猪膏二斤。合煮之。煎令三分減。一絞去滓。用雄黃麝香如豆大。

者。內中絞和盡服之。毒便從皮中出。則愈。凡外感之症。治之得宜。六七日間。病無不愈。過期不愈。皆治

治法。千端聚訟。不無惑仲。景傷寒論。治傷寒之方。不過數首。餘皆誤治之變。症現不可窮。極以治

症。致廢也。張傷寒為外感之總名。變出八千頭。萬緒紛紜。皆傷寒論一字之變。症現不可遺漏。令止舉六經本

精通之。則凡為外感之病。游刃有餘矣。故此集外感之方。選錄甚少。意有在也。

百合病

金匱

論曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默然。欲卧不能卧。欲行不能行。飲食或有美

時。或有不聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形

如和其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十



日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。
百合病。見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此為逆。見陰攻陽。乃復下之。
此亦為逆。此等症病後得之者甚多。醫者不知多方誤治。以致病氣日深。不可投藥。始終無一人能識之者。偏地皆然也。百脈一宗。悉病。蓋肺朝百脈。故以百合治肺為主藥。

百合病方

百合知母湯驗 百合病發汗後者。主之。

百合七枚 知母二兩 右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。

別以泉水三升。煎知母。取一升。去滓。後合和煎取。

滑石代赭湯驗 百合病下之後者。主之。

百合七枚 滑石三兩 代赭石如彈丸大一枚 右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

百合雞子湯驗 百合病吐之後者。主之。

百合七枚 雞子黃一枚 右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

滓。內雞子黃攪勻。煎五分。溫服。

百合地黃湯驗 百合病不經吐下。發汗。病形如初者。主之。

百合七枚 地黃一斤 右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

去滓。內地黃汁。煎取一升。五合。分溫再服。中病勿更服。大便當如漆。

百合洗方驗 百合病一月不解。變成渴者。主之。

百合一升。以水一斗。漬之一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿以鹽豉也。