

嘔吐

霍亂

作酸

噯氣

木乘土

嘔膈

痢疾

腕痛

癱鬼

痿症

頭痛

腹痛

脇痛

面

疳

牙血

喉症

婦人科

八脉

內外兼症

癩瘰

疔

骨疽

五樂亭指要

摩



婦人科

劉 經水先期來時發熱骨節煩疼脈來微弱此

八珍湯加味取其氣血並補

洋參 茯苓 冬朮 炙甘草 川芎 白芍 當歸 白

生地 澤瀉



南京中醫藥大學圖書藏版所有

黃樂亭先生指要卷肆目錄

嘔吐

霍亂

作酸

噯氣

木乘土

噎膈

痢疾

腕痛

癖塊

痿症

頭痛

腹痛

脇痛

面

疔

牙血

喉症

婦人科

八脉

內外兼症

癩瘰

疔

骨疽



嘔吐

某 胃為陽土喜潤而惡燥宜降不宜升今診脈右關滑大

紅口甜納穀輒吐無餘雖湯飲不納業已月餘大便兩旬不


脈症合參係陽明實火閉結胃氣有失下行之旨法宜清降

川貝牛活水芦根去節竹茹牛淡姜渣牛

另用上龍井茶葉一撮生薑一片泡湯飲白扁豆煮爛如糊
食之以代粥嘔止便解用獨參湯以扶正氣

更左朝日暮吐脈來細軟當培火生土

嘔吐



焦六曲 為焦 為芽 為沒 干姜 為辰 為冬 木 為灸 州 為

益智仁 為遠志 為扣仁

陳左胃氣逆 以致作嘔

半夏 為黨參 為生熱 砂仁 為蔻仁 為丁香 為烏梅 為

陳名厥陽犯胃 氣逆則嘔 胃氣下行 為順 肝陽以清洩為宣 但

由來已久 不可不亟扶正

半夏 為陳皮 為砂仁 為只壳 為洋參 為川連 為吳萸 為

竹茹 為芦根 為車前子 為姜 為大麥仁 為



南京中醫藥大學圖書館版權所有

某納食輒嘔。着寒則甚。胸腕作痛。

冬朮言党參言炙草言扣仁言陳皮言沒干姜言

木香汁言灶心土煎湯代水

王左嘔吐本胃病。而胃為腎之閔。有因水之不足。而不能制胃

火者。有因火之不足。而不能生胃土者。此而說之。辨論最詳。大

凡食入即出者。屬火之有餘。必得腎水以濟之。無過於六味作

湯。資飲昨服。既能安適。不必日二更換。且服十劑再商。

熱地黃芩肉桂丹皮芍藥苓言淮藥言澤瀉言為淮膝



邵在久咳邪移於胃則嘔此胃失下行之司而上逆也按六書合蘇子降氣法肺胃同調

党参 半夏 陈皮 茯苓 冬木 炙州 蘇子

砂仁 生姜

某 胃氣應降不降濁氣不泄而作嘔

半夏 陳皮 砂仁 柏子仁 萊服子 蘊子 姜

大麥仁

陳右診脉左寸關獨數納食輒嘔大便不通肝陽犯胃腑氣有



升無降。

川連子 枳實子 吳萸子 檳榔子 姜仁子 姜子 三川棟子子

青皮子 木香子 洋參子 黑梔子 元胡子 胡索子 生熟

吳 脈形兩損。咳痰嘔逆。身熱汗濡。頭暈氣升。症勢甚劇。擦涌

中培土。莫其嘔止納穀。

冬木 淮藥 白芍 陳皮 茯苓 穀芽

過左面色淡白。口吐清涎。脈至關脈沉細。寒濕停於胃脘。理中

湯主之。

嘔吐

三



党参 冬术 炙炒炭 泡姜 陈皮 扣仁

孫名胃氣大傷納食則吐棄味伍劣者均此所宜

竹茹 姜汁 烏梅 伏龍肝 煎湯飲

又龍井茶葉 薑 又好醋 薑 建蓮煮爛作點

山藥煮爛代飲 大鯽魚煮熟 薑 醃者醃食

陳 積飲停疫作脹作嘔

半夏 陳皮 生熟砂仁 神曲 焦麦芽 茯苓

木香 生薑



華名津液不足。氣血虛弱。納穀則嘔。腕中作痛。宜與平潤腑氣
以通為補。

製半夏子 薤白子 姜仁子 會皮子 姜子 大麥仁子
又 原方加生熟砂仁子 川鬱金子

馬名食入至飢。時作嘔。完穀不化。脾陽式微。運化失職。

乾姜子 党參子 熟附子 生薑子 半夏子

許名嘔吐完穀。腕痛攻撐。六脈沉細。不持胃氣。脾陽亦衰。

党參子 半夏子 乾姜子 白蜜子 灶心土煎湯代水

砂子子

姜子

嘔吐

四



棄左脾不克運。胃氣逆以納穀。輒嘔。腕痛作痰。右關見滑數。不無疫火而益挾滯。撥和中法。

製半夏為麩皮。茯苓為生熟。砂仁。川朴。查炭。大麥仁。以姜渣。竹茹。

趙左知飢能納。食必一二時。胸腹漸痛。得水穀。行吐出。方適。顯係脾氣失健失運。

異功散加川朴。枳壳。麩。神曲。樞榔。荔枝。

蛇羹。木香。



管石納穀輒嘔。胸次有塊。積滯踞於中宮。以致胃不容納。

製半夏二姜廣皮為檳榔為枳壳二姜進曲為川朴二姜木香

生熟砂仁二姜香附為

蔣左中脘結塊如拳。攻滯嘔吐。

焦白朮二姜焦枳壳二姜生熟砂仁二姜神曲為木香二姜

焦芍藥二姜

史名肝胃之氣上逆。為吐酸。為噦噎。

党參二姜枳實二姜青皮二姜吳萸二姜炙州二姜覆花二姜製半夏二姜

嘔吐

五



扣仁 豆代赭石 三 麦芽 三

接方

製半夏 夏 日 茯苓 日 廣皮 日 香附 日 扣仁 日 必澄 加 日

共研末 每用一錢 將木香湯送下

嚴忌 飲食不運 胸脹痛嘔吐

焦冬木 日 焦曲 日 焦各芽 日 焦麥芽 日 焦查 日 製半夏 日

乾姜 牛 廣皮 日 熟砂仁 日



霍亂

胡名泄瀉嘔吐。脈至數大。左手尤甚。舌乾而黃。時令暑熱。腑腑所謂熱泄熱嘔是也。瀉多傷陰。嘔多傷液。恐有化燥。津枯結筋之劇。則險矣。

川連三 竹茹4 廣皮1 姜渣三 芦根寸

又 脈數大。較前減四五。吐瀉亦漸少。有轉機之兆。

又 吐瀉雖止。今日脈象較昨數大稍增。右關更甚。舌苔根黃。

陽明之熱不清。議與人參白朮湯。

霍亂

六



洋参 麦冬 生石膏 滑石 没药 渣 川连 通州

竹桑 芦根 香梗 米 广皮

又 脉症俱退七八 餘焰犹未尽 减轻 至製方可再投

洋参 麦冬 生石膏 滑石 通州 川连

广皮 没药 渣 竹茹 芦根 香梗 米

胡石泄泻 嘔吐 数日未已 脉情左数右濡 身體左热右寒 此陰

陽不和 升降失職 亦是暑热起見 漸有转筋之意 須防加重 况

身懷六甲 吐泻動胎 為害純輕 宜凉不宜温 宜和不宜散



川連 竹茹 沒藥 渣 蘊梗 木瓜 廣皮

又 昨投泄熱和胃。今諸恙稍減。然搃要胎元不動。則

川連 生薑 竹茹 老蘊梗 廣皮 木瓜 生熟

以冷水滾水久半煎藥



霍亂

也

作酸

某左左關弦滑。食後作酸。得吐則通。似屬肝陽犯胃。

党参 川連 吳萸 半夏 代赭石 旋覆花

砂仁 木香 生薑

錢 右曲直作酸。脈至左弦右弱。宜黃清泄肝陽。此方在後。

談 右作酸一症。有因火旺者。有胃陽衰者。今色脈無力無神。當

以胃陽衰治之。

麩仁 砂仁 陳皮 芡實 懷柔 杜仲 薑

