

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

卷二

	S294
	1155
	1部2



傷寒雜病論章句卷三

湘潭孫鼎宜撰

【大陰病】

朱云足大陰脾經桂枝布于脾胃絡于噤喉○喻云篇中言

是引伸觸類之妙可見治法總不出三陽外但清其風已寒之原以定
解肌發汗更于腹滿腹痛辨其虛實以定當汗則其兼
陽經數章以當注家不知以爲脫誤由不清知此故耳

【大陰病提綱并誤下之禁一章】

大陰之爲病

共五腹滿布一○成云大陰壅故而吐二○寒食不下三○

于中○程應旆曰陽邪亦有腹滿但擬治中湯喻云上下交亂胃中
可下今腹滿而吐食不下則滿爲寒但擬治中湯喻云上下交亂胃中

寒源三于下○脈經七時腹自痛五○虛但擬治中湯喻云上下交亂胃中
病源三于下○脈經七時腹自痛五○虛但擬治中湯喻云上下交亂胃中

下利吳人駒曰得非利則積畜者之下常痛而不得腹以諸痛則爲利從寒而利痛之爲寒
痛也利吳人駒曰得非利則積畜者之下常痛而不得腹以諸痛則爲利從寒而利痛之爲寒

腹二經七時○若下之并脈經必無此句必匈下堅結同于否結之濡輒成又云不
腹二經七時○若下之并脈經必無此句必匈下堅結同于否結之濡輒成又云不

此病發于陰而反下之因作否者黃仲理云宜治中湯陰中少有用
此病發于陰而反下之因作否者黃仲理云宜治中湯陰中少有用

桂枝者如桂證若脈下之因作否者黃仲理云宜治中湯陰中少有用
桂枝者如桂證若脈下之因作否者黃仲理云宜治中湯陰中少有用

不可常云可桂枝加附子湯按此章桂枝加附子湯不可下結黃氏所擬是也
不可常云可桂枝加附子湯按此章桂枝加附子湯不可下結黃氏所擬是也

傷寒雜病論章句卷三 大陰病 中華書局聚

作○病源結堅

右一章二節首大陰定證陳云皆寒次誤下變證

【論下利之由二章】

問曰水流夜疾何以故師曰土休故流疾而有聲

此設喻也雖晝夜靜不比晝喧

亦由水屬陰勝則其氣自王也

人亦應之人夜臥則脾不動搖

傷食多脈為之

數疾也

此謂大谿數腎脈水得其令無土以制之故脈數疾也○據脈經六補

右明土休則水王以成下利之理

即少陰負

〔傷寒四五日〕

〔出厥陰編之失後從柯改隸此柯云是〕腹中痛此即

兼太陽病茯苓甘草證所謂水漬入胃故若轉氣下趨少腹者陽轉明氣

腹中痛也喻云多屬虛寒與腹中實滿不同若轉氣下趨少腹者陽轉明氣

為燥矢即陰轉氣也注家多以為走腸間歷歷有聲張璐曰陽明轉氣為實

火者其痛必自疑按而上若自拘而為欲自利也湯喻治中或茯苓甘草

而致下利明眼見此字欲字可見○未然魏荔形曰此重來預防下利

利欲也

右明寒溼自利之由柯語統三陰言發端于此

【論欲愈之狀一章】

〔大陰中風〕

該傷寒言省

四肢煩疼

煩者熱也即手足自溫互詞疼者風寒搏擊使然病入三陰通以陽長者為

吉此煩熱為陽長也成云大陰脾也主營四肢為四肢煩疼也柯云是

脈陽微陰濇而長者

謂其脈由微濇而轉長也邪氣已去正氣雖衰然漸欲復非謂一時並見要知微濇之脈自不

得兼見長脈也喻云微濇是病中更察其脈長而短知濇之脈本氣未漓

柯云濇與長不能並見微濇是病中更察其脈長而短知濇之脈本氣未漓

轉而微知風邪當去濇則氣血少而今為四肢煩疼治之故愈陳云微濇之陰

右言大陰病以陰退陽生為欲愈之兆舉四肢煩疼及長脈

以概其餘

【論愈有定時一章】

〔大陰病〕欲解時從亥盡丑上

成云脾為陰土王于亥子丑故欲愈

曰合夜至雞鳴天之陰中之陰得陽則解也唐云下篇少陰欲解從

傷寒雜病論章句

卷二

大陰病

一

中華書局聚



子經盡寅乃為陰得陽氣則解以坎中原藏于一陽故得一陽之氣而成
腎而坎水為陽之氣故解以坎中而解至丑皆為陰脾經得陰中至陰之氣則
陰而旺於陽者故從亥至丑獨大陰不陰然哉若是乘生陽之氣則
旺而病解也六經皆乘旺而解豈獨大陰不然哉若是乘生陽之氣則
則當從亥起矣

右大陰病解之時

【四逆輩證一章】

自利不渴者

出大陰○三便不利言多軌不範注其少陰者兼有陽經病也又

焦利也此自利而有渴證若少陰中焦也按此津液大陰過寒引利水故不救與三大陰

熱利也此自利而有渴證若少陰中焦也按此津液大陰過寒引利水故不救與三大陰

口之渴惟大陰

陰涇矣陳云為利者不渴以因屬亡此津液大陰過寒引利水故不救與三大陰

屬大陰

自利在大陰篇為寒成在云自焦利而大渴者屬少陰辨則寒熱利下注金針此

證所關

以其臧有寒故也

因徐魏明所曰以自利渴也喻云此寒在景下分經利之辨

汗其臧本而成者故當溫之宜四逆輩徐云有寒則不四逆可知湯而曰者皆

方以類聚載于篇末故有某用輩按之輩猶言自也據此及知王仲景原方散載是

厥于少二陰之下藥也而其通主大陰者今以三陰同屬臧寒而本臧此四逆輩本



法故爾余固嘗謂三陰中無自相兼病非即謂為厥少陰之兼通兼之
不覺其治相同兼不必分故大陰之兼病即謂為厥少陰之兼病亦
可也若但虛而無寒
者擬治中湯喻氏說

右言大陰虛寒之病即同于厥少二陰之治舉自利不渴宜

四逆輩以例其餘

【少陰病】

跟朱云足少陰腎脈起于足小指之下斜趣足心別行入
跟中上至股內後廉貫腎絡膀胱直行者從腎上貫肝膈

入肺中
繫舌本

【少陰病提綱二章】

少陰之為病脈微細

喻云與三陽之滑大迥殊程應旆曰凡陰脈皆
沈兼微細陰證定矣弦之

【但欲寐也】

欲寐非竟成寐之詞成寐入
氣行陽則寤寢行陰則寐邪入

少陰則氣行于陰不復行于陽故但欲寐也柯云衛氣日行陽二十
五度常從足少陰之間分行于臍府今少陰病則入陽分多故欲寐欲

寐是病人意中非實能寐也少
陰提綱各臻其妙○因下章省

【少陰病】欲吐而不吐

陽一○柯云與少
喜歔不同

心煩

二○柯云少陰經出絡
心煩二○柯云少陰經出絡

之徵林瀾曰以上
陽虛格越于上

但欲寐三

五六日

而云五六日者示人以自利
而渴二證為後來之病

自利

傷寒雜病論章句

卷三

少陰病

二二中華書局聚

四而渴者

五○非謂有大熱故即下文引水自救之意成云經云下利非欲

舌乾不可引水自救喻似傳經利熱而邪之加形悉具屬少陰也陰篇省虛故

引水自救

林釋曰此義引求也云虛者邪氣所在其氣自利而非謂少陰補

病寒熱都小之證若少陰熱則小

○若小便色白者

或六○白如米湯皆水

是也喻云不可誤認水為道熱輕用寒

〔少陰病形悉具〕

也以上六證是悉具

虛實則知有此六證言虛則實知有實者矣言小便白為

〔小便白者〕

以

下焦虛寒

林瀾曰清白下陽必者格以見陰盛于下煩渴而誤攻其熱則黃

不能制溲故〔令色白〕也

湯程小應旄白之義常云可四逆湯甘草乾薑

欲寐來上渴證不盡屬少陰蓋上焦指無陰小便白來結以無下焦虛有寒示人

字從寒字不得利而又曰吐利而渴與猪苓證同彼曰以有熱小便利且猪苓

證小便利不得利而色赤飲水與白頭翁證同彼曰以有熱小便利且猪苓

讀不如製造之制溲即小便便也

右二章言少陰病定脈定證末節反覆申明小便色白之為

寒俾人不致誤認煩渴為熱

沈明宗曰此少陰虛寒似熱證之辨陰

【論大谿脈一章】

少陰脈

此大谿脈也

而大谿脈遂隱存者尺不配腎之說矣

弱而濇

即相微細之謂脈象

分弱者微煩

則成云煩者熱也弱為虛陰虛

濇者厥逆

成云濇者陽相

順接故厥逆也

○出平脈篇

右申言大谿定脈定證

程知曰言病腎

【論厥之形狀一章】

凡厥者

出厥陰編之失後今改置此以少陰

陰陽氣不相順接

此致云

由厥之便為厥

證手足冷逆既多當于改置此以少陰

陽氣內陷不與陰氣相順于通手用十四指逆足湯按三為陰厥言也成云手足之三陰

之陽氣內陷不與陰氣相順于通手用十四指逆足湯按三為陰厥言也成云手足之三陰

用凡字冠首氣統三陰如環無端若寒厥言也此云四條推由脾致厥之故

陰而不與陽相順深接也或曰壅遏不與裏陽不相順則陽受氣于

非陰與陽不相順寒然不謂乎改按平陽注陰謂以外達于四厥亦為厥反冷豈

傷寒雜病論章句

卷二 少陰病

四 中華書局聚



有熱有虛有實有寒熱互乘其變不一隨病異形非厥之正病也必
潛心體察凡病皆然何可執一說以人命為兒戲按徐所謂厥之正
病指尸厥不知
人言與此本別

右釋厥各義

【少陰自愈證七章】

〔少陰中風〕

該傷寒言省

脈陽微陰浮者為欲愈

寸為陽尺為陰浮為陽微為陰

陰中陽陰陽調和故為欲愈也少陰傷寒之陽微則外邪不可推復內入陽微者則
內邪盡從外出故欲愈也少陰傷寒之陽微則外邪不可推復內入陽微者則
復少陰之本脈反去之謂也坎中之陽回微則內而緊出故愈不
沈即暴微而緊反去之謂也坎中之陽回微則內而緊出故愈不

右言陰陽調和為欲愈單憑脈言

下利

厥少二陰證多下利

脈反弦

一○吳云下利脾胃病反弦○肝脈也

十五下

發熱二

身汗者

三○皆陽象

自愈

尤云弦並見陰陽兩屬若與與

○脈數

有微熱汗出正同故愈

〔下利〕

有出下當已句省下文

脈大浮弦

陰病見下當已

下當已

即下利自愈互

氣入裏下利或熱或渴或汗出或脈數陽氣既復邪者氣得達則愈若
雜病溼熱下利之證則均非美證內經云下利身熱者死謂雜病溼



熱下利也仲景云下利手足不冷者不可發熱者

〔下利〕

○出厥陰文金匱在下利證也二逆反發熱者

者尤云邪氣衰成無熱而渴則發熱氣得復也程林曰下利大熱

知邪氣去利自愈脈喻云微熱邪而渴證可知然又恐陽邪未盡利者

文弱裏當自解利不必服白頭翁也乃欲飲水者愈之互

〔少陰病〕脈緊者證一此脈緊是少陰實證餘處沈細微瀦是少陰虛

後下文反溫二字可知反溫也至七八日陰盡陽復之久柯云自下利已極前裏

寒氣得利可知通云脈暴微見手足擬溫與心煩○微為吉兆脈較緊為欲解也

唐云發寒氣凝結而回氣復此則脈變緊為微而欲愈者當參攷以得之

微也亦通柯云少陰之本證成云乃緊去寒氣安之程應旄曰脈從前利後變緊為微

也利去○手足反溫前此已冷可知脈緊反去者微亦去可知柯云則

之緊去微見所謂穀氣為欲解也○雖煩句〔下利〕文省上必自愈煩則

傷寒雜病論章句卷三少陰病五中華書局聚

煩躁者逆此正勝也按此與死證內吐利煩躁四逆者死自是不同
柯云煩者利少陰本證煩則陽已反于中宮溫則陽已數于四末陰邪
陽秘故下利自止喻云邪解陽回可
勿藥自愈即緊去人安之邪互詞也

右四章通以陽回為自愈憑脉與證言

下利出厥陰金匱在下脉沈而遲一〇三面少赤二〇即下文戴

也三陰利身有微熱過由身微冷而回溫耳下利四清穀者五〇皆因

迫陽必鬱冒汗出而解鬱冒者作汗之微故見此候必汗出而其人

必微厥雖解必猶有少陽復見陰者不同〇所以然者其面戴陽

謂面赤與妊娠下虛則陽湊於上空故也達陽氣虛空不能宣

右一章二節首言陰病見陽有鬱冒作汗解者次釋其理

脈陰陽俱緊陰陽以尺寸言成至于吐利上吐下兼病其脈獨不解證病

已解可知云緊△緊去人安人安則脈與此為欲解吐利云緊去則

脈可安此据〇若脈遲謂吐利後易解矣此為欲解吐利云緊去則

至六七日不欲食胃氣未利速進耳故下利後脾胃大虛中寒冷是因

水氣而然此為晚發水停故也為未解明揭其源則當用利水之藥可知

發疾猶復病也廣雅釋詁四晚發傷寒三月至年末為晚發與此本別

△食自可者為欲解成胃陽已復則和寒不遲已散知○病六七日手足三

部脈皆至謂其平也無沈伏正氣勝邪氣微利後大煩煩陽進成云而口

噤不能言似非瘕〔其人〕躁擾者可疑正分爭故見諸證不必欲解也○

若脈和此亦吐利後易緊而〔其人〕大煩躁擾同目重瞼內際黃者胃

來復之兆瞼外有皮也俗曰重瞼一切經音義十七引〔此〕為欲解也

成云脈經云病人兩目皆黃起者其病方愈○柯云脈道已通有

于腎朝會于肺腎氣絕則脈不至三部今手足皆至是柯云脈道已通有

根有本非略氣出初復知營大煩躁擾者脾瀆不運故耳脈非陰極而發也口噤

解亦不足慮再視其雖口目重瞼內際此屬于脾為五色黃而不雜水

之位也○出辨脈

右一章四節亦通以陰退陽進為欲愈憑脈與證言

【論愈有定時一章】

傷寒雜病論章句 卷三 少陰病 六一中華書局聚

珍做宋版印

〔少陰病〕欲解時從子盡寅上寅成云陽生于子為一陽丑為二陽寅為三陽少陰解于此者陰得陽則解也喻云各經皆解于所王之時而少陰獨解于陽生之時陽進則陰退陽長則陰消也即是推之而少陰所主在真陽不可識乎

右少陰病解之時

【可治證一章】

〔少陰病〕冒下○下利極寒若〔利〕自止寒氣盡○惡寒而踈陰勝踈者

向身以就溫熱常屈不伸也手足溫者陽氣復△可治總上二證言擬

陳云其身屈曲向前是也
氣未虧陰寒亦易散可用溫法

〔少陰病惡寒而踈〕成云陰寒甚○時自煩一作欲去衣被者自煩

去衣被成云二可治擬以四逆湯燥非實熱且陰煩躁不可下先服吳茱萸

證為陽氣得復
湯治兼胃寒之四逆此處不濟事喻云真陽擾亂不寧然不至出亡在外可用溫法

右二章通以陽氣漸復者為可治

【不治證一章】

〔少陰病〕惡寒一踈二而利三手足逆冷者四不治成云內外寒極純陰無陽故云

不治陽氣于無何有之等穴仍不服四逆湯多陰故云無陽即四逆等
法為陽主特陰病見陽脈者利生必陰病手足溫見陽脈方可治也背為陽止
陽為陰盛則瘳陰盛則陽蹇若利而手足溫見陽脈方可治也背為陽止
而手足冷逆是純陰無陽矣○病源謂口下有其絕人吐利燥逆者死八氣
絕于內者下利不禁矣○病源謂口下有其絕人吐利燥逆者死八氣

右言純陰無陽為不治

【陰病見陽復見陰證一章】

下利

【出厥陰證金匱在下利十七因下利者利自愈句省上二節與本
篇自愈證有微熱而渴脈弱即下利者利自愈句省上二節與本

脈數

脈據下節知其先復之有微熱即下利者利自愈句省上二節與本
脈為緊尤云陽復之有微熱即下利者利自愈句省上二節與本

與脈數

脈據下節知其先復之有微熱即下利者利自愈句省上二節與本
脈為緊尤云陽復之有微熱即下利者利自愈句省上二節與本

必自止

○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本
○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本

緊則不弱

○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本
○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本

與正相爭

○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本
○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本

氣尚汗在

○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本
○設脈復緊為未解即下利者利自愈句省上二節與本

傷寒

【出厥陰證】○先厥後發熱以上可知後雖不言日數則自一日
【出厥陰證】○先厥後發熱以上可知後雖不言日數則自一日

為陽復也張兼善云三陰傷寒大陰也故手足溫少陰則手足清厥陰
則手足厥逆然病至厥陰乃陰之極也故手足溫少陰則手足清厥陰

傷寒雜病論章句 卷二 少陰病 七 中華書局聚

珍做宋版印

陽生陽極則陰生此陰陽推盪必然之理也按厥極發熱少而利

者必自止熱一本無二字○成云陰氣勝則厥逆而利陽氣復則發

當作病也○見厥復利陰既已發熱利必自止復又厥逆之以發熱一證不

看故也○見厥復利陰既已發熱利必自止復又厥逆之以發熱一證不

右二章言陰病見陽則利自止復又見陰則仍下利

【陰病見陽陽又過勝證二章】

傷寒出厥陰○先厥後發熱下利必自止陰病見陽○而反

汗出三陰正病皆無汗法今此汗咽中痛者其喉為痺厥少之脈同

可桔梗湯喻氣分熱有餘上攻咽喉咽中痛者其喉為痺厥少之脈同

而利必自止發熱為陰病發熱雖無汗本三陰之常○發熱無汗

按此不必拘○若不止必便膿血此氣過多上節熱結于膿血

喻熱利不止焦血分常云可桃華湯按此當白頭翁湯便膿血者其喉

不痺病熱已喻于見熱邪在裏即不復在表在過隨其經氣之上下而為



就其偏言耳設熱氣充直則
喉痺膿血亦得兼而有之矣

右一章四節首言陽進則利止次言熱氣過多有結于上者
則為喉痺三節又申言陽進則利止四節言熱氣過多有流
于下者則便膿血

下利

出厥陰金匱在下利十七

脈反數而渴者

陽長之象曰反者

無口渴○脈經作利自愈○設不差陽勝于陰魏云下利固成熱邪氣
傷陰致陽復者義同利自愈○設不差有陽勝于陰魏云下利固成熱邪氣
有偏勝之患必清膿血以有熱故也清黃芩湯柯云脈數有虛有實云可
亦有虛有實若自愈則數為虛熱渴為邪火正熾矣
未復若不差則數為實熱渴為邪火正熾矣

右一章二節首言陽進自愈次言熱氣過多之變為圍膿血

陽氣素盛一章

下利

出厥陰金匱在下利十七

寸脈反浮數

成云裏有熱尤云陽傷陰邪強陳云脈當

寸尺中自濇者

濇者膿血停滯之

必清膿血

說文廁清也徐鍇曰廁

當清除也成云清與圍通脈經曰清者廁也尤云陽強陰弱故清膿
血喻云脈見浮數若是邪還于表則尺中自和今尺中濇乃熱邪搏

傷寒雜病論章句

卷二

少陰病

八

中華書局聚

結于陰分雖寸口得陽脈究竟必走下竅而便膿血也常云可桃華
湯柯云上條脈數而渴是未圍膿血因不差而預料之辭此在膿血
已圍後因寸浮尺澹而揣摩
之詞不得以必字作一例看

右憑脈以知其必清膿血

陽與陰平陽又過勝一章

〔傷寒〕〔出厥〕熱少厥微甚輕指頭寒言厥微也柯云此身無大熱手足

也○翼方注一默默不欲食厥陰證亦即胃有微寒證所謂厥利方

作不能煩躁數日言熱少不能發熱方云煩躁則內熱故下文以久便

飲食不能煩躁數日陽氣欲少不能發熱方云煩躁則內熱故下文以久便

之辨小便利色白者便少陰寒證數日可知此熱除也乾不需服藥龐云宜

若熱不除翁輩小黃赤而不利則又欲得食能食熱區區指頭之寒厥亦必

屬白頭翁輩小黃赤而不利則又欲得食能食熱區區指頭之寒厥亦必

欲食宜王肯堂曰設未其病為愈以退熱而能食故○若熱煩躁○承上文

熱氣過多之證矣○熱舊誤厥寒而能食故○若熱煩躁○承上文

据成注文正知成所據本不誤而歐二能食則胸脅煩滿者三充○直熱

可王肯堂見脅滿以為厥陰少陽病柯云微者煩滿者胡經之熱甚于裏

胡下之亦自有其後必便膿血熱擬已除者畏黃芩按此證因熱氣

