

御纂醫宗金鑑卷八十九

編輯正骨心法要旨

胸骨圖



北京中医药大学图书馆版权所有

御纂醫宗金鑑卷八十九

編輯正骨心法要旨目錄

胸背部

胸骨圖

顙子骨

胸骨
脇肋附

岐骨

蔽心骨

鳧骨



陰囊

背骨圖

背骨

腰骨

尾骶骨

四肢部

四肢圖

髑骨

髌骨



北京中医药大学图书馆版权所有

肘骨

臂骨

腕骨

五指骨

竹節骨

四肢圖

髌骨

環跳

大槌骨



膝蓋骨

肱骨

踝骨

跗骨

足五趾骨

跟骨



御纂醫宗金鑑卷八十九

編輯正骨心法要旨

胸骨圖



北京中医药大学图书馆版权所有

胸背部

顳子骨

顳子骨經名拄骨橫臥於兩肩前缺盆之外其兩
端外接肩解擊打損傷或騎馬乘車因取物偏墜
於地斷傷此骨用手法先按胸骨再將肩端向內
合之揉摩斷骨令其復位然後用帶掛臂於項勿
令搖動內服人參紫金丹外熨定痛散再敷萬靈
膏其證可愈

人參紫金丹



定痛散

俱見山
角骨傷

萬靈膏

見顛
頂傷



行集國史全錄

卷之九



北京中医药大学图书馆版权所有

胸骨

胸骨卽髑髏骨乃胸脇衆骨之統名也一名膺
一名臆骨俗名胸膛其兩側自腋而下至肋骨
盡處統名曰脇脇下小肋骨名曰季脇俗名軟肋
肋者單條骨之謂也統脇肋之總又名曰胛凡胸
骨被物從前面撞打跌仆者重從後面撞仆者輕
輕者先按證用手法治之再內服正骨紫金丹外
用麯麩和定痛散灸熨之或以海桐皮湯洗之貼
萬靈膏卽能獲效若內血瘀聚腫痛偃僂難仰者



早辰以清上瘀血湯消下破血湯分上膈下膈以
治之晚服疎血丸有受傷日久胸骨高起肌肉
瘦內有邪熱瘀血否氣膨悶睛藍體倦痰喘咳
者宜加減紫金丹以消熱化痰理氣健脾潤肌定
喘若傷重者內干胸中必通心肺兩藏其人氣亂
昏迷閉目嘔吐血水呃逆戰慄者則危在旦夕不
可醫治矣若兩側腋肋諸骨被傷者則相其輕重
以分別治之凡胸脇諸傷輕者如黎洞丸三黃寶
蠟丸等藥皆所必需宜酌用之

清上瘀血湯

治上膈被傷者

羌活

獨活

連翹

桔梗

枳殼

赤芍

當歸

酒洗

山梔子

黃芩

甘草

川芎

桃仁

紅花

蘇木



川大黃

生地黄

水煎加老酒童便和服

消下破血湯

治下膈被傷者

柴胡

川芎

川大黃

赤芍藥

當歸

梔子

五靈脂

木通

枳實

炒

紅花



赤牛膝

澤蘭葉

蘇木

生地黃

黃芩

桃仁

水煎加老酒童便和服

加減紫金丹

白茯苓

蒼朮

各二兩
米泔浸炒

當歸

熟地黃

白芍藥

陳皮

炒
各四兩

肉蓯蓉

一兩酒洗
去鱗甲

丁香

一錢



紅花 五錢

瓜兒血竭 三錢

乳香 三錢
去油

沒藥 三錢
去油

共爲細末煉蜜爲丸彈子大用黃酒送下

黎洞丸

治跌打損傷瘀血奔心昏暈不省及一切無名

腫毒昏困欲死等證

京牛黃

冰片

麝香 各二錢五分

阿魏

雄黃 各一兩

川大黃



兒茶

天竺黃

三七

瓜兒血竭

乳香

去油

沒藥

各二兩
去油

藤黃

二兩
隔湯煮十數次去浮沫用山羊血五錢

拌晒如無山羊血以子羊血代之

已上十三味共爲細末將藤黃化開爲丸如

芡實大若乾稍加白蜜外用蠟皮封固內服

用無灰酒送下外敷用茶滴磨塗忌一切生

冷發物



三黃寶蠟丸

治一切跌打損傷及破傷風並傷力成癆
人產後惡露不盡致生怪證瘀血奔心痰迷
竅危在旦夕重者一錢輕者三分用無灰酒送
下立刻全生如被鳥鎗打傷鉛子在內危在傾
刻服一錢吃酒數杯睡一時汗出即愈如外敷
將香油熱化少許雞翎掃患處服藥後忌涼水
生冷燒酒三日如不忌此酒則藥無功

天竺黃 二兩

雄黃 二兩