

幼
科
三

六科準繩



鈎藤炒五分

麻黃去節

甘草炙各三分

天麻

川芎

防風

人參各七分

全蝎炒去毒五個

僵蠶炒七個

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

乳香丸 治驚風內釣腹痛驚啼

乳香半錢

沒藥

沈香各一錢

蝎梢十四個

雞心檳榔一錢半

右爲末蜜丸桐子

大每服二三錢菖蒲鈎藤鈎煎湯下

木香丸 治同前

木香

全蝎各五分

沒藥

茴香

鈎藤鈎各一錢

右各別爲末以大蒜

研爛和丸桐子大曬乾每服二丸鈎藤煎湯下

牛黃丸 治小兒一切驚風五癇天釣客忤痰涎四肢抽掣

白花蛇酒浸取肉

白附子

全蝎

川烏一隻重半兩生用去皮臍

天麻

薄荷葉各半兩以上先爲細末次入

雄黃半兩

辰砂三錢

牛黃一錢

麝香

片腦各半錢另研

右件爲細末一處和勻麻黃去節二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒入蜜少

許熬成膏劑前藥末爲丸如芡實大用金箔爲衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散風邪



塗頂膏 治天釣風備急

烏頭生用去皮 芸薹子各二錢

右爲末每用一錢新汲水調敷兒頂上

天漿子散 治小兒天釣驚風

天漿子炙

蝎梢

犀角屑

丹砂另研

雄黃另研

附子去皮

南星炮去皮

白附子

半夏

水銀另研

乳香另研

白殭蠶

膩粉另研

牛黃另研各一錢

麝香一字另研

銀箔五片另研

右爲細末和勻每服一字用薄荷湯調

下量兒大小加減服

青黛丸 治小兒天釣客忤五疳八痢十二種驚癇

青黛

天竺黃

乾蝦蟆一個黃泥包裹燒赤去泥

乾蝸牛殼

黃連

人參

地龍去土

鈎藤炒

龍膽草各二錢半

蘆薈

熊膽各半兩

牛黃

麝香

雄黃

丹砂各一錢

夜明沙去土

胡黃連各二錢

右爲

細末蒸餅糊爲丸如麻子大一歲三丸空心米飲湯送下

再生散 治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥冷



烏蛇酒浸取肉

天麻

南星炮去皮

全蝎炒去毒各二錢半 麝香

膩粉各五分

丹砂二錢另研

牛黃另研

白附子炮各一錢

右為細末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯調下量

大小加減服

三百散 治小兒盤腸氣釣先服此藥後服鈎藤膏

白牽牛一兩炒

白朮

桑白皮

陳皮

木通各三錢

右為細末每服半錢用

生薑湯調不拘時服

廣利方 治痢迷嚙舌仰視牛黃大豆許和蜜水調

拘攣

續命湯 治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草炙

防風

杏仁去皮尖炒

官桂去皮

防己

附子炮裂去皮臍各等分

右剉碎每服二錢

水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

追風散 治小兒感冒發熱手足拘攣



人參

茯苓

防風

川芎

柴胡

羌活

枳殼

桔梗

甘草各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑二片煎至五分不拘時服

手拳不展

張漢云小兒所受肝氣怯弱致筋脈攣縮兩手伸展無力薏苡丹主之

薏苡丹 治手拳不展

薏苡仁

湯浸去皮研細當歸洗焙

秦艽去苗

防風

酸棗仁炒

羌活各等分

右爲細

末煉蜜和如芡實大每服一粒至二粒麝香荆芥湯化下不拘時候

聖惠方兒在胞母藏府虛爲風冷所乘兒生肝氣不足致筋脈攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散前就此加減以其平和故列於首

薏苡仁

七錢五分

秦艽

防風

酸棗仁

微炒

甘草

微炙赤各半兩

當歸焙

桂心

各二錢半

爲散每一錢水一小盞煎五分不計時候量兒加減

羚羊角散 治兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不通

羚羊角

羌活

五加皮

白蘚皮

桂心

各二錢半

麻黃

半兩去根節



甘草炙微赤一錢二分半 爲散每服一錢水一小鍾煎五分量兒加減不計時溫服

脚拳不展

張渙云緣稟受腎氣不足者氣血未榮脚指拳縮無力不能伸展海桐皮散主之

海桐皮散 治脚拳不展

海桐皮

當歸湯洗焙乾

牡丹皮

熟地黃

牛膝酒浸焙各一兩

山茱萸

補骨脂各半兩

右爲細末每服一錢水八分入葱白二寸煎至五分去滓溫服食前

聖惠兒在胞母藏府有積冷爲風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸焙

麻黃去根節各半兩

羌活

酸棗仁微炒

人參

杜仲微炙

桂心各二錢半

右爲細末每服一錢水一小盞薑少許煎五分量兒大小乳前分減服

乾地黃丸

生地黃

郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩

牛膝

防風

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

薏苡仁各二錢半

右爲末蜜丸如菉豆大乳前溫酒下

七丸量兒加減



驚癰鶴膝

〔會〕肝者東方青龍木也其動則應於風病則主驚駭諸熱引肝風有風則生痰有痰亦作搐小兒驚風之際手足動掣當聽其自定然後療之免生異證或父母見其病勢可畏從而按伏之豈知筋者肝之合也臨病發時若按束其手足則筋不舒伸遂至經絡爲風所閉終爲廢人內經曰頑弱名緩風痿重名濕痺又有四肢痿痺不仁致手足稍脹痛不堪忍者此風毒之氣使然故傳曰風淫末疾是也凡小兒心悸不常及遍身腫痛或手足不隨此爲驚癰候也若治之稍遲至臂腕膝脛骨節之間流結頑核或膝大而腫肉消骨露如鶴膝之狀或爲癰爲瘡此名鶴膝候也以上形證并宜發汗爲先使腠理開通則風熱可除有濕亦去用百解散和咬咀五苓散倍加麻黃水薑蔥煎服微得汗爲度或以麻黃湯發散尤佳次防己湯祛風散及獨活湯加桑寄生投服并防風湯或黑虎丹作小丸子間服使風不生而痰不作則其疾易愈若爲癰爲瘡疼重者用黑牽牛半生半炒略研碎煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒濕則腫毒可消如大腑閉而不通此是風熱內蘊其右腮紅紫及右手三部脈浮而實滑宜五和湯或當歸散枳殼丸治之其加減之法尤在臨機審處若泥一方非良醫也前證更宜間服排風湯

汗亦不可
輕發麻黃
湯尤宜慎
用

〔薛〕鶴膝風者其腿漸細其膝愈癰狀如鶴膝是以名之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝內

作痛外色不變伸屈艱難若一二月間焮腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用
大防風湯為主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯為主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若
不潰不斂或發熱等證者須調補脾胃為善否則必變敗證矣

大防風湯 治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子 炮

牛膝 酒炒各一錢

白朮

羌活

人參

防風 各二錢

杜仲 去皮薑製

川芎

肉桂 去皮

黃耆 炒

熟地黃 自製

芍藥 炒各一錢五分

甘草 一錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯

獨活

桑寄生

杜仲 炒

細辛

牛膝 酒炒去土

秦朮

茯苓

白芍藥 炒

桂心

川芎

防風

甘草

人參

熟地黃

當歸 各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

益氣養榮湯

瘰癧

百解散 驚

五苓散 驚

麻黃湯 傷寒

防己湯

治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓



防己

去黑皮

麻黃

去節存根功全表裏剉碎湯泡濾過焙乾用

薄桂

去麤皮各半兩

赤芍藥

赤茯苓

去皮

蒼朮

米泔水浸一宿去麤皮濾剉片火炒至微黃各一兩

甘草 炙七錢半 右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分空

心熱服或入薤白同煎

祛風散 治卒暴中風不能言語口眼喎斜驚癱搐掣痰實煩躁神昏有熱睡臥不穩

防風

去蘆

南星

生用

甘草

生用

半夏

製

黃芩

各一兩

右碎每服一錢水一盞

半薑三片慢火煎七分不拘時溫服

獨活湯 治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足疼痛晝輕夜重及四肢痿痺不仁

川獨活

黃色如鬼眼者佳半兩

當歸

酒洗

白朮

黃耆

蜜水塗炙

薄桂

去麤皮

川牛膝

酒洗各二錢半

甘草 炙三錢 右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薤白一根煎七分空心熱服或無時

防風湯

驚

黑虎丹 治諸般風證

草烏

去黑皮一兩生用

川烏

去黑皮生用

甘草

各七錢半

麻黃

不去根節

甘松

熟乾地黃

淨洗

藿香葉

白芷

油煙墨

燒存性

豬牙皂莢

川芎

當歸

盡上侵於目者屬腎肝虛也用滋陰腎氣丸前證多宜審治其母兼調其兒

〔初生眼不開〕

〔胎赤〕並見初生門

〔目赤腫痛〕曾熱極挾風則目赤腫痛晝夜不開驚啼不已先用九仙散水薑葱煎服次三解散溫米泔水調下及點以黃連膏若夫天行時證暴赤腫痛晝夜苦甚久則昏矇治法先以九仙散解表次以小柴胡湯去半夏加大黃薄荷竹葉生地黃水煎服併投草龍膽散及點以黃連膏貼以清涼膏有孩兒胃氣素虛脾氣實盛眼胞赤腫羞澀不開遠投苦寒之劑以退赤腫反傷脾胃不吐則瀉或四肢微冷復以溫藥調治則目疾轉加宜先用吹咀五苓散水薑燈心煎服次投瀉黃散自愈有心脾蘊熱經久及肝受邪熱致兩目羞明眼胞浮腫微有紫色大府閉或流利小便澀或通順先以百解散發表次投明目飲自然平復仍忌酒葷三五日有小兒薄劣多致塵埃入目揩摩成腫發熱作痛啼哭不已宜用辟塵膏治之立效

〔湯〕導赤散 治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥

羌活

防風各半兩

大黃

甘草各一錢

右爲末燈心黑豆同煎

食後服

余平生無赤眼之患用之如神大人小兒可通用凡眼赤澀之初只用自己小便張目溺出一指擦抹眼中便閉目少頃即效此以真氣逼去邪熱也

〔本〕治小兒赤熱腫眼

大黃

白礬各等分

右爲末同冷水調作罌子貼眼立效

小防風湯 治小兒熱毒眼患

大黃蒸

山梔子

甘草炙

赤芍藥

川當歸洗

防風

羌活各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

小流氣飲 治小兒風毒眼患

蟬蛻去足

甘草

羌活

天麻

川當歸

防風

大黃

薄荷

赤芍藥

杏仁各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食

後服

小菊花膏 治小兒積毒眼患

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

蒼朮米泔浸



荆芥穗 防風 右各等分爲末煉蜜和膏如小指頂大每服一餅細嚼白湯嚥下不拘時服

通頂散 治眼疼風熱腫脹作楚

瓜蒂

藜蘆各一錢

皂角肉半錢

麝香少許研

右爲細末研勻每少許吹入鼻中

九仙散 解諸目疾不拘歲月遠近並宜先服

柴胡去蘆

蒼朮米泔浸刮去鱗皮剉炒燥各二兩

赤芍藥

荆芥

甘草各六錢半

麻黃

剉去節湯泡濾焙乾

川芎

薄荷連梗各半兩

旋復花去老梗二錢

右碎每服二錢水一盞薑二片葱

一根煎七分不拘時溫服

三解散一名靈心湯

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣

人參去蘆

防風去蘆

天麻

茯神去皮木

鬱金無以山梔仁代

白附子

大黃

各二錢半

赤芍藥

黃芩

殭蠶各五錢

全蠍十五尾去尖毒

枳殼水浸去瓢麩炒二錢

粉草

六錢

右焙爲末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調下或燈心湯

草龍膽散 治暴赤火眼晝夜澀痛作腫淚多

草龍膽

木賊去節

荆芥

菊花

防風去蘆

草決明半生半炒

甘草七味各半兩 右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服痛甚加羌活乳香同煎

明目飲 治心脾蘊熱肝受風邪致兩目羞明經久不痛

山梔仁

淨香附各一兩

夏枯草去梗半兩

右剉每服二錢水一盞蜜一匙煎七分無時溫服

金波散 治時行赤眼腫痛成翳有熱多淚

淨黃連 一兩

硼砂

寒水石

大黃各二錢

海螵蛸

銅青各一錢

元明粉二錢半

全蠍去尖毒七枚

麝香 一字

右除元明粉麝香餘七味剉曬爲末仍入元明粉麝香

乳鉢內同前藥末杵勻每用一字至半錢溫淨湯或涼水調化澄清去滓無時頻洗有風夾蟲作痒入輕粉取效仍忌酒葷三五日

黃連膏 治時行火眼赤腫澀痛晝夜煩啼

淨黃連二錢半

右件細剉雞子一枚筋嘴札開一頭大處取清瓦盞盛入黃連和勻釀一時見黃色

以絹濾過成膏患者仰面臥外令人挑一字許頻點目內覺口中有苦味滿舌上藥之驗也豆瘡餘毒

攻眼眇多有熱用之驗

清涼膏 治暴赤火眼腫痛及血癰作疼發熱

大黃

淨黃連

黃柏

赤葛

細辛

和葉

薄荷葉

風化朴硝

七味各一兩

右前六味或曬或焙爲末臨入朴硝乳鉢內同杵勻每用一錢至二錢冷水加

薑汁調塗太陽或新汲井水調妙熱癢以涼米湯水調搽患處

辟塵膏

治小兒塵埃入目揩成腫熱作痛啼哭不已 右以油烟細墨新汲井水濃磨入元明粉半錢

和勻爲膏用筆多點目內三五次卽效仍忌飲酒一晝宵

速效飲 治長成小兒因他物或跌著觸損兩目血脹腫痛

荊芥穗

薄荷葉

微炒

草決明

微炒各一兩

甘草

三錢生用

右爲麤末和半生半炒芝麻等分炒二

錢掌中盛乾嚼之味盡吐去滓如此法投三五次卽效

〔薛〕一小兒目赤作痛咬牙寒熱余謂肝經風熱用柴胡飲子一劑而赤痛止又用四物參耆白朮柴胡

而寒熱退又用補中益氣湯而飲食加 一小兒眼素白或青患眼赤作痛服降火之劑眼如血貫脈洪

大或浮緩按之皆微細用十全大補湯加柴胡山梔數劑外證漸退而脈漸斂又數劑而愈 一小兒患

眼赤痛服大黃之藥更加寒熱如瘧余謂脾胃復傷用四君升麻柴胡炮薑鉤藤鉤而寒熱愈又用補中

益氣湯間服而目疾痊 一小兒目痛恪服瀉火治肝之藥反加羞明隱澀睡中驚悸悲啼此肝經血虛

火動傷肺也用五味異功散加山梔補脾肺清肺金用地黃丸滋腎水生肝血而安仍兼服四味肥兒丸而瘥

龍膽瀉肝湯

方見

生犀飲

方見

生熟地黃散 治眼初患之時因誤築打觸肝受驚風致目腫赤痛痒

生地黃

洗

熟地黃

各一兩

麥門冬

去心五錢

當歸

枳殼

米泔浸去

甘草

炙

防風

杏仁

湯炮去皮尖麩炒赤

赤芍藥

各二錢半

右每服一錢黑豆七粒水煎服

犀角飲 治脾火眼疼

犀角

一兩

射干

草龍膽

炒

黃芩

炒各五錢

人參

二兩

茯苓

二錢五分

鈎藤鈎

七錢半

甘草

三錢

右每服一錢水煎

東垣廣大重明湯 治兩瞼或兩眦赤爛熱腫疼痛及眼胞痒極抓之至破爛赤腫眼楞生瘡翳目多眵

淚隱澀難開

草龍膽

防風

生甘草根

細辛苗葉

各一錢

右用水一碗半煎龍膽至七分入

餘藥再煎至半碗熱洗日五七次洗畢合眼須臾瘥



東垣助陽和血補氣湯 治發後熱壅白睛紅多眵淚癰澀此過服涼藥而真氣不能通九竅也

防風 七分 黃耆 一錢 蔓荊子 白芷 各二分 升麻 七分 炙甘草

柴胡 當歸身 酒洗各五分 水一鍾煎至半鍾稍熱服

潔古方 治眼赤暴發腫

防風 羌活 黃芩 炒 黃連 炒各等分 右剉每服一錢水煎如大便秘加大黃

二分 痛甚加川當歸地黃 各二分 煩躁不得臥加梔子仁 三分

保命點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸 黃連 各二分 防風 二錢五分 細辛 五分 甘草 一錢 右水一大碗文武火熬

滴水中不散為度入熟蜜少許點用

柴胡復生湯 治紅赤羞明淚多眵少腦頂沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉久視則酸疼翳下

陷者

蔓荊子 川芎 羌活 獨活 白芷 各二分半

白芍藥 炒 炙甘草 薄荷 桔梗 各四分 蒼朮 茯苓



黃芩炒各五分

柴胡六分

五味子十二粒

右每服二錢水煎食後服

黃連羊肝丸 治目中赤脈洪甚眇多

黃連爲末不拘多少

白羊肝一具

先以竹刀將羊肝刮下如糊除去筋膜再搗細入黃連末丸桐子大

每服十丸茶清送下

〔外障〕小兒病目生翳不可輕用點藥只以服藥內消爲主看赤脈上下內外分經處治已見雜病第七卷及前薛氏總論茲不贅錄 〔薛〕一女子年十四因恚怒先月經不行寒熱脇痛後兩目生翳青綠色

從外至內余謂寒熱脇痛足厥陰之證也翳從外眥起足少陽之證也左關脈弦數按之而瀦肝經風熱兼血滯也遂以加味逍遙散加防風龍膽草四服而寒熱脇痛頓減用六味丸月餘而翳消 一小兒十

五歲兩目白翳腹膈遍身似疥非疥晡熱口乾形體骨立此肝疳之證也用六味肥兒丸而痊後陰莖作痒小便澄白瘡疥益熾狀如大風用大蘆薈四味肥兒丸諸證漸愈又用大蕪荑湯而痊 一小兒九歲

素有肝火兩目生翳服蘆薈肥兒等丸隨愈至十四歲後遇用心過度飲食不節卽夜視不明用補中益氣湯人參補胃湯四味肥兒丸而愈 一小兒眼每生翳皆因乳母恚怒而作用九味蘆薈丸柴胡梔子

散母子並服而愈 一小兒乳哺失節服藥過劑腹脹少食大便不調兩眼生花服治眼之藥漸生浮翳