

民國十二年十一月初版

定價每部大洋陸元

印刷兼
發行人

惲鐵

發行所

上海雲南路新會
樂里惲鐵樵廬

寄售處

上海文明書局
各省中華書局

承印處

上海商務印書館



傷寒論卷第十

漢

張仲景述

晉

正叔

和撰次

宋

林

億校

正

明

趙開美校刻

沈

琳全校

辨發汗吐下後病脉證并治第二十二

合四十八

法方三十九首

太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便脉

微而惡寒者不可更發汗吐下也以其不得小

汗身必癢屬桂枝麻黃各半湯第一

七味前有二十二病



證。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。發熱無汗。心下滿痛。小便不利。屬桂枝去桂加茯苓白朮湯。第二。六味。

太陽病。發汗不解。而下之。脈浮者。為在外。宜桂枝湯。第三。五味。

下之後。復發汗。晝日煩躁。夜安靜。不嘔不渴。無表證。脈沈微者。屬乾薑附子湯。第四。二味。

傷寒若吐下後。心下逆滿。氣上衝胃。起則頭眩。脈沈緊。發汗則身為振搖者。屬茯苓桂枝白朮



甘草湯第五。四味

發汗若下之。病不解。煩躁者。屬茯苓四逆湯第

六。五味

發汗吐下後。虛煩不眠。若劇者。反覆顛倒。心中

懊懣。屬梔子豉湯。少氣者。梔子甘草豉湯。嘔者。

梔子生薑豉湯第七。梔子豉湯二味。梔子甘草豉湯並三

味。

發汗下之。而煩熱。胃中窒者。屬梔子豉湯證。第

八。用上

初方

太陽病。過經十餘日。心下欲吐。胃中痛。大便溏。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

腹滿微煩。先此時極吐下者。與調胃承氣湯。第九。三味

太陽病。重發汗。復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡潮熱。心腹鞭滿。痛不可近者。屬大陷

胃湯。第十。三味

傷寒五六日。發汗復下之。胃脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。寒熱心煩者。屬柴胡桂枝

乾薑湯。第十一。七味

傷寒發汗吐下解後。心下痞鞭。噫氣不除者。屬旋復代赭湯。第十二。七味

傷寒下之復發汗心下痞惡寒表未解也表解

乃可攻痞鮮表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉

心湯第十三

桂枝湯用前第三
大黃瀉心湯二味

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

惡風大渴舌上燥而煩欲飲水數升者屬白虎

加人參湯第十四

五味

傷寒吐下後不解不大便至十餘日日晡發潮

熱不惡寒如見鬼狀劇者不識人循衣摸床惕

而不安微喘直視發熱譫語者屬大承氣湯第

十五

四味



三陽合病。腹滿身重。口不仁。面垢。讞語遺尿。發汗則讞語。下之則額上汗。手足逆冷。自汗出者。屬白虎湯。第十六。四味

陽明病。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。反惡熱。身重。若發汗。則讞語。加溫針。必怵惕煩躁不眠。若下之。則心中懊懣。舌上胎者。屬梔子豉湯證。第十七。用前第七方

陽明病。下之。心中懊懣而煩。胃中有燥屎可攻。宜大承氣湯。第十八。用前第十五方

太陽病。吐下發汗後。微煩。小便數。大便鞭者。與

小承氣湯和之第十九。三味

大汗大下而厥者。屬四逆湯。第二十。三味

太陽病。下之氣上衝者。與桂枝湯。第二十一。

前用

第三方

太陽病。下之後。脉促胃滿者。屬桂枝去芍藥湯。

第二十二。四味

若微寒者。屬桂枝去芍藥加附子湯。第二十三。

五味

太陽桂枝證。反下之。利不止。脉促喘而汗出者。

屬葛根黃芩黃連湯。第二十四。四味



北京中醫藥大學圖書館版權所有

太陽病。下之微喘者。表未解也。屬桂枝加厚朴

杏子湯。第二十五。七味

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。小

便清者。一云大便青。知不在裏。當發汗。宜桂枝湯。第

二十六。用前第三方

傷寒五六日。下之後。身熱不去。心中結痛者。屬

梔子豉湯證。第二十七。用前第七方

傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安。屬梔子厚朴湯。

第二十八。三味

傷寒以丸藥下之。身熱不去。微煩者。屬梔子乾



薑湯第二十九。二味

傷寒下之。續得下利不止。身疼痛。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。第三十。並用前方

太陽病。過經十餘日。二三下之。柴胡證仍在。與小柴胡。嘔止小安。鬱鬱微煩者。可與大柴胡湯。第三十一。八味

傷寒十三日不解。胃脅滿而嘔。日晡發潮熱。微利。潮熱者。實也。先服小柴胡湯。以解外。後以柴胡加芒消湯主之。第三十二。八味

傷寒十三日。過經譫語。有熱也。若小便利。當大
便鞭。而反利者。知以丸藥下之也。脉和者。內實
也。屬調胃承氣湯證。第三十三。用前第九方

傷寒八九日。下之。胃滿煩驚。小便不利。譫語。身

重。不可轉側者。屬柴胡加龍骨牡蠣湯。第三十

四。十二味

火逆下之。因燒針煩躁者。屬桂枝甘草龍骨牡

蠣湯。第三十五。四味

太陽病。脉浮而動數。頭痛發熱。盜汗惡寒。反下
之。膈內拒痛。短氣躁煩。心中懊懣。心下因鞭。則

為結胃。屬大陷胃湯證。第三十六。用前第十方

傷寒五六日。嘔而發熱者。小柴胡湯證具。以他

藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心滿而鞭痛者。此為結胃。大陷胃湯主之。但滿而不痛者。為痞。屬半夏瀉心湯。第三十七。七味

本以下之故。心下痞。其人渴而口燥煩。小便不利者。屬五苓散。第三十八。五味

傷寒中風下之。其人下利日數十行。腹中雷鳴。心下痞鞭。乾嘔心煩。復下之。其痞益甚。屬甘草

瀉心湯第三十九。

六味

傷寒服藥下利不止。心下痞鞭。復下之。利不止。與理中利益甚。屬赤石脂禹餘糧湯第四十。
太陽病外證未除。數下之。遂協熱而利。利不止。心下痞鞭。表裏不解。屬桂枝人參湯第四十一。
五味

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。屬麻黃杏子甘草石膏湯第四十二。

四味

陽明病下之外有熱。手足溫。心中懊懣。飢不能食。但頭汗出。屬梔子豉湯證第四十三。

用前方第七

傷寒吐後腹脹滿者。屬調胃承氣湯證。第四十

四。用前第九方

病人無表裏證。發熱七八日。脉雖浮數。可下之。

假令已下。脉數不解。不大便者。有瘀血。屬抵當

湯。第四十五。四味

本太陽病。反下之。腹滿痛。屬太陰也。屬桂枝加

芍藥湯。第四十六。五味

傷寒六七日。大下。寸脉沈而遲。手足厥。下部脉

不至。喉咽不利。唾膿血者。屬麻黃升麻湯。第四

十七。十四味

傷寒本自寒下。復吐下之。食入口即吐。屬乾薑。

黃芩黃連人參湯第四十八。四味

師曰。病人脉微而瀉者。此為醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱。無休止時。夏月盛熱。欲著複衣。冬月盛寒。欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此醫發其汗。使陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。以陽氣內微。不能勝冷。故欲著複衣。十一月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。以陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其身。又陰脉遲瀉。故知亡血也。

寸口脉浮大。而醫反下之。此為大逆。浮則無血。大則為寒。寒氣相搏。則為腸鳴。醫乃不知。而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣。冷必相搏。其人則餒。太陽病三日。已發汗。若吐。若下。若溫針。仍不解者。此為壞病。桂枝不中與之也。觀其脉證。知犯何逆。隨證治之。

脉浮數者。法當汗出而愈。若下之。身重心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脉微。此裏虛。須表裏實。津液和。便自汗出愈。

凡病。若發汗。若吐。若下。若亡血。無津液。陰陽脉自

和者必自愈。

大下之後復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。

下之後復發汗。必振寒。脉微細。所以然者。以內外俱虛故也。

本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之。而反汗之。為逆。若先下之。治不為逆。

太陽病。先下而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。得表和。然後復下之。