

傷寒補天石 ①



續傷寒補天石卷下

心悸

悸動原來有九症。臍下奔豚。桂枝湯。水乘心。悸伏苓。行。

誤大青身。動悸小柴和胃府。水乘心。悸伏苓。行。

心悸者。築築然怔忡。不能自安。是也有氣虛。有停飲。

氣虛者。陽氣內弱。心中空虛。而為悸。又自汗下後正。

氣虛而亦悸。與氣虛而悸。又甚。皆須先治其氣也。停。

飲者。飲水過多。水停心下。心火惡水。不能自安。雖有。

餘邪。必先治悸。與水也。如小便利而悸者。伏苓桂枝。



白朮湯小便少者必裏急猪苓湯

猪澤滑伏膠

傷寒三三

日心中悸而煩小建中湯

佳枝赤芍棗錫糊

經云先煩而悸

者此爲熱先悸而煩者此爲虛故宜小建中湯

發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝湯

草湯

二味用甘瀾水煎服

桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入

脾而緩中發汗後其人臍下悸欲作奔豚伏苓桂枝

大棗甘草湯

伏苓能伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘瀾

水者揚之無力取不助腎邪也

陽明心下悸小便不利心煩喜嘔小

氣不足 內經 食甘 甘州 緩中 散也 潤而 生薑 衛也 山正氣 行也 收平

柴胡加猪苓湯。少陽耳聾目赤。胸滿而煩。妄加吐下。

則悸而驚。小建中湯。桂枝赤芍 有熱小柴胡湯

人參少陰四逆湯。附子草 其人或悸四逆散 實與甘草

甘草加桂枝。心下有水氣。厥而悸。當先治水。伏苓甘草。

湯。伏苓桂枝 不然水入胃中必作利也

驚惕第四十八

驚惕者。心中惕然。而驚也。火劫驚惕。救逆湯。桂枝湯 中土芍

藥加蜀漆龍骨。下後煩驚。柴胡龍骨牡蠣湯。柴半龍 骨參鉛

牡蠣名救逆湯

黃真易經卷下

蠟大黃桂

伏棗同姜

少陰吐下而生驚惕炙甘草湯

生地桂枝甘草參阿膠

麥冬

麻子仁

大抵傷寒汗吐下後虛極之人或因事驚恐

遂生驚惕者宜安神養心血之劑

心下滿第四十九

心下滿者當心下高起滿輒是也不經下後而滿者

治有吐下之分若下後心滿者症有結胸痞氣之別

發熱者小柴胡治之按之汨汨有聲而濡者停水也

五苓散

桂枝白朮

主之按之鞭痛者宿食也輕則消



南京中医药大学图书馆藏

導重則承氣下之。寒在胸中。心下滿而煩。飢不能食。瓜蒂散吐之。陽明病。心下滿。鞭者。不可下。下之利不止者死。脉浮大有力。心下鞭。有燥渴譫語。大便實者。此屬臍病。宜攻之。大抵心下滿。胸中滿。腹中滿。俱不可用甘甜之物。蓋甘能補氣。填實也。外用姜擦法。生去汁取渣炒熟。緇包熨以愈為度。惟熱結不可炒熟。屬臍者。餘結胸痞氣皆可用此法。按止言食縮尿在臍故可下。若食在胃口未入于胃。則不可下也。

胸脇滿第五十



胸脇滿者謂表邪傳裏必先胸以至心腹入胃是以

胸滿多帶表症宜微汗脇滿多帶半表半裏症小柴

胡湯和之加枳桔凡治痞滿俱用柴胡桔梗湯柴胡甘草

亮桔梗如未效者合小陷胸一服如神蓋枳亮瀉至

高之氣枳實瀉至低之氣故心之上胸之分枳亮瀉

之心之下胃之分枳實瀉之瓜蒌仁瀉肺洗滌胸中

痰垢之要藥故胸滿而煩者加之

結胸痞氣者謂太陽自汗當服桂枝湯

桂枝赤芍姜棗甘

而

誤下之邪氣乘虛結于心下滿而硬痛者此為結胸

太陽無汗當服麻黃湯

麻黃桂枝杏仁甘草

而誤下之邪氣乘

虛結于心下但滿而不痛者此為痞氣凡結胸從心

下至小腹鞭滿而痛手不可近者為大結胸大陷胸

湯

甘遂芒硝與大黃

止在心下按之方痛者為小結胸小陷

胸湯

黃連半夏瓜蒌仁

冷水與灌熱不得去煩滿無熱症者

為寒結胸三物白散

貝吉三分芭豆一分

或只實理中湯

人參

經傳寒濕天不後

白木草乾姜加只實主之心下怔忡頭微汗出但結胸無大熱者

為水結胸伏苓半夏湯伏苓半夏陳朴姜加吐

不盡蓄在上焦漱水不欲嚥胸滿硬痛者為血結胸

犀角地黄湯犀角生地芍丹皮發熱微惡寒支節煩疼心下

支結外症未去者為支結柴胡桂枝湯柴胡半夏人參甘桂枝芍

藥姜煎若胸脇滿而微結者為微結柴胡姜桂湯柴胡甘草

天花粉桂枝牡蠣乾姜增又有作酸惡食胸滿硬痛者為食結輕

則消導重則承氣喘渴咳嗽胸脇滿痰痛者為痰結



加味二陳湯

伏苓半夏甘橘紅杏連吉硬瓜蒌同若心下脹滿不痛為

痞氣瀉心湯

半夏黃芩乾姜參黃連甘草一同增經曰按之痛

關脉沉名曰結胸凡結胸脉浮大者猶帶表症

之未可下也下之者死結胸症悉其煩躁者亦死若

兼斑黃狂亂呃忒及脉微細沉小手足逆冷者死

凡心下鞭按之痛關脉沉者實熱也心下痞按之濡

關脉浮者虛熱也大黃黃連瀉心湯心下痞惡寒者

表未解也表解乃可攻痞解表桂枝湯

桂枝赤芍姜棗甘攻

痞大黃黃連瀉心湯心下痞而復惡寒汗出者虛熱

內伏陽氣外虛也附子瀉心湯

附子大黃黃芩黃連

協熱利不

止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯

桂枝人參甘草木姜

表

未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大

虛表裏不解故加桂枝甘草于理中湯也汗出胃虛

客氣上逆心下痞鞭乾嘔食臭脇下有水氣腹中雷

鳴下利者生姜瀉心湯

生姜甘草芩連棗

下後胃虛客氣上

逆下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭乾嘔

心煩者甘草瀉心湯

甘草連半棗乾姜

汗後胃虛是外傷陽

氣故加生姜下後胃虛是內傷陰氣故加甘草

痞鞭噫氣不除者旋復代赭湯

旋復人參甘草半夏大棗代赭

覆之鹹以契痞鞭代赭之重以鎮虛逆生姜半夏之

辛以散虛痞人參甘草大棗之甘以補胃弱痞不解

漉渴小便不利者五苓散心中痞鞭吐嘔下利者大

柴胡湯

芍半柴芩實大黃

胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者

此胃有寒也宜吐之瓜蒂散若不因下而為滿者表

邪傳至胸中未入乎腑症雖滿悶尚爲在表正屬陽部分只宜小柴胡加枳桔以除其悶若未效宜小陷胸湯黃連半夏一服如神凡治結胸先理其氣用只桔以寬之隨用姜渣擦之最效

胸中冷結厥第六十二

胸中冷結厥者謂手足冷脉仁緊心下滿而煩飢不能食者此病在胸中宜吐之寸脉微浮或伏胸中病鞭氣上冲咽喉不得息此胸中有寒宜吐之又有痰

實結胸亦宜吐之並用瓜蒂散

懊憹五十三

懊憹者鬱悶不舒之貌蓋表症悞下正氣內虛陽邪

內陷于心胸之間重則爲結胸也大抵邪結胸中宜

吐邪熱結胃腑宜下發汗吐下後虛煩不得眠若剝者

必反覆顛倒心中懊憹與夫下後煩熱胸中窒者下

後身熱不去心中結胸者痛並用梔子豉湯二味吐之苦寒

苦以湧吐寒以勝熱少氣者加甘草以益氣嘔者加

賣易寒補天石卷下

生薑以散氣下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴

湯梔子厚朴只實九藥下之身熱不去微煩者梔子乾姜湯

陽明下後懊憹而胃中有燥屎承氣湯下之陽明無

汗小便不利心中懊憹必發茵陳湯茵陳梔子利之

身痛五十四脉緊而浮身熱痛太陽經病不堪任更兼中濕并風溫若是陰家脉帶沉

身痛者雖曰太陽表邪未解又有溫經發汗不同如

發熱惡寒頭疼身痛此太陽症也汗出則愈無汗麻

黃麻黃桂枝有汗桂枝湯桂枝赤芍三時冲和湯九



羌活細蒼芍羌防芷地芩甘同加減冲和湯吐利厥逆體扁此少陰

症也溫之則愈四逆湯陰症吐利厥冷發熱體痛霍

亂吐利體痛此表裏俱寒也先溫裏四逆湯附子草

後攻表桂枝湯蓄血症體痛下盡黑物則愈桃仁承

氣湯大黃桂枝桃甘硝溫症體痛利小便則愈五苓散加蒼

朮羌活汗後脈虛體痛桂枝芍藥人參湯勞倦脈虛

體痛補中益氣湯補中益氣參芪升加蒼朮羌活血

虛發熱體痛脈浮數無力四物湯中加黃柏知母羌

黃易經補天石卷下

活痰症。骀痛。二陳湯加蒼朮。羌活。身痛與身重有辨。
身重不能轉側者。下俊血虛。津液不榮于外也。柴胡。
龍骨牡蠣湯。身痛不能轉側者。風濕相搏。子經。
無邪也。桂枝附子湯。桂枝附子湯。
大抵傷寒煩熱身痛。
即是熱痛。汗出則解。無熱吐利。身痛即是虛寒。溫之。
則愈。不可悞也。

身痒第五十五

身痒者。謂太陽病未解。面赤身痒者。以不能得小汗。