

發刻醫家必究本方 春四卷下

中暑嘔吐煩渴飲以黃連香需散治之

或批杷葉散亦治之
方見三卷內

中寒嘔吐四肢厥冷飲食不下以附子理中湯治之

方見本
卷前

病脾胃虛弱羈風挾痰宿食不化而作嘔者是也

治法當治中為本驅風導痰祛宿食為標是以用白朮補中氣

神麴麥芽消宿食天麻驅風茯苓半夏豁痰用橘紅生薑

散逆氣以止嘔吐

方東垣茯苓半夏湯

白朮 一錢

神麴 八分

麥芽 一錢

天麻 七分

茯苓 一錢

半夏 五分

橘紅 一錢

生薑 五片

右咬咀水二鍾煎一鍾溫服

飲食所傷心下痞滿嘔吐不止以枳實二陳湯治之

方見三
卷內

治中脘停寒作痛法當補中散寒是以用人參白朮炙甘草諸甘溫以補中乾薑丁香諸辛熱以散寒生薑散逆氣以止嘔吐

方理中丁香湯

人參

五錢

白朮

甘草

各七分

丁香

七分

乾薑

七分

生薑

七片

○右井水二鍾煎一鍾溫服

○噎膈

噎症乃膈之漸也為因憂思驚恐或先富後貧情思不樂鬱結日久不得舒散以致血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入必屈曲而下名曰噎其槁在下與胃為近食雖可進難盡入胃良久復出名曰膈又名翻胃必大便燥少若羊糞然治雖不同病出一體況此症發於五旬之

後血氣衰弱治故難愈。當噎初萌未至於膈之耶。可與潤血湯和膈潤燥。仍令常飲新溫牛乳細呷。每頓進一盃。或間飲甘蔗汁及製燒梨與食。藥中少加驢屎防其或生蟲。切不可撓其心。胸痞悶水物妨碍。便進香竄熱藥。雖暫舒泰。殊不知血液被耗。愈使胃涸津竭。不能當也。翻胃乃食一日半日翻出如故。其因有四。氣虛者。補脾益氣。血虛者。滋養榮血。痰飲者。順氣消痰。氣鬱者。疎流氣聚。但兼熱燥須用養心。此症膠固非比乍然嘔吐也。

○噎膈脉訣

難經云。脉格則吐逆。○脉經云。緊而滑者吐逆。寸弱而濇。胃反千金云。寸緊尺濇。其人胸滿不能食而吐。吐爲下之故。此不能食。設言未止者。此爲胃反。故反爲之微濇。

金匱云病人脉數則熱當消穀引飲而反吐者因反發汗令是陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐爲胃反醫反下之令脉反弦故名曰虛又云跌陽脉浮而濇浮則爲虛濇則傷脾脾傷不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病難治

噎膈反胃之症其因有三中氣虧敗曰津液枯涸曰火熱上炎治療大法中氣虧敗者補中益氣爲主津液枯涸者生津益血爲先火熱上炎者茲陰降火爲本

噎膈反胃之症大約有四曰血虛曰氣虛曰熱曰痰如氣虛者脉必緩而無力治宜四君子湯爲主加減如血虛者脉必數而無力治宜四物湯爲主加減

若是熱者。脉必濇而數。宜清涼飲。子或承氣湯加減。

如因痰者。寸關脉沉而滑。挾滯氣者。寸關脉沉而濇。並宜以二陳湯爲主。加減佐以薑汁韭汁。童便竹瀝爲主。方更無其隨症加減。

如因七情鬱結致氣噎者。王方加香附撫芎。木瓜檳榔瓜蒌仁之類。

大都此症多生於血枯血陰也。陰主靜。必須內外兩靜。則臟腑之火不起。使金水一臟得養。則陰血自生。腸胃津液傳化得宜而病自愈。

張機峯云。此病乃神思間病。惟內觀自養可以卻之。此言深得病情之要旨也。

噎而食物必屈曲及水飲難下。以潤血湯如大便結閉。加酒炒

大黃少許

方潤血湯

當歸鬚

一錢二分

川芎

一錢

麻仁

一錢

桃仁

去皮尖一錢

紅花

酒洗三分

甘草

生四分

赤芍藥

黃芩

生地黃

七分

橘皮

去皮七分

右咬咀水煎熟食前服

噎塞不通病人氣血未衰暫與香砂二陳湯加紅花桃仁稍寬

止服

方香砂二陳湯

香附子

一錢

砂仁

七枚

半夏

一錢五分

茯苓

一錢五分

橘皮

一錢

甘草

五分

右咬咀水煎熟食遠服

病嘔噦痰多。咽喉枯澀。噎食不下之症。此乃中氣虧敗。運動失常。以致津液凝聚。成痰不復榮養。二焦是咽喉枯槁。噎食不下是也。

治法當補益中氣為主。故用人參。白朮。甘草等補中。以健運動。為本。桔梗。半夏。生薑。以豁痰涎。杵頭糖。下噎食。白荳蔻。萹澄茄。枇杷葉。溫脾和胃。下氣。以止嘔噦。木香。沉香。以散鬱滯。

方五噎散

人參

三兩

白朮

三兩

甘草

炙一兩

桔梗

一兩

半夏

五錢

生薑

二錢

杵頭糖

三兩

白荳蔻

五錢

萹澄茄

三錢

枇杷葉

五錢

木香

五錢

沉香

一兩

右共為末。薑湯調服。

治食物之後冷涎不已。隨卽翻出。或心腹覺疼。以大藿香散去

桂主之。或霍香安胃散。

二方俱見本卷前

治七情氣鬱成痰。氣噎痞痛喘悶。法宜和氣豁痰爲要。故用桔

梗利氣。瓜蒌半夏豁痰。

方瓜蒌仁湯

桔梗 二兩

枳殼 一兩

瓜蒌仁

四兩另研

半夏

五錢

右件共爲末。以薑汁糊丸。每蜜糖湯下。五七十丸。日三服。

心胸痞悶。痰涎上壅。食物卽吐。以香砂安胃散王。之此反佐之

法。病若稍退。止服。

方見本卷前

被物噎塞。致喉間如碍。水飲難下。痰涎壅上。治以透膈散。

方透膈散

橘紅 一錢

茯苓 八分

半夏 八分

桔梗 八分

黃芩

四分

木香

四分

甘草

冬三分

瓜蒌仁

七分

杏仁

六分

砂仁

七枚

枳實

五分

生薑

五片

右咬咀。水煎熟。不拘時服。

病

氣逆吐痰。嘔食不下。此乃中氣虧敗。運動失常。以致腹內陽

氣不得四達。上逆而作嘔吐。以致三焦津液。不得四散。以

養經絡。鬱而成痰。遂使咽喉一燥。噎食不下是也。

治

法宜補中氣為主。是以用人參白朮等。補中氣以健運動。半

夏生薑豁痰散逆氣。以止嘔吐。白蜜潤燥。以下食。

方

十全半夏

人參

四兩

白朮

二兩

半夏

五錢

生薑

五錢

白蜜

八兩

右咬咀。先將水一斗置蜜內。攪一二百遍。令勻。再入前藥煮。

至五升每溫服一升。

翻胃多渴以白朮散主之。

方見三卷前

翻胃倦怠以清氣健脾湯此亦開胃補脾之藥。倘見吐酸口燥

不宜多服

方清氣健脾湯

本香

四分

人參

一錢

白茯苓

白朮

各一錢

橘皮

八分

半夏

八分

白芫花

三分

香附子

六分

甘草

五分

砂仁

七枚

生薑

五片

右咬咀水二鍾煎一鍾食遠溫服

病

上焦氣鬱不舒上冲嘔食不下脉浮而洪是也

治

宜健脾散鬱而吐自愈。食自下故用白朮茯苓健脾。桔梗作

舟楫以載藥。半夏調紅枳實厚朴等以散上焦之鬱氣。

方和中桔梗湯

白朮 三錢

茯苓 一錢

桔梗 七分

半夏 六分

陳皮 二錢

枳實 八分

厚朴 一錢

右咬咀水鍾半煎一鍾調木香末一錢隔宿空心服二服氣漸下吐漸止去木香加白芍一錢黃芪二錢煎服病愈卽已如大便秘硬食不盡下用大承氣去硝服之微利爲度再將前藥補之

翻胃食物一日半日吐出如故此胃弱不溫不能消化糟粕隨氣逆上而出也以丁香二陳湯主之

方見本卷前

病胸膈不利大便秘結氣喘而喘食不得下此乃中氣不充鬱不行以致周身津液凝結爲痰不得滋潤臟腑遂使腸胃枯槁大便不得下通中焦氣逆上壅而爲胸膈痞滿喘嘔

噎食不下之症是也。

治法宜補中散鬱為主。用人參甘草補中健脾。不香檳榔厚朴

枳實散滯除痞。蒲藿香和胃而止嘔噦。大黃當歸潤燥而

通大便。

方人參利膈丸

人參

四兩

甘草

一兩

木香

二錢

檳榔

五錢

枳實

一兩

厚朴

二兩

藿香

二兩

大黃

一兩

右件各為細末。糊丸薑湯下。

翻胃。若氣虛以四君子湯。

方見木香內

○血虛者以四物湯。

見二方

○痰飲者以二陳湯。

方見三卷

○氣鬱者以木香調氣散

為主。加減調治。但兼熱證。加薑汁沙黃連。

方見三卷前

經云。三陽結謂之膈。三陽者。大小腸膀胱也。結熱結也。蓋小腸

與心相爲表裏而心生血脈是以小腸結則血脈燥咽喉
乾枯大腸以傳導爲重若大腸熱結則大便不通膀胱爲
津液之腑故膀胱熱結則津液枯稿小便不利是以三陽
熱則下竅不通而反上行是以噎食不下從上湧出此乃
腸胃熱結所致故河間多用三承氣湯以致腸胃結熱而
獲效由此故也下後則當以生肌養血之劑調之俗醫不
察此理專用辛香之劑止嘔止吐乃是以火濟火其害可
勝言哉。

○嘈雜吞酸吐酸

嘈雜乃心中似飢煩雜不安懶於飲食謂之心嘈此乃痰因火
動或酒過濕滯或肥人痰熱皆使然也治法皆以炒山梔薑汁
炒黃連爲主隨症加減吞酸卽噯酸乃濕熱鬱積於肝而出伏

在肺胃之間。飲食入胃。被濕熱鬱遏。其食不得傳化。故作酸也。治以萊菔、黃連各炒。隨時令迭其佐使。以蒼朮、茯苓爲主。取萊菔順其性而折之。此反之佐也。吐酸是痰火宿食鬱遏胃脘。或平時津液隨上汁之氣鬱積之久。濕中生熱。故從火化。遂作酸水吐出。此素問謂熱言其本也。其有鬱積之久。不能自久。湧而出。伏於肺胃之間。咯不得上。咽不得下。肌表得風寒。則內熱愈鬱。而酸味刺心。肌表得暖。腠理開發。或得香熱湯丸。津液得行。亦可暫解。此東垣爲寒言其末也。有朝食甘美。至晡時心腹刺酸。吐出如醋。此是血虛火盛而然。二者俱是土氣不足。木火用事。治若辛熱之藥。皆當禁也。只宜蠶食蔬菜自養。則病易安。

○吞酸吐酸脉症

脉沉而遲者。胸中有寒飲。○脉洪者。濕熱在膈間。時吐酸水。欲

成飜胃。

吐酸之症。以病机言之。屬於濕熱。以臟腑言之。屬於脾胃。以病邪言之。屬痰飲宿食。治療之法。熱者以寒清之。脾濕者以苦燥之。痰飲者豁之利之。宿食者消之導之。各宜類究。毋執一端。

如食鬱挾痰。宜二陳湯。加南星。黃芩之類。

如食鬱吐酸。平胃散。加炒神麴。炒麥芽。薑棗同煎。

凡吐清水。宜陳壁土炒蒼朮。白朮。同茯苓滑石。陳皮同煎服。

凡治酸。必用吳茱萸者。乃順其性而折之也。

嘈雜。或食後腐作酸臭。心中煩雜。治以保和湯。

方保和湯

橘皮 去白

茯苓 各一錢

半夏 一錢

南星 一錢

山梔仁炒

白朮一錢

黃芩炒一錢

甘草五分

生薑五片

○如熱甚加青黛五分。

右吹咀水二鍾煎一鍾食前服。

嘈雜濕痰氣滯。不喜飲食以前胡湯加蒼朮香附子。

方前胡湯

前胡

半夏

橘紅各一錢

杏仁

紫蘇子

枳實

各五分

桑皮

八分

甘草

四分

生薑

五片

右吹咀水煎熟食遠服。

肥人嘈雜以前胡湯加撫芎蒼朮治之。

治濕熱鬱成酸味上戕法當疎鬱滯清濕熱為主是以用吳茱

萸橘紅等諸辛以疎鬱蒼朮燥濕芎連等以清熱。

方吳茱萸丸

吳茱萸

熱炒二兩

橘紅

去白一兩

蒼朮

一兩

黃芩

酒炒三兩

黃連

酒炒二兩

○右共為末。用神麴打糊。丸如梧

桐子大。每以薑湯送下。三五十丸。日進三服。

吞酸胸中無奈。或噯腐臭。治以茱連湯。

方茱連湯

橘紅

一錢五分

半夏

一錢

神麴

一錢

蒼朮

一錢

黃連

六分

蘿蔔子

炒五分

茯苓

一錢二分

香附子

八分

山杏子

八分

生薑

七片

吳茱萸

四分

和黃連炒

右咬咀。水煎熟。食前服。

中氣不足。脾胃不和。嘔吐作酸是也。

治法當補中氣。和脾胃。是以用人參。橘紅。補中氣。丁香。藿香。溫

脾和胃。助生薑散鬱。以止嘔。

無丁香。有吳萸。