

潛齋醫學叢書十四種



四科間效方乙集目次

外科通治

瘰癧初起

焮赤腫痛為瘰癧陽證也

已成不潰

瘰生數處

偏體浸淫

身面疥瘡

洋徵瘡

多年惡瘡

瘰瘡努肉

諸瘡成管

瘡久成漏

漆瘡

魚臍疔

四面赤中央黑凹者是

已成未成

已成未成

膿淨不合

偏體火瘡

身面熱瘡

偏身風癩

結毒

翻花瘡

諸瘡生蛆

瘡爛成孔

瘡痕不滅

疔

生黃豆與病人嚼之不醒者是疔

疽

毒自臟發外不焮腫陰證也

石疽

如石堅硬不作膿者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

疔疽内陷

移毒法

隔皮取膿法

疽瘡骨出

白駁

俗名癩花風
又名蛇皮癬

瘙癢

身面赤腫
癢痛也

丹毒

遊風赤
疹也

諸癰

牛皮頑癬

赤白癩風

赤癬

白癬

上部諸證

頭瘡

禿瘡

肥瘡

天泡瘡

眉疽

偷鍼

耳後月蝕

玉枕瘡

鼻瘡膿臭

鼻蝕穿唇

唇瘡

口瘡

羊鬚瘡

對口

天柱瘡

疔腮



南京中医药大学图书馆藏

頸項結核

瘰癧馬刀

瘰癧已潰

瘰氣

贅疣

點痣

中部諸證

肩疽

腋瘰

腋疣

瘰疽

臂疔

蛇頭

代指

俗名瘰爪

發背

乳瘰

脇瘡

腋疽見臟

脇腰丹毒

蛇纏

腸瘰

小腹腫痛小便似淋或大便艱澀下膿腳不能伸者是

下部諸證

便瘰

凡便毒微瘡皆發于外腎上橫骨乃腎任二脈之病也

囊瘰

囊瘡

莖瘡

下疳

懸瘰

生于肛前囊後俗名偷囊老鼠



痔

痔漏

坐板瘡

腎瘻

附骨疽

臙瘡

骹肚瘡

毒熱足腫

足跟瘡

甲疽

肉刺

趾潰

跌打傷

通治

傷筋

傷骨

傷腦

傷眼

擦落耳鼻

穿斷舌心

腸出

囊破

破傷風金瘡傷同

閃挫腰痛

閃拗手足

杖傷

金刃傷



此方一讀，需要完整PDF請訪問
 中國醫藥大學圖書館版權所有
 www.tongbook.com

通治

出血不止

瘀血內漏

瘀血在腹

血出閃絕

發腫疼痛

指斷

腸出

莖斷

箭傷

箭簇不出

槍子入肉

鍼折入肉

湯火傷

通治

偏體傷者

未起泡者

已起泡者

泡破

爛見骨

滾油潑傷

爆竹炸傷

火藥傷

煤炭毒

烟熏悶絕

灸瘡

人物傷



人齧

馬齧

豬齧

犬齧

貓齧

鼠齧

虎齧

虎能狼爪傷

蛇齧

蛇纏不解

蛇入人竅

蛇骨刺人

辟蛇法

壁虎齧

蝎螫

蜈蚣齧

蜘蛛齧

壁鏡齧

蠶齧

蜂螫

蟻螫

載發毒
一名楊辣
一名瓦辣

蚯蚓呵

諸蟲齧



四科簡效方乙集

海甯王士雄孟英選

鄞縣 曹炳章赤電氏圈點

外科通治

瘰癧初起

焮赤腫痛為瘰癧證也。

生大黃研末篩細醋和塗之燥即易不過三次即消散不復作膿

花粉 赤豆等分研末醋調圍之

木芙蓉

花葉根皆可用或采花浸鹽酒內藏以待用。

杵爛乾者研末圍之中間留頭乾則頻易初起者即消散已

成者即膿聚而潰已潰者易斂生肌或加赤豆末同圍其功更大除陰毒貼骨疽之外無不神效。

已成未成

牛皮膠

一名黃明膠

一片水漬軟當頭開孔貼之未膿自消已膿潰出

已成不潰

取白雞兩翅下第一羽各一莖燒灰研末水調下雀屎取堅硬者酒塗之即破

蠶繭已出蛾者燒灰酒服用一枚出一頭二枚出二頭

膿淨不台



先以槐枝 葱白煎湯洗。後用瓦松陰乾為末。傅。或用經霜桑葉研傅。或秦光研末。糝。濃煎棗湯洗之。再以鼈甲煨存性。研末。糝。絲瓜杵汁頻塗。

癰生數處

牛糞燒灰。研雞子清。或醋調塗。

偏體火瘡

初起似癰。漸如水泡。熱似火燒。瘡色紫赤。不治殺人。雲臺葉

即油菜

搗汁調大黃

芒硝

生

鐵鏽等分塗。

偏體浸淫

凡猝得毒氣攻身。瘡赤癢痛。上下周匝。煩悶欲死。此浸淫瘡也。起于心下者最險。不早治殺。人以雞冠血塗之。日四五次。

新羊糞絞汁塗。

胡燕窠中土研末。水和敷。

身面熱瘡

榆白皮研末。油和塗。

苦參末。粟米飲丸。梧子大。每五十丸。空心米飲下。



瘰癧不可灸耳。

已成未成

草烏 南星等分為末。少加肉桂和勻。生薑汁熱酒調塗。未成者內消。已成者即潰。久潰者能去腐爛。

石疽 如石堅硬不作膿者。

醋五升。以粗黃石如鵝卵者。猛火燒赤。淬之。取出再燒再淬。至醋減半。將淬過之石搗細末。即以此醋和厚塗患處。以消為度。

黃耆 人參 各一兩 為末。入冰片 錢一 生藕汁丸。綠豆大。每二十九。溫水下。

疔疽內陷

凡疔疽最慮毒不外達而反內攻。初起三日內。用真綠豆粉 一兩 乳香 五錢 燈心 同研 和勻。每錢濃煎生甘草湯調。時時呷之。使常在膈間。若兼嘔逆。即毒氣內攻之漸。尤宜亟服。設鼻生瘡。菌飲食不進。即危矣。四五日後。猶宜間服之。

移毒法

凡毒生要害。不便出膿之處。此藥能移之。或上或下。俾無後患。用白芨 一兩 紫花地丁 八錢 五倍子 二錢 好硃砂 明雄黃 輕粉 各一錢 牙皂 八分 烏雞骨 一錢 共研末。以醋調敷毒之上。截即

能移至下截。敷下則移上極效。

雄黃 飛麩 蚯蚓糞。共研細醋調。漸漸塗而逼之。自能移過要害處也。

隔皮取膿法

凡疽毒深遠。膿難直取。或患人畏用刀鍼者。膿熟時用此法甚妙。驢蹄皮即腳底剝下者妙。取麥麩

各一草烏刮去皮四錢。共研勻。加食鹽錢五水調和成薄餅。瓦上炙微黃。再研細。醋調攤白紙上貼

患處。膿即從毛孔而出。蓋以草紙滲溼。即換膿淨紙燥。腫亦自消。如膿不從毛孔出。則塗藥之旁。自然潰出一孔。神妙無比。

疽瘡骨出

黃連 牡蠣等分研末。先以鹽酒洗過敷之。

蜜陀僧研末。桐油調勻攤貼。

白駝俗名癩花風。又名蛇皮癬

先以布擦透。後用醋磨石硫黃 附子塗之。或硫黃 白礬擦之。

先以皂角湯洗。再煎茵陳湯洗。後以醋調蛇蛻灰搽。右頭面先起漸長如癰。急用穿山甲片

刮令燥痛。以炙熟豬脂頻擦即愈。

瘡癢。身面赤腫癢痛也。

茵陳煎濃汁洗

鐵鏽磨水塗

荊芥穗 赤豆等分研雞子調塗

丹毒 遊風赤疹也。

無名異研末葱汁調塗

芭蕉搗爛塗

羚羊角燒灰雞子清和塗

諸癬

五倍子去蟲白礬燒過等分研末溼者糝之乾者油調

生白果仁或薑黃頻擦

韭根炒存性研猪油和塗

牛皮頑癬

藜蘆末生油和塗

烟膠 寒水石 各三錢 白礬 二錢 花椒 半錢 共研末猪油調塗

赤白癰風

潛齋醫學叢書

四科簡效方 乙集 外科通治

五



北京中醫藥大學圖書館版權所有

貝母 南星等分為末。生薑帶汁擦之。

豬脰一具。酒浸一時。飯上蒸熟食。不過十具愈。

桑枝^{十斤}益母草^{三斤}水熬成膏。每卧時酒服一二兩。

赤癰

醋磨知母擦之。日三。

白癰

白蒺藜六兩。生研末。每服二錢。日二。半月白處見紅點。一月絕根。

生胡麻研末。每用酒服一兩。日三。至五斗瘡。忌生冷雞豬魚蒜等百口。

上部諸證

頭瘡

先用醋少許和水。淨洗去垢。再用溫水洗。乾。百草霜細研。入鉛粉少許。生油調搽。

五倍子白芷等分研末。青油調敷上。溼者糝之。

鴿屎研末。醋調搽。最妙。用生蘆服杵爛。米醋泡透敷。

疥瘡

殺豬時。取其肚破去屎。乘熱反卷頭上。須臾蟲出著肚。若不盡。再作至無蟲。以皂角湯熱洗。



次用黎蘆末豬油調塗。如嫌肚穢則用羊肉切大厚片。如常炙香。乘熱徧貼亦可。取蟲盡以鹽湯洗之。再用雄黃末和豬膽汁塗之。

肥瘡

鉛粉煨 松香各三錢 飛礬二錢 黃丹一錢 共研麻油一兩熬膏塗。

雞子黃熬油搽。

天泡瘡

生百合搗塗。

蓮蓬殼燒存性研井泥調塗。

眉疽

生綠豆 五倍子等分研末醋調搽。

偷鍼

南星 地黃各二錢研成膏貼兩太陽。

耳後月蝕

蚯蚓屎煨研豬油調搽。

玉枕瘡



南京中医药大学图书馆藏

原蠶蛾炒石葦等分為末搽之。

鼻瘡膿臭

苦參 枯礬各一兩生地汁三合水二瓊煎至三合少少滴之。

鼻蝕穿脣

銀屑一兩水三升。銅器內煎至一升。日洗三四次。

脣瘡

旋覆花煨存性研。麻油調搽。

口瘡

五倍子錢八蜜陀僧錢四黃檗錢二銅綠錢一研末和勻糝。色赤者花粉研末糝。

色白者黃檗 華撥等分研糝。

羊鬚瘡

舊綿絮煨灰。麻油調搽。

對口

枸橘三枚瓦焙存性。黃酒衝服。儘量飲微醉。卧蓋厚被。得汗即解。

白菊花 甘草各四兩水煎服。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

天柱瘡

生脊大椎上。天如錢出水。用驢蹄甲二片鉛粉二錢麝香少許。為末醋和塗。乾則糝。

疥腮

葱煎濃湯儘洗。

赤豆研末醋調敷。

頸項結核

野菊花搗爛煎酒服渣敷患處。

連翹脂麻等分為末。時時頻服。

生薯蕷根一蓖麻子二粒各去皮研勻攤貼。

瘰癧馬刀

胡桃劈開去肉入去鉤全蝎一尾。合好紮緊。瓦上炙存性研。每日一枚溫酒調下。至愈即止。

瘰癧已潰

牛皮油鞣底燒灰麻油調塗。

陳年破明角燈燒存性研。菜油和塗。

牆上白螺螄殼研末敷。



北京中醫藥大學圖書館藏

瘰氣

昆布 海藻等分研。蜜丸龍眼大。時時含之。嚥汁。鍼砂入水缸浸之。飲食皆用此水。十日換砂。半年自愈。

贅疣

蜜陀僧 桑白皮等分研。新汲水調塗。

生南星大者一枚。研爛醋調。先以鍼刺。令氣透貼之。疣破出血。用陳京墨殿百草霜等分卷之。

點痣

石灰一兩熬桑柴灰淋汁熬成膏。刺破點。

血痣潰血。五靈脂炒研摻之。

中部諸證

肩疽

吳萸鹽淹過炒研。醋調塗。

腋癰

池塘爛泥一杯桐油三杯和勻。以鵝翎時時掃塗。勿令乾。



北京中醫藥大學圖書館藏