

亥22

3-142

宣明論方中

黃帝素問宣明論方卷之四

河間劉守真撰集

新安吳勉學校

熱論

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也因熱稍愈猶未盡除不戒飲食勞動情慾擾亂柰脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟者皆熱

夫熱病者傷寒之類也人之傷於寒則爲病熱寒毒

藏於肌膚陽氣不行散發而內爲怫結故傷寒者
反病爲熱熱雖甚不死柰巨陽爲首巨陽者諸陽
之屬也

諸陽爲熱以氣諸陰爲寒以血熱病已愈其有復作
謂病已衰而熱有作所藏因其穀氣相薄兩熱相
合故有所遺緣熱也雖邪氣而不盡遺熱在故當
復作

五藏俱熱者皆視之肝熱在頰先赤心熱顏先赤脾
熱鼻先赤肺熱右頰先赤腎熱順先赤肝熱者小
便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂驚脇滿手足躁而

不得安卧心熱者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛
煩悶善嘔頭痛面赤無汗脾熱者頭重頰痛煩心
顏青欲吐身熱熱爭則腰痛不可仰腹滿泄兩頰
痛肺熱者淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱
爭則喘咳痛走胸背不得大息頭痛不堪汗出而
寒腎熱者腰痛脔痠苦渴數飲食熱熱爭則項痛
而強筋寒且痠足下熱不欲言 經曰汗出脉躁
盛一死脉不與汗相應其病二死狂言失志者三
死皆是怫鬱結不能解散以致危殆

素問諸熱瘥暴瘖胃昧躁擾狂言罵詈驚駭肘腫

痰痰氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也

夫腎水直陰本虚心火狂陽積熱以甚以致風熱壅
滯頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脉拘倦胸膈
痞滿時或痛悶或鼻塞熱衄口舌生瘡咽喉不利
牙齒疳蝕或徧身生瘡癰疥或睡語咬牙驚惕虛
汗或健妄心忪煩燥多腫或大小便澁滯或煩熱
腹滿或酒過積毒勞役過度中外一切勞損神狂
氣心志不寧口苦咽乾飲食減少變生風熱諸病
虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人或脾腎經虛
風熱燥鬱色黑齒宣身瘦焦痿或熱中煩滿飢不

飲食或癉或消中善食而瘦或消渴多虛頭面腫
小便數或服甘辛熱藥過度變成三消止則消涸
中則消中下則消腎小便白膏也

神芎丸 治一切熱證常服保養除痰飲消酒食消

頭目利咽膈能令徧身結滯宣通氣利而愈神強
體健耐傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重
痛小兒積熱驚風潮搐藏用丸亦曰顯仁丸加黃
連薄荷川芎各半兩名曰神芎丸

大黃

黃芩

各二兩

牽牛

滑石

四兩

右爲細末滴水爲丸如小豆大溫水下十九至

十五丸每服加十九日三服冷水下亦得或煉
密丸愈佳或久病熱鬱無問瘦悴老弱并一切
證可下者始自十九丸每服加十九丸以利爲度如
常服此藥但除腸垢積滯不傷和氣推陳致新
得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損頗遂
病人心意或熱甚必須急下者便服四五十丸
未利再服以意消息三五歲孩兒丸如麻子大
凡此一法此藥至善常服二三十丸不利藏府
但有益無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病
微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物

自下也此方除藏府滑泄者或重寒脉遲者或
婦人經病產後血下不止者及孕婦等則不宜
服除此以外一切風熱雜病悶壅塞神氣不和
或平人保養常服自顯其功若以効驗觀其藥
味則非明本草造化之理者不可得而知其然
也猶孔子讚易道明顯應化萬仁之善而不見
其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用因以云藏
用九亦其義也兼以世詛之久矣而反不喜此
等妙方不肯服之每有久獲大効而誠懇求其
方不得已而授之既見其方反生疑懼不復用

焉亦有效而志信求其方務以廣傳救疾因而
衆議百端擬疑妄生謗說使致俗醫皆畏之致
道不能神但有妨病者後之君子但行其藥明
顯諸人勿示其方而密藏諸用耳或以一法加
黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目昏眩者
愈佳

柴胡飲子

治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表
半在裏出人進退無和即寒熱往來陰陽相勝也
畜熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并畜於裏脉道
不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也

及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下

後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾
產後經病

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥 各半兩

右爲末每服抄三錢水一盞生薑三片煎至七

分溫服日三服病熱甚者加減之

崔宣武柴胡飲子

加半夏 五味子

桔梗 各三錢

劉庭瑞柴胡飲子

與前分用不同故以錄之

柴胡

甘草二兩 黃芩

當歸

芍藥

大黃

各一兩

人參

半兩

半夏

半兩

右爲大勞熱病五七錢以利爲度未利更加使
病不再發也

木香萬安丸 治一切風熱怫鬱氣血壅滯頭目昏

眩鼻塞耳鳴筋脉拘倦肢體焦痿咽嗑不利胸膈
痞塞腹脇痛悶腸胃燥澁淋瀝不通腰脚重痛疝
痕急結疰癖堅積腸滯胃滿久不了絕走注疼痛
瘡風癰病濕病腹脹水腫

木香

棟桂

甘遂

各一

牽牛

二兩

大戟

半兩

大黃

紅皮

檳榔

各一

皂角

二兩要得肥好者洗淨水三盞煮三二沸
取出槌碎揉取汁再煮成膏膏下密熬二

沸便取出半夏

蜜各一兩

右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生薑湯下
小兒丸如麻子大水腫癰病諸積快利為度

玉芝徐老丸 治一切風壅消痰利膈胸脇痞悶痰

飲食調五味

徐老緩慢遲老

天南星

乾薑

各半兩

黃柏

一兩半

牽牛

四兩

半夏

白礬

大黃

各一兩

蛤粉

二兩

右為末滴水和丸如小豆大每服十丸至二十

丸溫水下食後日三服常服順氣調血令人徐

老或已衰大便結者除腸垢積物可漸加至三

五十九孕婦滑泄病忌服滑泄為牽牛大黃孕
婦為南星半夏

消痞丸 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿

嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢體焦

疴眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳

血衄血下為大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶痺

熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

黃連 乾葛各一兩 黃芩 大黃 黃蘗

梔子 薄荷 藿香 厚朴

茴香炒各半兩 木香 辣桂各一分 青黛一兩研

牽牛 二兩

右爲細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下
溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本
自利者去大黃牽牛忌發熱諸物

和中丸 治口燥舌乾咽噎不利胸脇痞滿心腹痛

悶小便赤澀大便秘滯風氣拂鬱頭目昏眩筋脉
拘急肢體疼痛一切風壅常服寬膈美食消痰止

逆

牽牛 一兩

官桂 一分

大黃

紅皮

黃芩

茴香 各半

木香 一分

滑石 二兩

右爲末滴水丸如小豆大每服二十九煎半薑湯下溫水亦得日三服

崔宣武和中丸

大黃一兩 茴香炒 外七味同

龍腦丸 治大小人一切蘊積熱毒氣不散及失瘡

龍腦

朱砂

鵬砂

牛黃

各等分

右爲末鎔黃蠟爲丸如米粒大每服三五丸甘草人參湯下不計時候

大金花丸

治中外諸

汗咬牙睡語驚悸溺血

淋瀝咳衄血瘦弱

管萊肺痿喘嗽去大

○又自各既濟解化丸○又名既濟解化丸

大梔子

黃芩

黃芩

大黃

各圭

右爲末滴水丸如小豆大每服三二十九粒新汲水下自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三五丸

龍腦丸

治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋

惕

志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤動

胸高痞塞咽嗑不利腸胃燥甚小便溺澀筋脉拘

奇

奇癇急也重也

肢體痿弱暗風癇病小兒急慢驚風當

服宜通血氣調順陰陽病無再作

當歸 焙

龍膽草

大梔子

黃連

黃芩

黃芩

各一兩

大黃

薑黃

青黛

各半兩

木香

一分

麝香

半錢

右為末煉密和丸知小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十丸忌寒熱諸物兼服防風通

聖散

軟金丸

治一切熱疾常服潤飢膚素老諸熱證皆

可服

大黃

牽牛

皂角

各一兩

三朴

半兩

白湯

右為末滴水和丸如桐子大每服三十丸白湯