

农业生产知識

兽医

中兽医偏方百則

ZHONG-SHOUYI PIANFANG BAI ZE

河北省农林厅中兽医进修班編

9.308

432

C.1

农业出版社

前 言

在偉大的社会主义建設总路綫的光輝照耀下，掀起了农業生产的高潮，隨着帶來了畜牧業的大發展、大跃进。

我們为了支持农牧業大跃进，从我班第六期學員中搜集了民間流行的偏方一百余則，这些偏方葯物簡單，容易搜集，效果良好，价錢便宜，来自民間，便于群众应用和掌握。为适应农村需要，把这些群众經驗偏方排印出来，供給农業战綫上的兽医工作者研究試用。

但是，搜集的不够普遍，且倉促編成，遺漏錯誤的地方必然很多，希望試用的同志們，把試用結果和你处有何更好偏方，一并告訴我們，来充实丰富这个小册子，讓它在現代科学的基础上得到更大的提高，使它成为促进畜牧業生产大跃进的有力武器。

河北省农林厅中兽医进修班

目 录

前言

一 内科病	1
一、中暑症 二方	1
二、黑汗風 三方	1
三、舌瘡 三方	2
四、伤水起臥 六方	2
五、結症 五方	3
六、脫肛 二方	4
七、肺热咳嗽 二方	4
八、咳嗽流鼻子 五方	5
九、肺癰 二方	5
二 外科病	6
一、創伤 六方	6
二、破伤風 三方	7
三 产科	8
一、胎衣不下 四方	8
二、下奶方 三方	8
三、产后子宮脫出 二方	9
四、产后受涼腹疼 二方	9
五、产后癰瘡 一方	9
六、猪难产 一方	10
七、小駒拉稀 一方	10
八、小畜臍袋風 二方	10
四 牛病	11
一、牛拉稀 四方	11
二、牛拉血 二方	11

三、牛肚脹 一方	12
四、牛冷痛 二方	13
五、牛百叶干 二方	13
六、牛熱喘 三方	13
五 猪病	14
一、猪病預防法 三方	14
二、猪拉稀 五方	14
三、猪風症 一方	15
四、猪咳嗽 二方	15
五、小猪白痢 二方	15
六、猪脫肛 一方	16
七、产后癱瘓 二方	16
六 杂症	16
一、肚內有虫 二方	16
二、毒物中毒 五方	17
三、牛吃針或鉄片 二方	17
四、虫入耳	18

一 內科病

一、中暑症

中暑症又名热痛，馬騾在夏天工作过劳的时候很容易發生。症狀是頓然發作，精神沉郁，头頸向前伸，呼吸促迫，口色赤紅，靜脉管努張起来，步行不穩，表現煩热不安的狀態。

方1. 牛舌头草根半斤、鷄子四个、香油一兩、蜂蜜四兩。

把牛舌草根搗爛，加入鷄子、香油、蜂蜜用酸菜湯調均灌服。牛舌头草又名土大黄，系蓼科一年生宿根草，我省各地村边溪畔野生很多。（井陘县谷献書）

2. 鷄蛋五至八个，西瓜 八至十二斤。鷄子清黄全用，西瓜去皮子用穰，共入容器內混合，系井內涼透，灌服。（冀县周步云）

二、黑汗风

黑汗風又名热射病，暑热炎天長时期在太陽光下曝晒，过热过劳或在火車輪船运输拥挤，阻碍体温放散，都能引起本病。病狀是：患畜突然大汗淋，步行不穩，精神苦悶，呼吸促迫，体温升高，心悸亢进，口色紫赤，舌面干燥，失神振战，瞳孔先散大后縮小，如不及时治疗，常在短時間內死亡。

方1. 六一散 滑石 六兩、甘草一兩。共为細末，每服 四兩，涼开水調灌。如調灌时再加西瓜汁五至十斤，白糖四至八兩，效果更好。（冀县周步云）

2. 冷浸法 把患畜放井边清凉处，用毛巾或棉布等蘸水，在头颈部冷浸，并不断用新井水浇灌，同时洗擦口舌及四蹄，以喘定为止。（冀县周步云）

3. 旧布袜子汗汁二大碗内服，结合针刺尾尖穴及冷浸头部，同时用细干土或小灰摸擦全身，并用热尿泥糊在肚脐上。（鸡泽县蔡安吉）

三、舌 瘡

舌瘡也叫爛舌头或口瘡，是由于吃粗硬或有芒刺的食物，或霉爛有毒的飼草，舌部受到刺激，再加上心胃有热，就發生本病了。也有因牙齒不整齐，咬伤舌头，引起本病的。

症狀 口內發紅、有臭气，舌下有紫紅或紫黑色爛坑，疼痛流涎，不吃草，精神不好。

方1. 蘆薈兩、礪砂錢、冰片錢。共为細末吹患处。（景县李文治）

2. 鍋底黑（百草霜）研細上患处。（饒陽县張志英）

3. 旧油帽子三个，燒灰存性，香油調上患处。（峯峯矿区吝志和）

四、伤水起臥

牲口吃了过凉的飼料，或驟飲冷水过多，以及連天陰雨，过受寒冷，都容易發这病。

症狀 尾巴搖动，回头看腹，間歇性起臥，腸音旺盛，蹲腰臥地，病重的臥地打滾，渾身打战，耳鼻俱冷，食欲停止，有时排粪，少而紧小。

方1. 小茴香四兩、白酒四兩。茴香炒为末，加白酒内服。

2. 大葱三根、胡椒六錢、炒鹽兩半、白酒五兩，为末，开水冲加酒內服。

3. 干馬糞一握，上蓋人髮一把，点燃馬糞用烟熏患馬鼻孔，到鼻內出清水，为有效。（井陘县谷猷書）

4. 胡椒五錢、白酒半斤，研末和酒內服。（圍場程守信）

5. 小茴香兩、生姜二兩、紅糖半斤、白酒四兩，把茴香为末，生姜切碎，共混合內服。（灤平县李鴻福）

6. 大葱三支、生姜二兩、酒四兩。为細末加酒灌服，同时用酒一兩灌耳內。

五、結 症

結症也叫草結或便秘症，原因是吃了不易消化的食物或吃饱后馬上过度使役，或使役后驟食过量的草料，食物停止在腸里，都容易發生本病。

症狀 是起臥不安、脣部大、糞球干小或排糞停止，尿量少色黃濃，走路时尾巴直伸后方，回头看腹，或作排糞委式，严重时臥地滾轉，腸音减少或消失，这样多是大腸的結症。有时吃草后数小时或正吃草时，驟然發生据烈肚疼，起臥不安，口色發黃，呼吸脉象都增快这样都是小腸結症。

方1. 土狗（螻蛄）十个 炮干，大將軍（公的屎各郎）六个 炮干，鴿子糞四兩、大麻油一斤。上三味葯为末，油調內服。（高陽县張国均）

2. 大麻油一斤、醋一斤、皂角三个、公猪糞三塊，皂角为末混合他葯水調內服。

3. 鷄金內臟一个切碎，番泄叶二兩，先用开水冲泄叶，候温，加鷄內臟內服。（清河县姜英材）

4. 下粪猪(串地林鼯鼠)一个、猪油半斤。下粪猪置瓦上慢火烤干为末，和猪油一齐灌服。(平乡县楊長有)

5. 母猪粪四兩、川軍二兩、皂角炭一兩、碱面四兩、醋半斤、花生油半斤。混合加水煎数沸，取汁服。(安国县吳卜謙)

六、脫 肛

使役过力，臟冷气虛或大便干，努勁过度，都可引起肛門脫出症。

症狀 是肛門翻出，紅腫、潰爛、結痂，腸头內往往停有硬粪。

方1. 手术及葯物并用法：

(1) 花椒二錢、艾叶一把、食鹽一兩、葱三支熬水，洗滌用。

(2) 硫磺一兩、甘草五錢。共入砂鍋內炒半小时，去甘草取出硫磺研碎，入米湯內灌服。

作法 先用处方(1)葯水把脫肛部洗淨，并把腸硬粪取出，用剪子把脫出部丰肉慢慢剪口，用手扯去，洗淨血污，用手慢慢把脫出部送回，而后用炙热的鞋底在肛門部溫搨二三十分钟，而后灌服处方二的葯。

2. 水蛭(馬龟)一至二兩。用沙土炒黃为細末，如上法把脫出部分洗淨去丰肉后，撒上水蛭末，把脫出部送回，而后用热鞋底搨之。(平乡县楊長有)

七、肺热咳嗽

由于剧烈运动，吸入多量塵埃和有刺激性气体，可以引起本病。

症狀 是精神沉衰，时有短节咳嗽，身上热，口張舌伸，口色紅，有时口鼻内有粘液。

方1. 白萝卜二个(开花时的取汁用)，莼菜一把(取汁用)、蜜二兩。上二汁混合入蜂蜜內服。

2. 瓜蒌二兩、蜂蜜二兩、米泔水一大碗。用蜜炒蒌瓜，米泔水調服。

八、咳嗽流鼻子

因吸入有刺激性的气体，如过冷、过热、过干并混有塵埃的空气，濃烟或感冒等，都可引起本病。

症狀 咳嗽、精神不好，流稀鼻子，食欲减少。

方1. 江米(糯米)五兩、桔梗四兩、豆腐四斤，混合加水煮，連湯帶药一起服下，服后鼻子显多，以后逐次减少。如不好再服一次。(新乐县陈春海)

2. 豆腐二斤、銀朱三錢，把豆腐搗爛入銀朱，混合內服。
(鷄澤县陈潤泉)

3. 豆腐半斤、白矾二兩，共入鍋中加水煮开，白矾自溶化，晾到微温灌服。如有咳嗽加血余(人头髮炭)一兩。(灵寿县李老序)

4. 刺蝟皮一个焙黄，松洛碗(松塔)十二兩焙黄，香油十二兩、鷄子清十个，为末开水冲內服。

5. 枯矾半斤、石羔二兩、甘草三兩、鷄子清十二个，前三味为末，入鷄子清加水內服。(無極县席文明)

九、肺 痛

肺痛又叫作肺膿腫，系肺部的腫脹化膿，多由肺热咳嗽

及馬腺疫等轉成。

症狀 頓發大熱，呼吸困難，頻發咳嗽，由鼻孔流出粘稠膿樣鼻子，到后期肺部化膿，肺臟有數處的化膿空洞。

方1. 甜葶力子兩半、微炒、車前二兩微炒、甘草四兩、蜂蜜四兩、甜梨二個，前三味為末，入搗爛甜梨蜂蜜水沖內服。

2. 谷子二斤帶皮、童便四大碗，用童便浸谷 24 小時內服。
(清河县姜英才)

二 外科病

一、創 傷

創傷種類很多，一般多是由于鞍套磨破、銹傷、車撞等。
症狀是皮破血出，紅腫或潰爛生膿等。

在創傷的療法上，應注意(1)先把創面邊緣上的毛剪淨，並將髒物洗去；(2)已有膿的將膿排淨，剪去壞肉，注意保護創口；(3)出血的創傷，首先止住血。

方1. 食鹽（即吃的鹽）一至二分，開水一百分，化開洗創口用。

2. 枯礬（將白礬溶化後焙干），為細末撒布在出血的創口上，止血用。

3. 治鞍傷藥 黃蜂房（炒黃）約二兩，枯礬二兩，將上二味，共為細末，撒于患處，每天一次或用廢電池內的黑粉，曬干為末，也有很好的效果。

4. 象皮散 有止血、防止潰爛、生肌長肉的作用。

象皮一兩、炮姜炭一兩，枯礬七錢。先將象皮放在炒子內入

鍋炒黃，然後共為細面。

5. 百花散 治療各種傷口出血，及火燙傷，有生肌防腐止癢作用。

沒藥炙二兩，陳石灰四兩（研細過羅）。

制法 在陰曆5月間，採各種花每樣少許，樣數越多越好，與上藥混合搞成泥涼候干，再研細末過羅備用。（邯鄲市峯峯礦區西王看村索洪昌）

6. 鞍傷久不長毛 刺蝟皮一個鍛黃、血余炭一兩、川斷一兩炙、先用花椒、艾葉煎湯洗淨患處，次用黑油將上方的藥面調均，抹于患處，鞍破傷好後，再用陳豬脂抹皮膚，長全毛為度。

二、破傷風

由於破傷風桿菌自傷口侵入體內，如破傷、閹割、產後初生小駒臍傷等都是染患破傷風的原因。

症狀是鼻孔張開、牙關緊閉、口流涎沫、想吃不能食、欲喝不能飲、眼睛發呆、大眼角露有瘀肉、皮緊毛焦、肚腹緊縮、糞便干燥。耳直不活動，四肢岔開、頸直腰板，尾不搖擺。

方1. 虫退散 虫退四十九个、楊樹須（楊樹的托序）四十九个，上藥用黃酒炒焦為細末，黃酒一斤熬開沖灌。三日二服可連服4次，治豬破傷風，分量減為虫退十四个，楊樹須十四个，黃酒四兩，牲畜服藥後，身上必須搭上被子見汗。（短期班三組趙宗義方）

2. 四皮散 狗皮、貓皮、豬皮、羊皮，將上四皮等分，燒炭為末，混在一起，每服二兩，引用黃酒半斤開水沖灌入，藥後牽入室內見汗，同時結合針治百會穴，伏兔穴、風門穴、通關血。（無極縣王村席文明）

3. 頭髮炭一兩、綫麻炭三兩、魚鱉(炒干)三兩,共為細末,黃酒沖灌。

三 产 科

一、胎衣不下

胎衣不下,以初胎的牲畜較多,一般馬三天,牛五天,豬兩天為正常,如超過這些天數,就算胎衣不下,在鄉村中,一時找不到醫生,可試用下法:

方1. 葫蘿卜纓(葫蘿卜的叶子)不拘量,盡量喂母羊,干的鮮的都可以。(蠡縣李國輝)

2. 用盛熱開水的盆,放在靠近陰部地方并把母牛或羊後身用被子蓋嚴,叫熱汽熏溫陰部,一二次後胎衣即下。(巨鹿縣董福嶺)

3. 車前子四兩、白酒六兩、紅糖三兩,共入碗內,點着火,等火自熄後,用開水沖溫服。(柏鄉縣賈鳳臣)

4. 破雨傘(竹制油紙的)一把。燒灰存性為末,水沖服,每服八錢至一兩。(南宮縣劉漫海)

二、下奶方

產後乳少或無乳,母畜營養不好的。

方1. 芝麻一斤。半斤炒為末,半斤生為末,混水沖溫服。
(隆堯縣陳禹鈞)

2. 小米(谷米)二斤,紅糖半斤,小米破碎熬成粥,加紅糖,分二三次使自食之。(短期班姜英才)

3. 小米斤，王不留行三錢，二藥入鍋內加水熬成粥，溫后使自食之。(行唐縣趙實卿)

三、产后子宮脫出

母畜产后子宮脫出在陰門外面，狀如气囊，是鮮紅紫色，日久的發為紫黑色。

方1. 烏龟头一个。為細末，先用百分之四的白矾水把脫出子宮洗淨，然后把龟头末撒布脫出子宮上，用兩手慢慢的把脫出子宮送回，再用酒糟一斗蒸熱入布囊中，溫熨之。(景縣李文治)

2. 桃仁八錢、冬葵子四兩、當歸兩、川芎八錢。共為末，黃酒送下。(景縣李文治)

四、产后受涼腹痛

产后受涼或飲涼水太多，以致肚子疼，起臥打滾，不吃不喝，腹內腸鳴，俗話說，产前無涼，产后無熱，所以應用溫熱方。

方1. 柳楊細水根四兩、莎草根四兩、黑豆半斤、紅糖四兩，柳楊水根要陽面的同莎草根洗淨切短，合入黑豆水煎去渣加紅糖溫服。(鹽山縣崔壽泉)

2. 紫河車(胎包)四兩、生姜二兩、黑糖二兩，水煎紫河車5分鐘取出，加生姜黑糖，再煎5分鐘，候溫灌下(紫河車本畜的它畜的都可以)。(曲周縣李恩柴)

五、产后癱瘓

产后腰和后肢麻痺，行動起立不便，或全不能行動，以豬

为最多。

方1. 狗骨头炭兩、石决明五錢。共为細末，开水冲灌，結合火針百会穴，喂与軟食，圈棚要干燥温和，效果良好(上为猪用量，大牲畜照加)。(遵化县刘殿卿)

六、猪难产

猪产仔时發生困难，臥地不起。

方1. 榆白皮三兩、麦麸皮一把。把榆白皮煎湯，放入麦麸后，令猪自食之。(永年县徐振申)

七、小駒拉稀

小駒或犢生下一月內拉稀，不爱吃奶。

方1. 柿餅子蒂七个、黄酒五錢至兩。

柿餅蒂焙干为面，入黄酒，加水冲服。(張北李瑞森)

八、小畜臍袋风

小駒或小犢生出后，由于不潔淨，由臍袋进入賊風，三至六天后，小畜全身抽筋，耳直尾紧，四肢强直，行走不便。

方1. 南星、防風、白附子三味等分为末，全蝎三个为細末。先取旧鞋兩只，开水煮沸，取出一只把南星、防風、白附子末撒上层，在臍部溫熨之，涼后再換一只，如此三溫三熨后，再把全蝎末灌服。

2. 鷄屎(黑白相間的)砂鍋焙干为末，把上药撒臍上，并用热鞋底溫熨之。

四 牛 病

一、牛拉稀

这种病大多是吃了不易消化的飼料，或在工作后喝了过多的冷水，或因受寒冷感冒而引起的。

症狀 是反芻减少或停止，精神不好，腸音高，排糞稀薄或是水样，也有下痢和便干交互的，体温不高，或稍高，口色苍白或淡黄色。

方1. 桑树皮半斤炒黄，柿餅子半斤切碎，桑树皮为末加柿餅，水調內服結合針刺分水，尾尖二穴。

2. 破鞋一双(燒炭)，桑树老皮一斤炒黄，紅高一斤炒炭。共为末加水冲服。

3. 白面四兩炒黑、灶心土二兩，混合用蘿卜熬湯冲开温服。

4. 椿树叶一把，醋一斤、馬蜂窩一个油炸，棉油四兩，用油炸馬蜂窩为末，共同混合內服。(吳桥县楊蘊秀)

二、牛拉血

牛大便帶血，不爱吃喝、消瘦、毛粗，反芻少、鼻鏡干、精神不好，好伏臥着。

方1. 苦参二兩炒黑、槐花二兩半微炒、黃柏一兩酒炒、白矾二兩，混合共为末开水冲灌服。

如便血紫黑色，加当归一兩。(圍場县程守信)

2. 槐花三兩、椿白皮半斤、蜂蜜六兩，共为末开水冲入蜂蜜温灌下。(鷄澤蔡安吉)

三、牛肚脹

吃饱使役过紧，没有反芻时间，或吃生料过多及草料發霉等都可發生肚脹。

症狀 是牛的腹部脹大，尤其左臍部突出有时超过背梁，患畜精神苦悶，煩躁不安，起臥回头看腹，鼻鏡干燥反芻停止。

方1. 烟叶子五錢至一兩，棉子油六兩至一斤、血余(頭髮炭)五錢，烟叶子、血余为末，油調內服。(無極县安双順)

2. 百草霜(鍋底黑烟子)二兩、黍子一兩，猪油四兩，水調灌服。(陈德)

3. 棉子油一斤、蜂房一斤。蜂房炒焦，为末加油及人尿兩次灌服。(谷献書)

4. 大黃四兩、碱面二兩、芒硝六兩、麻油一斤，共为末混合加水內服。(建平县盖秀發)

5. 棉油十二兩(熬开)馬蜂窩一个(炒黃)、黍子炸花四兩，血余(頭髮炒焦物)一兩，为末加油內服，治生料肚脹久不愈。

6. 棉油半斤、碱面三兩，棉油熬开去沫，候微溫加碱面灌服。

7. 紅檉柳(紅莉)一兩、紅高粱炸花一斤、椿樹白皮一斤，醋半斤。前三味水煎后去檉柳及椿皮留高粱加醋一次頓服，治牛慢脹。(鹽山县崔寿泉)

8. 苏打粉一兩、棉油四兩，上药混合加适量水，攪均內服。(刘漫海)

9. 活青蛙一个，整个投患牛口內吞服治牛热性鼓气。(張浩然)

10. 醋三斤、烟叶半斤、水煎去烟叶灌服。(涿县徐月勤)

11. 牙皂半斤、碱面兩半、棉油十二兩，油熬開去味，牙皂為末同混合灌服。（荻鹿縣賈尊光）

四、牛冷瘡

牛受寒冷肚疼，症狀是一陣一陣的發作，發作的時候起臥不安，蹬後腿腹內腸鳴，回頭看腹部，有時前腿向前伸，後腿向後伸，背拱起，體溫不高，腹圍也不見大。

方1. 艾葉二把、蜂蜜四兩，把艾葉熬水沖蜜，候溫灌下，約一小時就好了。

2. 大蔥二兩切碎、元酒四兩，大蔥開水沖，候溫加酒灌服，結合針刺分水，尾尖穴。

五、牛百葉干

牛百葉干就是牛的第三胃食滯病，主要原因是飼養使役不當，如過食及使役太重，有時因牙齒不整齊，咀嚼不完全，也可以引起本病。

症狀 精神不好，吃草反芻慢慢減少，嚴重時完全停止，口中有臭味，出長氣，毛炸，左膻高起，用手壓迫左膻第一胃，感覺堅硬，鼻鏡乾燥，口粘膜紅紫色。

方1. 小麻子一升、芒硝四兩，把麻子搗爛加入芒硝，開水沖灌。（李錫彬）

2. 小麻子一斤、榆皮面十二兩，麻子微炒搗爛同榆皮面混合加溫調灌，可連服兩次。（鷄澤縣蔡安吉）

六、牛熱喘

使役過力，勞傷心肺，氣大喘粗，頭低耳搭，飲食減少，或