

金鏡內臺方議卷之九

建安許宏集

古吳程永培校

甘草附子湯

八十

治風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此方主之

附子

一枚炮為君

甘草

炙為佐

白朮

一兩為使

桂枝

一兩為臣

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升
日三服初服得微汗則解能汗出者復煩服
五合忌一升多者宜服六七合爲妙

湯議

議曰風則衛傷濕流骨節風濕相搏兩邪亂經故
骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇風勝則衛
氣不固汗出短氣惡風不欲去衣爲風在表也濕
勝則水氣不行小便不利或身微腫爲濕氣內搏

也故用附子爲君除濕祛風溫經散寒桂枝爲臣祛風固衛白朮去濕爲使甘草爲佐而輔諸藥疎風去寒濕之方也

甘草乾薑湯

八十
二

治誤汗煩躁吐逆而厥者主之

甘草

四兩炙
爲君

乾薑

二兩炮
爲臣

右二味以水三升煮取升半去渣溫服

湯議

議曰脉浮自汗出惡寒者爲中風今此又兼小便數者心煩脚攣急爲陰陽之氣虛不可發汗反與桂枝湯悞汗之得之便厥咽中乾煩躁上逆也此乃不可汗而悞攻其表營衛之氣虛傷所致也故與甘草爲君乾薑爲臣二者之辛甘合之以復陽氣也

芍藥甘草湯

八十
三

治悞汗傷血則厥逆脚攣急主之

白芍

四兩
爲君

甘草

四兩炙
爲臣佐

右二味以水四升煮取二升分溫服

湯議

議曰大汗則傷血若陰虛之人汗之則悞也必煩躁吐逆四肢攣急此乃不當汗者汗之則陰虛血少所致也故與白芍爲君而補營血炙甘草爲臣合而用之以補陰氣也

甘草湯

八十
四

治少陰病二三日咽痛者主之

甘草

二兩

右一味以水三升煮取升半去渣溫服

湯議

議曰少陰之脉循咽而止寒熱相搏不散而成咽痛故與甘草一味以泄咽膈之氣也

炙甘草湯

八十
五

治傷寒脉結代心動悸者主之

甘草

炙四兩

生薑

桂枝

麻子仁

麥冬

各三

兩人參

阿膠

各二兩

生地汁

合六

大棗

十二枚

右九味以水八升酒七升同煎取五升去滓

內膠烱溫服

湯議

議曰脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也又來藹藹如車蓋者名曰陽結也又脉累累如

循長竿者名曰陰結也此皆仲景所言結脉爲邪
氣留結其氣虛散陰陽鬱結不能相榮也脉來動
而中止不能自還因而復動名曰代結也此真氣
衰極脉不能自還因而陽呼吸相引復動心中悸
動因脉結代故知爲真陰氣虛少陽氣虛敗故與
炙甘草爲君人參大棗爲臣以補元氣之不足者
以桂枝生薑之辛而益正氣爲佐以麥門冬阿膠
麻子仁地黃之甘潤經益血而補其陰爲使以清

酒爲引而能通以復脉者也

芍藥甘草附子湯

八十
六

治發汗病不解反惡寒者虛故也此方主之

白芍

君

甘草

臣炙各
三兩

附子

佐使一
枚炮

右三味以水五升煮取二升去渣分溫服

湯議

議曰發汗後病解則不惡寒病不解表實亦不惡寒今此大汗出又反惡寒其脉微弱者爲榮衛虛

者也若非大汗出而又惡寒其脉沉微無熱症者不可服也

茯苓甘草湯

八十
七

治傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者此方主之

茯苓

君

桂枝

各二
兩

甘草

一
兩

生薑

三
兩

右四味以水四升煮取二升去渣分溫服

湯議

議曰傷寒汗出不惡風渴而飲水者屬人參白虎湯若汗出而渴脉浮小便不利者屬五苓散今此汗出而渴者爲邪不傳裡但在表而表虛也故與茯苓爲君而益津和中甘草爲臣輔之以桂枝爲佐生薑爲使二者之辛而固衛氣者也

黃連湯

八十

治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者此方主之

黃連 甘草 乾薑 桂枝 各三兩 人參

半夏 各三兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去渣溫服

此即半夏瀉心湯加桂枝也

湯議

議曰濕家下後舌上加胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裡而為上熱下寒也此傷寒邪氣傳裡而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰

不得升爲下寒故腹中痛陽不得降爲上熱故欲嘔吐也故與半夏瀉心湯中加桂枝升降陰陽之氣也爲下痛故去黃芩經曰上熱者泄之以苦下寒者散之以辛故用黃連爲君以治上熱乾薑桂枝半夏以散下寒爲臣人參大棗甘草之甘以益胃而緩其中也

黃連阿膠湯

九十

治少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者

主之

黃連

四兩

阿膠

三兩

芍藥

二兩

黃芩

一兩

鷄子黃

二兩

右以水先煮三物減半去渣內膠烱盡小冷

內鷄子黃攪令相得溫服

湯議

議曰少陰三日以上心中煩不得卧者乃寒極熱
變也熱煩于內而然故用黃連爲君黃芩爲臣以
除內熱而陽有餘以阿膠鷄子黃之甘以補陰不

足爲佐芍藥之酸以斂陰氣而泄邪熱爲使也

乾薑黃連人參湯

九
十

治傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下
若食入口卽吐者主之

乾薑 黃芩 黃連 人參

各三
兩

右四味以水六升煮取三升去渣溫服

湯議

議曰傷寒本自寒下其人下虛也醫復吐下之寒

格更逆損傷正氣內爲格拒則陰陽不通食入口
卽吐也寒格更逆吐下者是醫不知又復吐下則
重虛而死也故用乾薑爲君以散逆氣而調其陽
辛以散之也以黃連爲臣而和其陰黃芩爲佐以
通寒格苦以泄之也以人參爲使而和其中補益
真氣甘以緩之也

金鏡內臺方議卷之九

金鏡內臺方議卷之十

建安許宏集

古吳程永培校

桃花湯

九十

治少陰病下利便膿血者此方主之

又少陰病二三日腹痛小便不利下利不止便

膿血者主之

赤石脂

一斤半

乾薑

兩粳米