

丹溪心法附餘卷十九

辛集

虛損門

發熱八十四

附白月中煩熱

虛熱

虛煩不

丹溪心法

○陰虛發熱證難治 戴云凡脈數而無力者便是陰虛也

四物湯加炒黃芩龜板 氣虛加人參黃芪黃芩白朮

四物湯加炒栢是降火補陰 妙劑甚者必加龜板 喫酒入

發熱難治 不飲酒人因酒 發熱者亦難治 一男子年二十

三歲因酒發熱用青黛炭薑 入姜汁每日數匙入口中三日

而愈 陽虛發熱補中益氣湯 手足心熱屬熱鬱用火鬱湯

傷寒家熱當用表散 發熱柴胡惡寒蒼朮虛人用蒼朮恐

燥發熱惡風人壯氣實者且先解表發熱惡寒亦宜解表
入方

蒼木半兩 片苓三升 甘草一升半

右為末湯浸炊餅丸服

治手心發熱

山梔 香附 或加蒼朮 白芷

半夏生月 川芎

右為末神麴糊丸服

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥一兩二升五分 香附一兩一 蒼朮半兩

炒片苓二升 甘草一升

右為末炊餅丸

溫痰發熱

炒片苓

炒黃連

半兩

香附

二兩半

蒼朮

二兩

右為末用瓜蒌穰丸

退勞熱食積痰

上甲

下甲

側柏

瓜蒌子

半夏

黃連

黃芩

炒栢

右為末炊餅為丸

○胸中煩熱須用梔子仁

有實熱而煩燥者亦用梔子仁

有虛熱而煩燥者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹白芍藥 若脈

實數有實熱者

神功丸

○虛熱用黃芪 虛汗亦然又云肌熱及去痰者須用黃芪肌
熱亦用黃芪 如肥白人發熱宜人參黃芪當歸芍藥浮小麥
炒止虛汗同

補中益氣湯治虛中有熱或肌表之熱

○治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯

火鬱湯

升麻

葛根

柴胡

芍藥

防風

甘草各五分

右剉每五錢入蓮鬚葱白三寸煎稍熱服不拘時

神芎丸 見火類

附諸賢論

王節齋曰世間發熱證類傷寒者數種治各不同外感內傷乃大關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之日即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當以變矣如春溫之月則當愛以辛涼之藥如夏暑之月即當變以甘苦寒之藥故云冬傷寒不即病至春變溫至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之非其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫

焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒
疫却在溫暖之時時本溫暖而寒反為病此亦天時不正陰
氣反逆用藥不可寒涼又有一種天行溫疫熱病多發於春
夏之間沿門闔境相同者此天地之厲氣當隨時令恭運氣
而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒已上諸
證皆外感天地之邪者也若天飲食勞倦內傷元氣此則真
陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪等
甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足
者也又若勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變
為火矣是為陰虛火旺勞瘵之証故丹溪發陽有餘陰不足
之論用四物湯加黃柏知母付其陰而火自降此用血藥以

補血之不足也者。蓋氣補陰皆內傷證也。一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一。則因陽火之上升而滋其陰以降下之一。升一降迥然不同矣。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內傷。與傷寒大異。蓋寒傷形。寒邪客表有餘之証。故宜汗之。暑傷氣。元氣為熱所傷而耗散不足之証。故宜補之。東垣所謂清暑益氣者是也。又有因時暑熱而過食冷物以傷其內。或過取涼風以傷其外。此則非暑傷人。乃因暑而自致之之病。治宜辛熱解表。或辛溫理中之藥。却與傷寒治法相類者也。凡此數証外形相似而實有不同。治法多端而不可或謬。故必審其果為傷寒傷風及寒疫也。則用仲景法。果為溫病熱病及溫疫也。則用河間法。果為氣虛也。則用東垣法。

焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒
疫却在溫暖之時時本溫暖而寒反為病此亦天時不正陰
氣反逆用藥不可寒涼又有一種天行溫疫熱病多發於春
夏之間沿門闔境相同者此天地之戾氣當隨時令恭運氣
而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒已上諸
證皆外感天地之邪者也若天飲食勞倦內傷元氣此則真
陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪等
甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足
者也又若勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變
為火矣是為陰虛火旺勞瘵之証故丹溪發陽有餘陰不足
之論用四物湯加黃柏知母付其陰而火自降此用血藥以

補血之不足也者蓋氣補陰皆內傷證也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘之証故宜汗之暑傷氣元氣為熱所傷而耗散不足之証故宜補之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食冷物以傷其內或過取涼風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之之病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥却與傷寒治法相類者也凡此數証外形相似而實有不同治法多端而不可或謬故必審其果為傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果為溫病熱病及溫疫也則用河間法果為氣虛也則用東垣法

果為陰虛也則用丹溪法如是則庶無差悞以害人性命矣
今人但見發熱之証一皆認作傷寒外感率用汗藥以發其
表汗後不解又用表藥以涼其肌設是虛証豈不死哉間有
頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分或氣病而補
血或血病而補氣悞人多矣故外感之與內傷寒病之與熱
病氣虛之與血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病
必死矣可不畏哉可不謹哉予欲會此數證合為一書使界
眼判然而治法昭若以惠斯人而未遑也故略發其槩以為
後日張本云

附諸方

補中益氣湯按粹方治陽虛發熱久患虛勞

黃芪

甘草

各半斤

當歸身

二斤

人參

三斤

白朮

七斤半

柴胡

五斤

升麻

五斤

陳皮

七斤半

又方加白芍藥

紅花

黃柏

右剉每服一刀水二鍾煎至一鍾食前溫服

地仙散經驗方治骨蒸肌熱一切虛煩

地骨皮

防風

去芦各一刀

人參

雞蘇

甘草

各二斤半

右剉每服一刀生薑三片淡竹葉五片水二鍾煎至一盞去

滓通口服不拘時候

四白散拔萃方治男子妇人諸虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不

能動行

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮

各一各

半夏

白茯苓

人參

烏藥

甘草

白豆蔻仁

各五各

芍藥

一各半

檀香

沉香

各二各半

右判每服一刀生薑三片束一枚水一鍾半煎至七分食後

溫服

黃耆飲子濟生方治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸羸瘦
胸膈痞塞咳嗽痰多甚則吐血

黃耆蜜炙

各半各

當歸

去芦酒浸用

紫苑茸去土石斛去根

地骨皮去梗人參

桑白皮

鹿茸酒蒸

欵冬花

各一兩

附子炮去皮

半夏湯泡七次

甘草炙各半兩

右剉每服四升水一鍾姜七片枣一枚煎服此藥溫補葉衛
枯燥者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

○已上數方治陽虛氣虛發熱之劑

當歸黃芪湯 治虛火上攻頭目渾身胸背發熱

當歸酒浸一升

黃芪五升

右剉水一鍾煎至七分去渣食後溫服

子芩散 援萃方涼心肺解勞熱

黃芩一兩

白芍藥

子芩

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地黄各半兩

右剉每服一刃水二鍾竹葉一握小麥二十粒姜三片煎至一鍾去滓通口食後服

人參柴胡散按萃方治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜服

白茯苓去皮芍藥

人參去芦白朮

柴胡去芦當歸去节

半夏麴葛根

甘草炙各一刃

右以咀每服一刃水二鍾姜三片棗一枚煎至一盞去滓食後服

人參地骨皮散按萃方治臟中積冷榮中熱按之不足舉之有餘此乃陰不足陽有餘也

茯苓去皮五錢 知母

石膏各一兩 地骨皮

人參

柴胡去芦

生地黄

黃芪各一兩半

右剉每服二兩姜三片水二鍾煎至一鍾去滓通口不拘時服
人參黃芪散和劑方治諸虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心
煩熱口燥咽乾煩赤心怔日晡潮熱夜有盜汗胸脇不利減
食多渴咳嗽痰唾稠粘時有膿血

天門冬去心三十兩

半夏制

知母

桑白皮炒

赤芍藥

黃芪去芦

紫苑

甘草

各十五兩

白茯苓去皮 柴胡去芦

秦艽去土

生乾地黄

地骨皮各三兩 人參

桔梗各十兩

鱉甲去裙醋炙一兩

一方有生薑

右呖咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服不拘時

驚甲地黃湯濟生方治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室

枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡去芦

當歸酒浸

麥門冬去心 驚甲醋炙

石斛去根

白朮

茯苓去皮

熟地黃酒洗

秦艽去土各兩 官桂不見火 人參

甘草炙各半兩

右呖咀每服一兩生薑五片烏梅二箇水二鍾煎至一鍾溫服

人參散

醫方集成

治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多

盜汗四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黃芩下五錢

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

柴胡

甘草

當歸

半夏麵

葛根各一兩

右咬咀每服八錢生姜四片棗二枚水二鍾煎至八分去滓
溫服

知母散楊氏方治虛勞心肺有熱咳嗽唾膿血大能解勞除熱
調順榮衛

黃芪

二兩蜜炙

白芍藥

生薑黃

黃芩

麥門冬

去心人參去芦

白茯苓

去皮桔梗去芦

知母

各七錢半甘草五錢

右咬咀每服八錢水一鍾生姜二片小麥一撮竹葉一片煎
至八分食後溫服

柴胡梔子飲聖惠方治勞執等証