

秘傳眼科纂要卷下

嘉應州黃 嚴耐菴纂

上海秦之濟伯未校
古秦紫陽東臯程名成男振興重訂

二十四論暴疾風熱外障

論暴疾腫痛忽紛如肺受毒風宜急散酒調散用不徐徐方見肺臟一服定軒渠

技傳軒渠○久不散風毒攻入眼中居致使白仁浮且腫火燒天廓肺為開牛車

載笑自若氣瀉肺飲裁祛方見

天鏡云眼內忽然腫起痛甚難開者肺受七情鬱結毒風不散久則攻入眼中致

使白仁浮腫用葱湯洗之連細辛枝子川芎桑本嚴按此二方皆與前異用治

地桑皮赤芍荆芥薄荷川連細辛枝子川芎桑本嚴按此二方皆與前異用治

肺家積熱久則肺受七情鬱結毒風不散久則攻入眼中致

確黃是也但已曰肺受七情鬱結毒風不散久則攻入眼中致

風也其外風耶謂內生之風則所注瀉肺火也散目暴疾清其火火降而風自息用

藥本川芎則非矣蓋熱極生風風自熱生非風藥所能除酒調散則此風其內生之

也此等論症用藥決不可從故不遵用學者當依吾改耳

二十五論癢極難忍外障

晴癢極癢到苦難挨風邪乘肝虛襲肝臟上冲風廓烏輪為癢成災必用祛風排○

祛風湯防風白芷川芎當歸偕充蔚升麻細辛菊花首烏草烏製麻黃哉藥本蒺藜

開細辛草烏各五錢餘各一兩或水煎或○外洗細辛湯桑皮川烏皆羌活乾姜共

白菊等分煎水洗薰來端會解人災等分

精微云眼曰癢極者乃肝虛也以致風邪冲於肝膽二經含蓄熱極致使睛中受

癢之故也內服祛風散外洗細辛湯點二八丹嚴按此論肝虛是也而又曰熱極

秘傳眼科纂要卷下

嘉應州黃 嚴耐菴纂

上海秦之濟伯未校

古秦紫陽東臯程名成男振興重訂

二十四論暴疾風熱外障

論暴疾腫痛忽紛如肺受毒風宜急散酒調散用不徐徐方見肺臟一服定軒渠軒渠笑

技傳軒渠○久不散風毒攻入眼中居致使白仁浮且腫火燒天廓天廓為開牛車

載笑自若瀉肺飲裁祛方見

天鏡云眼內忽然腫起痛甚難開者肺受七情鬱結毒風不散久則攻入眼中致

使白仁浮腫用瀉肺湯羌活黃芩元參桔梗大黃朴硝骨皮次服酒調散入眼當歸生

地桑皮赤芍荆芥薄荷川連細辛荻子川芎藁本嚴按此二方皆與前異用以治

肺家積熱久則熱極生風周易所謂風自火出也當先清其火火降而風自息用

硝黃是也但已謂肺受七情鬱結又曰毒風不聚目暴疾風熱則此風其內生之

風也其外耶謂肺生之風則所注瀉肺湯是也則所注酒調散荆芥薄荷細辛

藥本川芎則非矣蓋熱極生風則自熱生非風藥所能除也此等論症用藥決不可從故不遵用學者當依吾改耳

二十五論癢極難忍外障

晴癢極癢到苦難挨風邪乘肝虛襲肝臟上冲風廓烏輪為癢成災必用祛風排○

祛風湯防風白芷川芎當歸偕充蔚升麻細辛菊花首烏草烏製麻黃哉藁本蒺藜

開細辛草烏各五錢餘各一兩或水煎或外洗細辛湯桑皮川烏皆羌活乾姜共

白菊等分煎水洗溫薰來端會解人災等分

精微云眼曰癢極者乃肝虛也以致風邪冲於肝膽二經含蓄熱極致使睛中受



中醫藥大學圖書館

二十六論疳傷內障

瘡傷目。目閉不能開。急治尚能留二目。揆延必有喪明哀。贈爾秘方來。消石丸。攪。

獅五
分
麝五
五
五
佳
三
稜
我
求
青
皮
醋
炒
陳
皮
蘆
薈
炒
炒
五
二
連
胡
連
川
連
酒

神效
妙藥
分一
分八
石
各五
一為
米
糊
麻子
大
翻
持要
加者
脾
汁
空
心

史君二錢木香分諸香附麥芽分皆米皮湯下三歲以下二分三歲以上三分

服前藥之後散子綠衣裳。扁蓄三錢。薄荷一錢。猪肝蘄服三諧。不啗再把妙。

聖不立目開翳不還肯一念入性九十二金一存一存月月分一

方裁○蒙花散加入谷精來蟬退等分研細服蘸費猪肝尸半枚包管不煮炙

鴻飛治此用除熱藥大黃知母黃芩防風元參充蔚子菊花木賊巖謂肝雖屬

大黃太寒雖屬熱木賊大溫俱非所宜再觀其方連五錢青君肉

三仙丹
一個輕甲粉二分共末入雞一蛋青內煨服三個每二方較可又方亦名消瘡丸五穀

蟲淨一兩
蘆薈胡連各五錢
蜜丸每服一錢
後服理脾丸
白朮陳皮白茯苓
淮山炙甘草

甘肅胡連
不胡連
及胡連
者盧齋
之神藥
靈驗如
神我砂
仁消下
其飽兒
疳為方
甚多雖
不能收
秘錄專
以給公
心察之
痛非太
傷

治不
目不
如無
治及
疳疳
疳疳
愈我
而家
目利
亦治
痊疳
可疳
也疳
至疳
若疳
治疳
疳疳
并疳
傷疳
目疳
及疳
辨疳
疳疳
症疳
之疳
重疳
輕疳
認疳

目傷之難易一覩燎然手到病除之秘方秘訣盡洩在

巖醫學入門精要書中能兼閱之當今古人獨仙也

二十七論小兒通睛內障

通青艮。此是小兒。災。用大童二里埋合不尋。丁傷乃是外物。頭腦或因墜塵埃。驚散。

[illegible]

肝魂平。不使能用。魂不之應。散於目。
○牛黃丸白附子石羔煨兩各川芎肉桂砂砂錢一白芷錢三磨

香少蜜香五全。曷一來。如梧易下四三次。薄荷湯下。通真散。吹鼻亦良哉。瓜

許 暑者 錢生 蚰 錢蜜 大 子 大 一 四 三 未 或 五 六 丸 (五 子 青 四 五 丸) 十

蒂^{分七} 藜蘆^{錢三} 共為末石楠勝子^{錢一} 細安排鵝管試吹來^{吹鼻}

二十八論痘毒傷眼內障

發痘後餘毒上攻睛頭痛身熱目紅腫清毒保目湯
速披尋莫使毒攻深清毒保目

湯連翹^牛 旁^{分各七} 桔^梗 柴^胡 荆^芥 芩^薄 枝^荷 子^炒 黑^防 風^七 蟲^退 甘^草 升^分 燈^心 煎^用 二^三 斟^若 腫^痛 甚^者 可^用 鹿^山 加^減 酒^調 散^草 明^生 聖^月

麻^{分五} 赤^芍 七^分 并^燈 心^煎 用^二 三^斟 若^腫 痛^甚 者^可 用^鹿 山^加 減^酒 調^散 草^明 生^聖 月^分

泰^皮 海^螵 蝦^灰 石^羔 生^甘 或^竟 用^酒 退^翳 也^紅 腫^已 退^欲 速^反 難^成 我^愛 崑^山 定^永

黃^恒 瑜^草 決^明 青^皮 錢^炒 三^甘 草^一 錢^鼠 粘^子 炒^桔 梗^二 田^平 望^月 沙^海 螵^蛸 去^壳 明^定

酒^赤 芍^錢 煮^熟 大^黃 徵^錢 三^煎 用^石 羔^錢 炒^赤 小^豆 錢^二 赤^秦 皮^錢 炒^四 合^鬱 金^鳴 錢^三 好^明

去連翹心^{錢三}

共為末早晚飯後服二三錢白湯下服完一料
再製如鳳凰衣菜豆衣多服自愈其效如神
此症嚴有極捷極訣的認法治法在余醫學
入門精要痘症門宜兼閱之可稱獨步也

二十九論風粟外障

瘡如粟米生於眼胞中脾胃上中留濕熱致生風粟一叢叢癢擦損花容
針出血

內用清脾飲攻甘草桑皮^黃 芩^澤 瀉^骨 皮^蒼 朮^只 細^辛 雄^輕 重^一 般^同 煎^水 等^分

鴻飛云眼胞常生小瘡如粟米者乃是脾胃濕熱積於胞臉致使眼胞生風粟磨擦
黑睛久則生翳治法先用三稜針逐一針出惡血內服清脾飲點珍珠散并九一丹

三十論視物不真內障

眼
科
纂
要
卷下
二
上海三馬路各書局

琢喪太過腎水不能生肝木水涸火炎上雙目暗少年花似霧中看駐景丸是金丹

○四子也枸杞兔絲圓楮石子從蓉北五味子十錢人參乳香蜀椒攢熟地妙難刺

取參乳香各一兩熟地二兩餘各五錢蜜九梧子大蔥白湯下天鏡云眼前時常翳如隔紗者乃腎水不能生肝木致肝血不足不能運於目盛陽上攻心火更加精

神短少不能久視治法用駐景丸最妙

赤眼症傳染到家家屬氣天行人怎閃奇方傳爾解咨嗟靜聽語無譁

白上片一些些許少劉末黃連錢一同打合黃連末雞子白片置碗中頻頻點眼賽流霞

真個妙無加又法用生薑汁點一用內服也加味六黃佳黃連黃栢黃芩大黃生地

黃赤枝仁白芷姜黃此慎勿妄奢遮等分水煎服

精微云赤乃天行毒氣所傷治法用童便黃連泡洗巖曰單用童便洗亦妙耳

三十二論風牽出臉外障

風牽臉脾胃受風邪致使眼皮翻向上不能開合勿嗟哪烙法却非差用銀器燒

神效黃芪湯八分參白尤大黃加五分遠志防風各五分知母骨皮各五分驅風除濕用衙衙

難向淺庸誇

天鏡云脾胃受風邪壅於面上致使者時不能捉起故也治法用銀匙燒紅烙三五次以散其風邪內服黃芪湯外點二八丹

三十三論蠅頭蟹眼外障

蠅頭障。蟹眼亦同名。翳如蠅頭生木廓。烏輪腎肝虛勞毒氣上冲睛長日淚盈盈。

問治法。補腎丸有淮山熟地青箱子兩子各一研為末。煉作丸子向朝食。久久自然安。

鴻飛云。眼內黃仁黑翳似蠅頭者。乃是肝腎虛勞也。七情所傷。毒氣攻於目。流難開。致生黑翳。治法用針挑之。內服補腎丸。外點三七丹。如症訣曰。翳自熱生。由毒發。烏輪上平潤者。為弱。腎丸起。火小者。為疔。今此目。用驅風藥。如蟹眼。非高走。共小之。謂乎。但疔有黑白。宜分風熱。血熱。白者。為風。宜血熱。宜用涼血解毒藥。佐以驅風藥。治之為宜也。

三十四論不紅而痛內障

眼無病。不赤。頭目日生疼。邪氣來虛攻入腦。亦有因七情鬱結。酒色不治。將就變青。

風障。到此力無庸。青風內。宜服透風。勻氣散乳香沒藥。細辛。從當歸。白芷。澤蘭。羌活。肉桂。天仙藤。黑丑。厚朴。甘草。同生。地茴香。春調。各二兩。酒。○次服。川芎散。白菊。石羔。

川芎。旁子。蒺藜。細辛。合。白僵蠶。製共研融。各一。米飲下。二錢為功。

精微云。不紅不赤而痛者。乃氣衰腦虛。亦有鬱結。或酒色過度。上攻於腦。致使頭目疼痛。久則變為青風內障。治法先服透紅。勻氣散。次服川芎散。

三十五論漏膿血外障

漏膿血。常出大眦頭中。此是心脾二經積濕熱。上控於目。變瘡癰。致使日流膿。宜

服。墜血散。石決明。生地。歸尾。川芎。五味。淮山。知母。炒。細辛。人參。共。赤石脂。供等。分為

末。用茶涼。二錢。

天鏡云。眼大眦常出膿血。濕爛者。乃是心脾二經多積濕熱。上注於目。毒發成瘡。控血注爛。致使流膿。治法先用桑白皮煎鹽湯洗。有瘡上吹。二八月點七寶丹。內

上海三馬路中市



服之症也今附此症即巢元方所云偷

熱積胃流注太陽經脫深眼內皆頭忽結成胞勝脫為澤廊三日五日便生膿成汁

巢氏曰偷針症○當服清胃消痰飲花粉石羔陳皮川貝錢各一黃連姜汁荆芥各七

草五分防風七連翹一茯苓白芷炒梔仁各七分此說較精純

夫紅者世呼為偷針乃太陽結熱所致亦因多食辛辣燥火所致其熱積於胃發為偷針此由熱氣客在皆間紅熱搏於精液而忽結成胞三五日便生膿汁不世呼為力偷針眼此初生小胞有細紅點如瘡以針挑破即瘻重者服清胃消痰飲

三十六論鵲眼凝睛外障

鵲睛眼氣血滯而凝二個烏輪轉不得火熱傷肝血肝風生肝火盛則風生古用抽

風湯寧○抽風湯石決明又人參五味子車前知母白茯苓抽風只有細辛能此法恐

難憑

精微云目之睛瞳不能運轉者乃是血氣凝滯不散五臟受熱致使難分人物形

象如鵲之少血肝受火熱則陰血益涸而孤陽無陰火炎風生筋脉舒急則烏輪

臟多氣而少血肝受火熱則陰血益涸而孤陽無陰火炎風生筋脉舒急則烏輪

不能轉矣嘉慶甲子余於永邑撫溪治一盧姓婦烏睛高起不能轉舒因憶古人輪

治小兒熱驚眼勇視不轉睛者用瀉青丸膽草枝子大黃以洩熱羌活防風以古搜

風芎歸以愈酒調散子於此症極合遂依此方加草決三錢故膽投之一劑而睛轉

加減重而愈酒調散子於此症極合遂依此方加草決三錢故膽投之一劑而睛轉

翳自烏輪下臉冲上漸漸蔽瞳仁自是胃家風熱盛湯宜清胃請書紳地骨皮配川

三十七論赤膜上冲外障



連黃芩。○京赤芍。及生地當歸身。此味宜酌量採得薄荷并桑白皮甚須加入石羔

鎮。音真壁也石羔重墜翳自妙論最津津等分水煎

天下者宜用此鎮壁之妙論最津津等分水煎

三十八論水蝦翳外障

水蝦翳兩兩復三三形似水蝦肝腎恙祛風清熱早宜詣先用菊花探○菊花湯充

蔚子川芎枝子川連知母細辛生地水等分煎服睡教甜改用修肝拈○修肝散充

蔚黑參兼知母蒙花甘草桔梗菊蔞藜枝子骨皮漆赤芍枸杞甘宜甘草枸杞等分

瀉飛云眼內黃仁生翳三三兩兩似水蝦翳者乃是思慮勞神之故致使肝腎便

八丹可也

三十九論陽旺而痛內障

午前痛。自午逆上陽旺又當陽陽旺火旺也當陽痛久也能生白翳急宜抑火問何

方散子川芎散良○川芎散抑火石膏良白附子川烏甘草菊骨皮羌活細辛參

詳等分為末泡薄荷湯二三錢

精微云眼遇早辰疼痛至午乃陽旺上沖頭目陽生於午故

四十論陰勝而痛內障

午後痛。自午至亥交始能停此是陰寒須補火回陽湯服後夜光柳紅九增端的有

奇能○回陽湯北味共雲扶苓附子人參細辛炙草川芎當歸妙合車前吟白芍藥

最娉婷○夜光柳紅丸人參甘草傳松聲藁本蒼朮羌活防風荆芥薄荷完全蠅味

首川烏川芎當歸身蒲黃北細辛全蠅一錢餘各一下

鴻飛云日過午後疼痛至戌亥者乃陰毒腦

黑珠痛至夜則如鑽又是厥陰肝陰寒症只宜溫散不宜寒涼草用夏枯實夏枯

草製香附一般般甘草四錢研成末茶調服下即時安加味匠心難夏枯草香附名

服二兩甘草四分

凡眼珠至夜則痛甚用寒涼反加痛甚寒也蓋目珠屬厥陰經也厥陰陰寒至夜

如神以陽治厥陰也又曰白珠屬陽白珠痛者則夜甚耳

四十一論肝風積熱內障

肝積熱赤澁淚難開肝主淚熱積於退積瀉肝湯充蔚子黃栢朴硝大黃芩桔梗

知母木歸尾黑參該等分○消風修肝散川芎赤芍荆芥防風哉知母甘草鈴羊角

黃芩羌活梗大黃須用人參陪茶泡上一銀鑿

天鏡云眼中赤澁淚出難開者乃是七情鬱結不散以致黃仁或生羅

四十二論紅霞映日外障

眼赤澁腫痛又羞明火盛三焦肝風冲上壅紅霞翳致蔽黃仁散用甯肝散平○甯



肝散生地赤芍拌黃芩枝子羌活防風甘草切大黃攢出蒺藜城好好得歸身○次
服滌霞散赤芍薄荷黃芩蒙本防風連翹梗甘草蒙花白菊生枝仁怕是蒺藜剉
箱熟各一兩為末用青

上致飛云目赤溫腫痛羞明者乃三焦之火積熱成疾肝經風邪冲
上致使黃仁生翳似紅霞者治用甯肝散次服條霞散點二八丹

四十三論硬臉凝睛外障

胞臉硬疼痛却全無壓住雙睛難轉運肝家壅熱爾知乎勻氣散堪扶○活血勻氣
散生芪沒藥菊花都羌活當歸川芎蒼朮生地黃栢麻黃白芷大黃呼快把薄荷沽

或等分酒為末薄荷湯
天鏡云眼胞頑睛不轉運俱不疼痛者乃肝臟壅熱氣血凝滯或肥肝之人飲

酒太過眼胞堅結上聚於臉以致不運治法外肝用風膏擦上又用避風湯洗
內服活血勻氣散不宜煎藥○摩風膏用于鵝油木通用牛脂細半附子及藥膏
碎補各一兩共末將鵝油牛脂熱膏和勻氣散○避風湯用當歸菊花羌活薄荷
防風各一分每服八錢水煎薰洗之

四十四論口眼歪斜外障

風邪侵入脾目口眼忽歪斜天鏡云扯左為脾急灸夾車耳門穴太陽人中左穴發
發左右火交加服用羚羊散嘉羚羊角知母細辛麻黃白芷川芎羌蔚子薄荷荊芥防

風羌活甘草當歸黃芩搗顧本用人參芽等分為末
精微云眼瞞斜歪者乃是房事不節或醉飽當風坐臥以致風邪侵入脾胃久則
上灌胞臉而然治法用摩風膏擦上去皮外風邪內服羚羊散又灸夾車耳門太

陽入中四
穴甚效

四十五論臉粘睛珠外障

睛粘臉濕爛不堪言脾胃濕生風又襲清風散先愛泄脾湯砒血又須先泄脾湯

黃栢大黃煎蒼朮芒硝知母骨皮桑皮桔梗并生甘一樣等分煎來喚清風散知

栢澤車前木賊當歸防參甘菊桑皮梔子薄荷鮮等分方是古人傳

渴飛云兩眼粘睛濕爛者乃脾胃濕而受風故聚於臉於而不散久則漸生翳膜治法先及去瘀血以三七丹點之先服泄脾湯後服清風散

四十六論患痛生翳外障

陞腫痛發熱又增寒熱結肝脾宜早治酒調散子可煎餐加減却多端如熱盛重

用大黃寒風盛麻黃莫輕放翳加草決安或柴胡青皮青箱之

巖按此症天鏡謂眼內陞腫痛滯澀難開增寒發熱食煎炒油膩鬱結攻發於目

以致生翳差明淚出用四順散大黃當歸赤芍甘草已有大寒熱單用寒涼血分藥

恐未必需止次用清瀉固源湯羅參子當歸參芪熟地大黃扁鵲白芍木通滑

以備觀

四十七論痛極增寒內障

眼痛極又兼增寒也乃是氣衰血盛因只宜補氣君休訝血藥稍稍寡人參附子

湯熱地為臣罷等分用羌活茯苓炙粉甘白芍酒炒斯無價緩緩煎湯下○次服威



千頃堂書局發行

氣散人參 白朮 茯苓者。沒藥 蘇合 白朮 蔓荊。子川 芎黃 芪北 味子 防風 化甘草等

分亞為三末茶

鴻飛云眼痛極增寒者乃氣盛血衰之故血屬陰本逐氣而行氣衰不能運血致使毒感而痛以發其寒宜用人參附子湯十餘劑次服感氣散俱用等分嚴日已氣不能散血盛氣則濁氣不能下降之症耳甲子巖於永邑治一賴姓男子陰感陽衰清氣不勝上騰則風日補中益氣湯與服三劑全愈後改六君子湯而安

四十八論白仁黃赤色外障

黃赤色漸見白仁中。此是酒人多飲水濕傷脾胃到中宮。肝膽之火把肺攻心解毒

散。膽草菊花同。梔子黃芩川連桑白皮澤瀉車前利水却精工和血當歸從等分

竹葉燈心煎水服

天鏡云白仁漸漸黃大而赤者乃酒毒也醉後熱渴飲涼水過多致脾胃受濕肝膽火動上攻肺金白仁屬肺以致變白為黃為大赤色者宜服解毒散次服通利散甚有捷效

通利散瞿麥并木通。梔子大黃花粉扁畜車前生地竹葉叢甘草燈心共等分

驗案症方

漏睛眼

漏睛眼。大眦皮上有一小孔。大眦日流膿涎水粘睛。運不痛。涎水下不粘睛。小腸邪濕逆行。攻泄濕作湯從。○泄濕湯。蒼朮。錢。各一。茯苓。分。防。滑。石。陳。皮。分。八。竹。葉。同。車。前。澤。泄。

七與木通。分甘草。水煎濃。○次服。燥濕丸。二蒼朮。各一。炒。川連。共半。下各八。陳皮。兩。

雲白茯苓。錢一。生甘滑石。各八。擅奇功。只殼炒。添充。三煎。水糊丸。白湯下。二錢。此方每用。俱驗。

能遠視不能近視

能遠視。近視反。朦朧。清熱養榮湯可服。一錢。當歸。熟地。夏枯草。同。草決。冬。門冬。錢各一。

○枸杞子。錢半。酌為君。石斛。前胡。荆白芍。四分。甘草。水煎濃。多服。自成。功。門冬。錢各一。

能遠視不能近視。劉宗厚之言。為定宗厚曰。陽氣者。猶日火也。日火外明而內暗。外明者。利於遠。故以不能近視。此方主之。

能近視不能遠視

能近視。遠視却。迷離。單用養榮湯。人參。熟地。麥冬。酌同。草決。明一治。持甘草五分。宜。

枸杞和鹿角膠。錢半。補束離。木離。先天。石斛。茯神。各八分。菖蒲。只用六分。劑配搭。

最為奇。

陰氣猶金水也。金水內明而外暗。內明者。利於近。故不能遠視。宜補陽以配陰。此方主之。○又須知此症。以病而言。非主生成者。言。

益腎丸。草決。麥冬。當歸。鹿角膠。人參。兔絲子。都須秤準。十錢。遺二兩。熟地。黃隨。四。

兩。枸杞。甘菊。五錢。施山藥。茯神。錢各八。為丸。益腎。養金。芝。變化。抄看。人施。

此方遠近視。皆效。但須因症。變通。分兩。自然神應。藥須地道。製必遵法。如用草決。必炒而陳。久者。方可。臨時。炒者。多不應。手。鹿膠。必須用真者。不真。不如。用鹿茸也。

黑白混視



視物也。黑白不能分。初起急宜清二。肝腎氣。氣清益腎丸。早吞。見土遠免使歎。芝焚。清氣湯。柴。拘。夏。枯。芬。荆。芥。連。召。當。歸。赤。芍。熟。地。黃。只。殷。甘。草。羣。知。母。麥。冬。後。加。云。

乙巳馮太史諱成修寓穗城蘭館巖以詩文贊見有化縣生陳竹菴者太史門人也竹當辭歸曰患眼黑白不分又曰此尚有友某亦患此症醫云不治果傷所害下淚巖在坐間幾日矣一日云但巖曰此尚易也吾能治之勿慮太史大喜問所以不吾將氣血之理精論一番云但巖曰此尚易也吾能治之勿慮太史大喜問所以謂血以濡之氣以嘘之是二血之行所以息者氣動者氣往來不滯者血也內分而陽者二天也主氣以虛之是二形陰者一地也無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜分者二體也主金其色白不離乎地無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜于者二地也則易其用然用白不離乎地無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜陽者二天也主氣以虛之是二形陰者一地也無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜謂之陽精成于地則為其色白不離乎地無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜謂神者也今黑則分其色白不離乎地無輕指實黃而有象黑者水象生於陰也主靜理不爭體用各得其所以調氣血者對則抑混其非矣當初起之時急調其氣血使之陽識至是乎因各得其所則天地位氣血混亂以辨之所謂利於地而為水其色黑天之史曰善命取筆索方巖與清氣湯對則抑混其非矣當初起之時急調其氣血使之學到天人歸一處此生何地不義皇云

瞳仁散大

瞳仁也。散大最堪憂。有大稍宜清腎。火虛補腎。丸。近視節又何求。酸加五味收。○

清腎湯。枸杞。一錢。茯苓。八分。山茱。一錢。三皮。知母。黃柏。一錢。大活。五分。五味子。八分。地黃。一錢。

歸尾。白芍。冬各一錢。優若作丸。丸。把大活。抽。五錢。除大活。一兩。熟地。一兩。拘杞。用酒下。

○考古法。專顧脾胃。先用沖和養胃飲。補中益氣。理非偏。繼服。石夜光丸。養胃。

飲。人參。白朮。各一錢。茯苓。四錢。五錢。全酒。芍。六分。歸身。一錢。甘草。一錢。五味子。三分。羌活。二分。防。

水部虛衰細小則由腎火盛腎中真水又虧哉補火真不該真不該只有抑陽湯
諧知母黃栢當歸川連寒水石茯苓獨活此與歸連八地黃生用裁煎服亦妙哉
益陰丸也要早安排知母黃栢各二當歸兩寒水石兩地黃二兩草決一兩炒枸杞
材獨活少添差五錢知母黃栢各二當歸兩寒水石兩地黃二兩草決一兩炒枸杞
此症乃眼內腫生錢知母黃栢各二當歸兩寒水石兩地黃二兩草決一兩炒枸杞
矣此是陽瞳仁緊小而又漸小而至芥菜子大不治則小至全無則眼暗
散石斛夜陽瞳仁緊小而又漸小而至芥菜子大不治則小至全無則眼暗
重病必須病者能自愛惜耐心服藥調護醫者能廣參博究道理明徹方無誤
濟斯也

眼瘤

眼瘤症核結眼胞皮上下臉生核此是脾花粉一荊芥八防風川連炒五只殼炒一
生甘分五白芷分八貝母陳皮九子且遲遲○化痰丸半夏川連一兩施花粉陳皮川貝
各一茯苓一和將甘草七錢節煉蜜丸餉之

兩按眼瘤乃脾胃疾氣所致核結胞上望白不破久則如盂如升之大先以艾火灸
三壯隨以膏藥貼之服消痰飲化痰丸經云着而不丟其病為實着在眼胞了若
非火攻馬能即去但艾灸須小如芥菜子必須仔細

令患者緊閉雙目艾灸須小如芥菜子必須仔細

又一種天廓全不紅白不痛只有風輪輪突大甚肝經血少血不火熊熊肝血不足
清火最為工○平肝清火湯赤芍錢一連翹五分供枸杞五分荆芥五分柴胡一錢夏枯草

錢一當歸一錢洗生地五分車前分同法用熬膏充將此藥拈二十湯化服兼把那清痰

降火丸 兜春 連翹 川貝 陳皮 略一 花粉 兩白 芍八 黃連 炒五 只殼 八錢 炙甘 五錢 從神 錢

一連獲昔種白珠不紅不痛惟眼黑珠突大之甚此乃肝血不足而火獨旺使然此因平連炒七分只壳石羔各一兩川貝二兩黃

雀盲

雀盲也陰氣盛致陽氣衰晝視通明夜不見助陽湯裏貴人參黃芪各一必借升麻

分提蔓荊子五分歸身一錢生地一錢蒲一草決炒川芎各八甘草五分炙金釵石斛

廣陳皮妙法這般醫後服也大補參丸白朮人參黃芪蜜製各一兩枸杞子四菖蒲施

川芎各七生地酒洗甘草炙一熬膏石斛送當歸各一參濕茯苓為湯和酒送下

歸肝飲草決蔓荊貼合得豬肝三四兩與上藥空心服得二三劑定有見功時

嚴按雀盲症乃陽衰陰盛也蓋陽氣生於日中陽氣一虛至夜則不能抗陰陰反

一遇陰盛之時則陽氣陷入陰中而不能自振兩目無光矣故世傳方草用蒼朮

四兩米泔浸切焙乾為末摻入豬肝內以線繫定加粟米一合燉熟煎日俟溫臨

錢大服三錢又按此症是陽弱不足勝陰若陰弱不能配陽則當用六味地黃湯或大補杞歸

丸熟地人參白朮冬草決歸身杞子白茯苓石斛菖蒲甘菊或大補元煎淮山熟

眼皮臉紅

千頃堂書局發行