

東醫西寶鑑

十

東醫寶鑑雜病篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許俊奉教撰

風

中風微漸凡人初覺食指次指府才不仁或不用者三

知未大指及次指府才不仁或手足少力或肌肉

微掣者此兆也三年內必有風宜調其榮衛

先服愈風湯天麻丸或加戒防風通聖散防見可

以預防○竹瀝枳朮丸或與搜風順氣丸防

或相間服之亦可預防○凡人手足漸覺不隨

無力雖未致於倒仆其為中風暈厥之候可指日

而定矣早當從丹溪之法調治之○初覺風氣

藥也

調治預防

為主身不遂左手脈不足者以四物湯
○右手脈不足者以四物湯

君子湯
○氣血兩虛而扶衰者二陳導痰等湯
○氣血兩虛而扶衰者二陳導痰等湯

南星半夏枳實竹瀝薑汁之類
○若真元新復痰

飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風湯
○若真元新復痰

熱生風

凡濕生痰痰生熱熱生風
○風病多用熱甚

甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜而心
火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣

佛鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也
○多因

五志
○過極而卒中者由五志過極
○為熱

甚故也
○熱者風之體也風生於熱
○以熱為本
而風為標也凡有風者即風熱病也
○鄉里有
一入忽覺心腹中熱甚服治風藥而愈後到夷陵見
太守夏月忽患熱甚不免以水灑地設簟野其

上令入扇之次日急中風數日而殂及到豐陽見

一老婦長中亦患熱夜出卧廳上次日中風其子

肥人多中風

所謂肥人多中風者以其氣盛於外而氣衰於內也

人年逾五旬氣衰之際多有此疾壯歲之人無有

也若肥盛則問有之亦是形盛氣衰而然也

氣出入之多中風者以其氣盛於外而氣衰於內也

克木膽為肝之府故痰涎壅盛治法先須理氣為

中風所因

內經曰風者百病之長也至其變化乃為他

泄風又有肺風心風肝風脾風腎風胃風等

中風者非外來風邪乃本氣病也

溫而地多濕有風者非風也者溫生疾矣生熱
 生風也經曰亢則害承乃制河間曰土極似木
 千年得經意者河間一人耳○王安道曰昔人主
 乎風河間主乎火東垣主乎氣丹溪主乎濕反以
 風為虛象而大異於昔人以予觀之昔人三子之
 論皆不可偏廢殊不知因于風者真中風也○因
 因氣因于濕者類中風而非中風也○王安道有
 論三子與昔人論風之不同而立真中類中之目
 愚竊疑焉夫中風之證蓋因先傷於內而後感於
 外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病皆
 有因有證古人論中風者言其證也三先論中
 風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論
 矣

中風大證
 口歪
 眼中
 於人
 曰卒中
 曰暴仆
 曰暴瘖
 曰暴瘳
 曰暴喑
 曰暴語
 曰

延遲
 壅盛
 口歪
 眼中

賊風虛邪中人
 有寒暑寒則皮膚急而腠理閉暑則皮

中風

大法有四

一曰

不舉

半身

不遂

二曰

風痺

身無

痛

曰

正虛緩而乃能傷人乎少師氣氏不得以入乎將氣之須入
 人也不得以時然必因其入淺也其入深其內極其中
 病入也卒暴因其閉也其入淺也其入深其病也徐以其
 遲帝曰有寒溫與天適腠理不開然有卒病者其故故
 何也少師曰西人與天地相參也與日月相應也故
 月滿則海水西盛人血既積肌肉充皮膚繢毛髮
 堅腠理則海垢着當是之時雖遇賊風其入淺不
 深至其月郭空則海水平東盛時人血虛其衛氣去
 形獨居肌肉減皮膚膚縱腠理開毛髮殘應理薄烟
 垢落當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴
 極○邪風之至時遇賊風則其入深其病人也卒暴
 治肌者膚其次治筋脉其○次治六府其治皮毛其
 五藏者半死半生也○邪乘虛入是謂虛邪○治
 ○邪之不去其病則實虛○
 留而不去其病則實虛○

類風
 風痺
 狀諸
 行症

卷之八
 中風
 第二

三
 四

偏枯

血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之

榮衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯

枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不覺智不亂

病在分腠之間宜溫卧取汗而且巨鍼取之陽明虛偏

枯者手足為邪氣阻塞脉道而然痰病則之陽明虛偏

宗筋縱帶脉不引而然非病有言變志亂之證痿

病則無之蓋非病發于擊仆之暴痿病發于急情

之漸明是

兩疾也

風痺

神智不亂身體無痛四肢不舉一臂不遂謂之

甚其言微知可治甚則不能言不可治

者緩者四肢不舉急則一身皆仰或左癱右瘓或

一臂不遂智亂不能言者難治宜換骨丹神飛

步丹脾實者膏梁之疾宜疎風順氣元妨顛脾虛

者十全大補湯虧觀八寶回春湯

偏枯之邪氣深者非與偏枯是二疾其偏枯身偏

痛而不言不變志不亂邪在分腠之間即東垣所謂

邪中府也非病身無痛手足不遂而言瘖志亂者

邪入于裏即東垣所謂邪中藏也

風懿風懿然迷仆舌強不語喉中室寒噤噤有聲謂之

汗者生汗不出身直者死由痰水制火閉塞心震

言○風懿者奄忽不知入咽中寒室室然舌強不能

病在藏府汗出身軟者生汗不出身直者七日

風痺有全門在下

中風之名各不同其卒然仆倒者經稱為擊仆世無為

半身不遂經稱為偏枯世稱為癱瘓及腰腿風乃

中倒後之證也○其舌強不言唇吻不收經稱為

脉法凡中風脉無不大者非熱也是風脉也○寸口

膚絡脉空虚厥邪不瀉或左或右邪氣反從正氣
即急正氣引邪喘咳不遂邪在于絡肌膚不仁邪
在于經即重不勝邪入于府即不識入邪入于藏
舌即難言口吐涎沫訕訕中風口噤遲浮言急實
大數三魂孤離中風脉遲浮可治大數而極者
死明中風脉浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治
或浮或沉而微而虛扶危溫痰風未可疎譌大
法浮遲者吉急疾者凶中脉浮而遲者易治大
而急者死繆中脉浮而然者曰
風中脉浮而數中風使然者

風有中血脉中腑中臟之異

中血脉則口眼喎斜中府
則肢節廢中藏則性命危

三者治各不同中府者面顯五色有表證而
脉浮惡風寒拘急不仁或中身之後或中身之前
或中身之側皆曰中府其病多易治中藏者唇
吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽
大小便秘結皆曰中藏其病多難治中血脉而外
者多著四肢中藏者多滯九竅楊中血脉而外
有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治
之○中府者先以加減續命湯隨證發其表如兼

中藏則內有便尿之阻隔宜以三化湯或局方麻

仁丸妨觀滋潤湯外無六經之形證內無便尿之

阻隄宜養血通氣大秦湯羌活愈風湯養榮湯

○中藏者痰塞昏冒宜至寶丹之類鎮墜或活命

金丹牛黃定志丸祛風至寶丹○風中五藏舌瘡

眼瞽宜排風湯加減排風湯○但手足不遂言語

塞流當從愈風湯以行中道久服大風去治病

之法不可失于通塞或一氣之微汗麻黃一錢

或一句之通利加大黃二錢此為常治

之法久則清濁自分榮衛自和矣

小續命湯

治卒中風不省人事喁斜癱瘓瘡症麻

防風一錢半防己肉桂杏仁黃芩白芍藥人參川

芎藭黃甘草各一錢附子炮五分右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服○凡中風六脈浮緊風

當歸石膏有熱用白附子○凡中風六脈浮緊風

氣太盛心火暴升痰涎壅遏於經絡之中宜用小

續命湯用附子以其稟雄壯之資而有斬關奪將

之勢能引入參輩並行於十二經以追復其散失

之元陽又引麻黃防風杏仁薑發表開腠理以驅

散其在表之風寒引當隔川芎帶入血分行血養
血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃
火或加黃芩以清肺金若病勢稍退精神稍復
當改用丹溪之法以補氣血清痰之劑以調養其

本氣此急則治其標與
夫標而本之治也傳

疎風湯

治風中府手足不仁先宜斷表後用愈風湯
調理羌活防風當歸川芎赤茯苓陳皮半夏

烏藥白芷香附子各八分桂枝細辛甘草
各三分右剉作一貼入薑三片水煎服

加減續命湯

治風中府今人不分表裏虛實故張易
老授東垣以六經加減之法○太陽中

風無汗惡寒麻黃續命主之本方倍麻黃防風杏
仁有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝芍藥杏

仁○陽明中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之
本方倍桂枝黃芩加葛根一錢四分○太陰中風

無汗身涼附子續命主之附子加一倍甘草加二
錢一分乾薑加七分○少陰中風有汗無熱桂枝

續命主之本方倍桂枝附子甘草○六經混淆繫
之於少陽厥陰或肢節痠痛或麻木不仁宜羌活

連翹續命三本方一兩加
羌活錢連翹

三化湯

治府藏俱中風便尿阻
兩作一貼水煎服日

二三微
利即止

養榮湯

治風中血脈外無六經之形證內無便尿之
阻陽但肢不能舉口不能言或痰迷不省當

歸川芎白芍藥生地黃麥門冬遠志石菖蒲陳皮
烏藥白茯苓枳實黃連防風羌活秦艽半夏南星

甘草各六分右剉作一貼入
薑三片竹茹一塊水煎服細

排風湯

治風中王藏精神恍惚手足不仁口眼喎斜
獨活麻黃赤茯苓各一錢白朮肉桂川芎香

仁白芍藥防風當歸甘草各八分白鮮皮
五分左右剉作一貼入薑三棗二水煎服獨

加減排風湯

治同上通治五藏風天麻二錢蒼朮一
錢防風川芎羌活獨活各八分麻黃七

分白鮮皮當歸白芍藥白朮半夏赤茯苓黃芩
仁甘草各四分右剉作一貼入薑三片水煎服

大秦羌湯

治中風外無六經之形證內無便尿之動

舌強不能言語宜養血而筋自榮此主之秦羌石

膏各一錢羌活獨活川芎白芷生地黃熟地黃當

羌活愈風湯

治風中府中藏先以本藥治之後用此

分藥衛自和矣蒼朮石膏生地黃各六分羌活防

風當歸蔓荊子川芎細辛黃芪枳殼人參麻黃白

芷甘菊薄荷拘杞子柴胡知母地骨皮獨活杜仲

秦芫黃芩白芍藥甘草各四分肉桂二分右剉作

一貼入薑三片水煎朝夕服或以此湯空心嚥下

至寶丹

治卒中急風不語不省人事及風中藏精神

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

省精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝楊

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或瘦而偏枯

二參丹臨卧下四白丹明一名愈風湯明

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

至寶丹治卒中急風不語不省人事及風中藏精神

省精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝楊

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或瘦而偏枯

二參丹臨卧下四白丹明一名愈風湯明

五錢龍腦麝香各二錢半銀箔五十片金箔五十片內半為衣安息香以酒濾去沙土爭一兩熬膏

右為末入一安息香膏搜和勻一兩分作四十丸難

化倉卒難用宜施

滋潤湯

治風中痰二便閉澀先服此後以愈風湯調

仁各一錢羌活七分紅花酒焙

卒中風救急

初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜

亦宜吐之若口開手散遺尿者為陽暴絕宜大

倒不省牙噤涎潮口眼喎斜精神恍惚卒中昏

以手大指掐刻人中即省或急令入將病者兩手

心即醒或急以氣鍼刺合谷二穴人中一穴并穴將

法如未效用通開散吹鼻即提起頭項髮有嚏
可治如口噤不開以破棺散擦之口即開多灌香
油加麝香一二分或用薑汁二撮生飲之類若風
痰壅結諸藥不效奪命散一服立愈醫之凡中風
之證多是老年因怒而成蓋怒火上升所以昏仆
不省痰涎壅盛治宜豁痰瀉火豁痰宜省風湯瀉
火宜防風通聖散方服下○卒中昏倒即用開索
噴嚏法次用攝生飲煎湯調蘇合香元二九灌下
痰盛者加全蝎搗○卒中風不省通用三寶丹牛
黃清心元龍腦蘇合元氣門牛黃金虎丹以竹瀝
薑汁香油童便
調和灌下

牛黃清心元

治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏
憤言語蹇澀口眼喎斜手足不遂等證

山藥七錢甘草炒五錢人參蒲黃炒神麴炒各二
錢半犀角二錢大豆黃卷炒肉桂阿膠炒各一錢
七分中白芍藥柴胡信梗杏仁白茯苓砂水飛
白朮各一錢半紫胡信梗杏仁白茯苓砂水飛
錢二分半牛黃一錢二錢二分羚羊半角麝香龍
錢雄黃八分白飲乾薑炮各二分半金箔一百一

十為內四十為衣大棗二十枚蒸取肉研為膏

衣每取一溫水化下

牛黃金虎丹

治急中風不省身強口噤鼻乾面黑遍

形體如醉痰涎壅塞胃喉中如拽鉦聲雄黃水飛

天雄炮一兩二錢半臍粉龍腦各五錢牛黃二錢

半金箔八十片為衣右末煉蜜和勻每兩半分

藥行良久以薄荷汁更化一丸新汲水和灌之立愈如肥盛

體虛多涎有風之人宜常以此藥隨身備急為妙

通涎不下魂魄飛揚如墮江湖中頃欲絕即灸聽

會頻車地倉百會肩髃曲池風市三里絕骨耳前

髮際大傾風池氣遂通吐痰一枕繼又下十餘行

功也

攝生飲

治卒中風不省無熟者用此南星炮半夏製各一錢半木香蒼朮細辛石菖蒲甘草各一

錢右剉作一貼入薑七片水煎服

省風湯

治卒中風不省有熱者用此防風南星炮各二錢半夏製黃芩甘草各一錢右剉作一貼

薑十片水煎服與導痰湯一匙名小省風湯

奪命散

治卒中風涎潮氣塞口噤目瞪破傷風搐搦小兒驚風危急之疾天南星甜葶藶白芷半

夏巴豆去殼不去油各等分右為末每半錢薑汁一呷調下即效凡口噤藥不下者宜用此

開噤法

卒中風口噤不開難於下藥宜用開關散破棺散巴豆熏法龜尿解噤法口噤者以烏梅肉

和南星細辛末以中指蘸藥擦牙口自開

筋急故口噤不開鎖

開關散

治卒中風口噤牙噤天南星末五分龍腦一字右研和以中指蘸藥末指齒二三度其一