

傷寒

金匱啟鐫
第十四冊

金匱啟鑰卷十之三

漉江黃朝坊妙山輯著

陰症似陽陽症似陰論

何謂陰症似陽。如唇焦口燥。面赤譫語煩渴。掀衣。揚手。躑足。大便閉結。小便赤澀。舌有芒刺。爪甲紅活。身輕易于轉側。脈浮洪數。人皆知爲熱症矣。固宜用大承氣及白虎三黃石羔等湯治之。有一種陰盛格陽。陰症似乎陽。蓋陰盛而格陽于外。外熱內寒。經所謂重陰必陽。重寒必熱是也。此症亦面赤目赤。揭衣去被。發熱。此孤陽無附。飛越于外也。亦煩渴。但喜淡湯也。亦譫語。因氣虛陽脫也。舌亦有黑胎。但

無芒刺。且有津液也。脈亦數。常有七八至。但按之無力而散。沉細中見數。不似陽症之浮大。數也。但此小便必清。清者寒也。此症固宜回陽救急湯。或薑附湯。加參得汗而愈。此神聖之方也。誤投涼劑。則斃矣。何謂陽症似陰。如不渴。踞臥。引衣自蓋。大便滑泄。小便清白。爪甲青黑。唇紫舌卷。腎囊縮拳。身重難于轉側。脈沉細數。人皆知爲陰症。此固宜四逆湯。加吳萸湯。併灸關元氣海。及葱熨等法。可也。有一種陽盛格陰。陽症似乎陰。蓋陽盛格陰于外。外寒而內熱。經所謂重陽必陰。重熱必寒是也。此症亦指甲青。身不熱。口不渴。以熱熅于內也。甚且惡寒戰慄。以陽邪入裡。表虛無陽。故戰慄惡寒也。舌亦有卷。

勿榮而急引舌與舉丸故舌卷囊縮也。但此小便必黃赤脈雖數必沉而有力此爲熱極當泄陽以救陰正宜大承氣及白虎等可也。悞投熱藥則危矣。

証治歌

病症何爲陰似陽重陰必陽內經詳脈從沉細中見數孤陽無附外
飛揚煩渴偏喜滾湯飲舌胎黑有津并無芒氣虛陽脫故譫語小便
必清總緣寒真附湯加參得汗解回陽救急湯是良方病症何爲陽
似陰重陽必陰內經明脈數定然沉有力陽盛格陰熱蓄中陽邪入

裡故戰慄舌卷囊縮與陰同熱邪本屬陽明出陷入厥陰是病因但此小便必黃赤救陰當賴泄陽功用葯須投大承氣湯白虎湯投可奏勲。

脈

脈浮洪數爲熱症若數按之無力而散沉細中見不似陰症之浮大緊數此爲陰盛陽格假陽之症脈沉細數爲陰症若雖數而沉而有力此爲陽盛格陰極熱之症。

方歌

回陽救急湯。治三陰中寒初病身不熱頭不痛惡寒戰慄四肢厥。

冷引衣自蓋。踞臥。少重。腹痛。吐瀉。口中不清。或指甲唇青。亡陽。
涎沫。或無脈。或脈沉遲無力。

回陽救急。

有陳皮。

一肉桂。

一參。

一白朮。

一宜。

乾薑。

一附子。

炮。

六兩。

宜。

乾薑。

一附子。

炮。

六兩。

宜。

乾薑。

一附子。

炮。

六兩。

並半下。

半。

茯苓。

二。

甘草。

一。

五味。

七。

粒。

隨。

右加薑煎入麝三厘調服。無脈加豬胆汁。泄瀉加升麻黃芪。嘔吐。

加薑汁吐涎沫。加鹽炒吳茱萸。

大承氣湯

白虎湯

三黃石膏湯

四逆湯

薑附湯

均見六經

吳萸湯

見陽明

金匱要略

卷之二十三 傷寒

三

傷寒變証論

傷寒一病。爲症孔繁。或六經直中。或陰陽交錯。傳遞不一。遷變無常。予于此。或分言。或總論。稽古證今。究原論治。綦詳矣。抑何爲而更立論哉。第前所言傳變。言陰陽六經之傳變也。雖以變名。猶之常也。其有異常變症。未之及焉。縱云變無常有。而古人有曰。欲治傷寒。先防變症。是於未病之先。尙不可輕視乎變。況其爲症。可或遺言乎。試更爲申論之。夫不有熱秘而身肉栗起者乎。是因表藹未達。見此者。須以蚊蛤散清之。不瘥。五苓散治之。且不有表被攻虛。症見爲自汗如雨。脈見爲緩至空浮。此表虛而邪未去。遇之須急。以疏邪寔表湯治。

之所尤異者。率爾疾走。率爾高呼。是爲狂症。宜三黃石膏湯。抑有謔言妄語。煩燥懊憹。有似於狂。而或身無大熱。神氣疲弱。是雖皆爲膀胱熱結。下之不宜。意爲加減桂苓飲。主之。又有鄭聲陽脫之症。更陰也。此當救陽爲主。薑朮湯其宜焉。至於發斑一症。俱屬寒滯。然陰陽有別。毒中不同。彼陽毒之生也。其脈浮數。其斑紅点。使此以表散投之。行見斑發而愈。腐爛必急。進消斑青黛飲。陰毒之生也。其脈沉遲。其斑青点。使此以解熱投之。則見斑收而毒入裡。必急以附子散平之。若夫熱邪結裡。發爲大便黑之症。是瘀血凝聚。桃仁承氣湯主之。其有病傳心肺而夾瘀血。發爲身熱神昏小便不利。大便黑之

証是雖經傳之變亦由藥悞而致也。治宜當歸活血湯主之。他如吐
衄者。熱壅之候。宜加減犀角地黄湯。更有越經一症。神昏如醉。臥不
作聲。其目則赤也。其唇則焦也。此其候。蓋因心火上炎。刑制其肺。急
宜導赤。各半湯以解之。又有戴陽一症。假陽陰極。其脈無力。其面色
赤。其煩燥則欲入水。治宜反本回陽。倘以寒涼劑投。當時非無小效。
不轉盼而重益加重。危益加危。死無待矣。惟以回陽救急湯。或薑附
湯加參。峻而進之。庶乃起死回生。又有耳聾脇痛者。是胆家之病。以
柴胡雙解散主之。特有撮空一症。緣邪熱傷肺而致。真陽耗散之時。
使不詳細察之。指爲瘋症。而以瘋治。如是者。殺人頃刻。惟以節菴升

陽散火湯治之。或可救存於萬一焉。有原氣血衰弱。因勞力感寒而得病者。是不可以尋常之傷寒例治。祇宜輕從解散。而以扶本爲急。治宜調營養衛湯。又有變生痙症者。是症肢頻抽搐。儼如角弓反張之狀。然無汗爲剛。有汗爲柔。剛柔不可以不分。既辨之爲剛。主以續命湯。或附子助陽湯。但去桔梗。辨之爲柔。亦以續命湯。但不可用麻黃。恐散其陽。又有陰陽易一症。更爲奇候。其見爲症。頭俯足踣。眼睛花亂。是宜用逍遙飲。燒視散。參芪湯。或蝦鼠矢散。又有百合一症。冥然不食。默默無言。治宜百合雞子湯。或仍寒而發熱。或勞復者。宜柴胡百合湯。或腹上下左右近齊之處。忽然大力氣。此

惑一症。二虫求食。治宜別分上下。蝕上則出聲。噉鳴。宜甘草瀉心湯。蝕下則咽乾。宜苦參湯洗之。蝕肛門。以雄黃燒烟。瓦器盛以薰之。又有發願一症。耳邊或下赤腫。是由熱結之故。初起宜連翹敗毒散。若功將成。則宜內托消毒飲。若瘡後喜睡。宜理中丸。若心驚悸不寧。宜扶神散。或有虛而自汗者。宜雌雞湯。虛而哮喘者。宜人參湯。有夢遺者。宜牡蠣散。有腰痛者。宜垂膏杜仲酒。有失音者。宜二瀝湯。有腰下水腫者。宜鹿參湯。牡蠣澤泄散主之。抑有內癰一症。其狀頗類傷寒。但飲食如故。有癰痛之處。與傷寒異耳。胸中隱痛。或喘或欬。吐唾腥黏。是肺癰也。當胃作痛。手不可近。是胃癰也。少腹重痛。便數似痢。身

皮甲錯。是腸癰也。此雖有似於傷寒。治法不可以傷寒爲例。是又屬外科之治。可參究焉。采輯變証。因症論治。大畧如此。推類以求。庶幾近之。

証治歌

誰謂傷寒無變更。漏遺再補逐條明。熱秘栗起表未達。文蛤散不瘥。與五苓散。表被攻虛汗如雨。脈見爲緩至浮空。此係表虛邪未去。疏邪寔表湯最工。高呼疾走爲狂症。三黃石膏湯可平。懊憹煩燥兼譫語。身無大熱與狂分。勝朮結熱不宜下。加減桂苓飲可清。鄭聲陽脫陽宜救。薑朮湯投陽自生。發斑一症俱寒滯。陰陽各別毒不同。陽脈

浮數斑紅点消斑清焦飲堪陳陰脈沉遲斑青点附子散投自可平
熱邪結裏大便黑瘀血凝聚用桃仁承氣湯病傳心肺而夾血發爲

身熱且神昏小便不利大便黑當歸活血湯最靈熱壅之候因吐血
加減犀角地黄湯可尋越經一症神如醉唇焦目赤卧無聲心火上

炎形制肺導赤各半湯宜斟戴陽一症脈無力燥欲入水面色紅回

陽救急湯宜進薑附湯加參效絕倫耳聾脇痛胆家症柴胡雙解散

如神邪熱傷肺促空症真陽耗散本非瘋升陽散火湯宜進方出節

菴古法程衰弱勞力因寒感扶本宜急發宜輕勿以尋常傷寒例調

營養衛湯自回春肢頻搐搦變生瘰瘰有剛柔當細論無汗爲剛宜

續命湯

附子助陽去桔梗有汗為柔亦續命湯

麻黃宜去免傷人奇

症更有陰陽易頭俯脚踣眼目昏逍遙

飲

燒視散

參芪湯

並獬鼠矢

散用亦同百合無言兼不食百合雞子湯合情仍寒發熱或勞復柴

胡百合湯邁羣腹間繞臍忽動氣薑桂煎投勿畏辛三虫求食名狐

惑上下宜分莫囹圄出聲喎鳴名蝕上治宜甘草以瀉心湯蝕下咽

乾苦參洗肛門燒取雄黃薰發願一症由熱結初起連翹敗毒散呈

將成內托消毒飲好瘥後喜睡宜理中丸心悸不寧茯神散好虛而

自汗雌雞湯

從虛而哮喘人參湯

進夢遺牡礪散

是良臣腰痛蚕膏

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

杜仲酒二壺湯能治失音腰下水腫鹿參湯用牡礪澤泄散同肅內

癰狀與傷寒類。但有癰痛自分。門胸中隱痛。或喘咳。或嘔。是柔長。凡癰當胃作痛。不可近。此係胃癰。不須詢。少腹重痛。小便數。身皮甲錯。腸癰成。此係外科。當考究。莫作傷寒治。混沌。

脈

汗雨而脈浮緩。表虛而邪未去。發黃而脈浮緩。肢溫繫在大陰。發狂而脈微沉。熱在下焦。結胸脈動。浮數陽氣內陷。發斑雖屬寒滯。然陽毒脈浮數。陰毒脈沉遲。鄭聲原爲虛邪。必脈浮滑者生。微弱細急者死。不發汗而吐血。脈浮緊者。熱在表。浮緊發熱。身無汗者。自愈。戴陽之症。脈無力。臟厥之症。其脈微。脈沉有力。陽厥之候。脈沉無力。陰厥

之徵。勞力感寒，脈洪數，寒邪大甚，戰汗浮緊，按之芤，其體大虛。浮大而數，按不芤，其體尙寔。頭汗脈細爲陽微，沉緊不得少陰病。洪滑有火邪當清，腹痛脈來沉寔有力，乃爲寔熱之痛。

方歌

文蛤散

文蛤散治膚粟起。喉間必有煩燥矣。潤陰文蛤直趨陰。解熱泄陽利水痞。

疏邪寔表湯

疏邪寔表湯桂枝羌活芍藥防風川芎白朮甘草。自汗傷風宜。