

東醫寶鑑

卷十七

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂甚者又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及

風乃大行民病殄泄霍亂體重腹痛筋骨搖併。

霍亂之病皆因飲食非關鬼邪千金。內有所積

外有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆

飲食所致此先哲確論也丹心。霍亂者揮霍變

亂也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂

然病本因飲食失節生冷過度以致溼熱內甚中

焦失運不能升降是以上吐下瀉入門。霍亂或

因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃

氣令人吐瀉併作用藥遲緩須臾不收華佗。霍

亂多責於熱故夏秋為盛入門。霍亂之病由風

霍亂形證

溼暍三氣之合成也風者肝木也溼者脾土也暍者心火也肝主筋故風急甚則轉筋也吐者暍也心火炎上故嘔吐也泄者脾土也脾溼下流故泄瀉也啟玄子曰皆脾熱所生也斯言為正子孫

霍亂證心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死正傳○三焦為

水穀之道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則

利而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節

清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變

亂乃曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利入門○霍

亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏暑而作入

門○人之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多

或起居失宜露臥當風使風冷之氣歸於三焦傳

於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干

飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心

痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有

發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹

脉法

刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之得效
霍亂脉浮洪可救脉微遲而不語氣少則難差得

效。脉多伏或絕。丹心。脉代者霍亂代而亂者

亦霍亂又關脉滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是

霍亂吐瀉之候脉代勿訝。醫鑒。滑數為嘔代者

霍亂微滑者生澀數而斷脉訣。脉微而澀或代

而散或隱而伏或大而虛或結或促或代皆不可

斷以死脉亂故也。正傳。脉浮大。則死。或戰或

而洪可救微弱而遲難救。正傳。脉浮大。則死。或戰或

霍亂有乾有溼

此病有乾霍亂溼霍亂乾霍亂死多

以泄出雖甚重胃中水穀泄盡則止矣所以死

少也乾霍亂死多者以其上不得吐下不得利

則所傷之物不得出泄壅閉正氣隔。理。本。不。可。救。

絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣。明。理。本。不。可。救。

乾霍亂治法

吐利不得謂之乾霍亂。乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯
方見寒門倍加橘紅與之或藿香正氣散
方見寒

門加官桂赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香

丸尤妙得效。乾霍亂最難治次在須臾升降不

通故也當先吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜

二陳湯
方見痰門加解散藥川芎蒼朮防風白芷

之類兼用薑鹽湯
丹心。絞腸沙者乃乾霍亂一

名也腹痛不可忍或手足厥冷乃腸胃絞縮在腹

也急用鹽湯吐之
入門。乾霍亂者氣痞於中吐

利不得所傷之物壅閉正氣關格陰陽煩躁喘脹

者必死急用吐法鍼委中
穴名出血兼服治

中湯
方見寒門或藿香正氣散必效
入門

薑鹽湯

中乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒
色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服
直指

溼霍亂治法

上吐下瀉謂之溼霍亂。凡霍亂吐瀉渴
為熱不渴為寒
海藏。熱多欲飲水宜五

苓散寒多不飲水宜理中湯
二方並見寒。霍亂

乃溼熱兼風木為害治宜散風寒利溼降火四時

通用藿香正氣散 方見寒門 寒月虛冷用理中湯

方見寒門 暑月煩渴宜黃連香薷散 方見暑門 俱

宜合五苓散 方見寒門 以分消上下更合益元散

方見暑門 降火尤妙 人門 ○霍亂吐瀉宜用木更

散二香黃連散加味薑附湯回生散加減正氣散

○中暑霍亂宜香薷散桂苓白朮散 二方並見暑門

○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末三錢棗

三枚薑五片煎極熱服一服可效或半夏末薑汁

點服或白礬末一大錢

沸湯點服亦效 得效

木更散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷水瓜吳茱萸食

鹽各五錢右同炒令焦餅盛白沸水三升入

藥同煎至二升冷煖任意服即效○如無前藥枯

白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋

一盞同煎服或鹽梅鹹

酸等物皆可煮服 入門

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脈沉手足冷藿

香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷

各一錢黃連澤瀉各八分甘艸三分右
剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服

入門

加味薑附湯

治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語
六脈沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢

半甘艸炙七分右剉作一貼水煎
服得效。一名四順附子湯

直指

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回
生藿香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服

入門

加減正氣散

異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂
或吐或瀉蒼朮二錢藿香厚朴陳皮縮

砂研香附半夏甘艸各一錢右剉作一貼
入薑三片棗二枚燈心一團水煎服

同春

香薷散

治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷急
煎此藥沉冷服之他藥不能

方見暑門

益元散

一名六一散治霍亂吐瀉取此
藥生薑湯調下妙

方見暑門
丹心

霍亂後轉筋

陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡宗筋失其所養故輕者兩腳轉筋

而已重者遍體轉筋入腹手足厥冷危甚風燭矣倉卒之際以鹽填臍中灼艾不計壯數雖已久而胃中有煖氣者立甦急用木萸散方見上加茴香甘州紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩腳掌心則雖昏危入腹者亦效入門○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急灸臍中又取蓼一把煎湯泡洗次投附子理中湯方見寒門即效綱目○霍亂後轉筋理中湯方見寒門加石骨一兩煎服海藏○一法理中湯去白朮加生附子一箇活人轉筋屬血熱四物湯方見血門加酒芩酒花蒼朮南星煎服丹心○吐瀉脇痛轉筋脉弦者木克土也平胃散方見內傷加木瓜五錢煎服入門○吐瀉後轉筋不止宜用木瓜湯直指

木瓜湯

治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒一錢甘州炙四分右剉作一貼入薑三片紫

蘇十葉鹽一撮烏梅

一箇同煎服直指

一法

治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也丹心

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散方見寒門椒豆散

麥門冬湯加減需

苓湯止渴湯諸方

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘艸各五錢白朮白茯苓

人參桂枝各二錢半右為末每三錢白

湯或新汲水調下生薑湯亦可綱目

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半合人參甘艸各

五分左右剉作一貼入薑三片烏梅一箇

水煎服入門一名九君子湯入門

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒藟豆各四十九粒右研為末新汲

水調下或水煎服入門。一名胡椒湯胡椒而不

加減薑苓湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓六錢

甘州各五分右剉作一貼

醫鑑

止渴湯

治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤

丹心

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛柴

冬梔子仁甘州各八分人參五分五味子十粒

同春

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參竹

葉半夏附子炮甘州炙各一錢右剉作一貼

入薑五片粳米百粒水煎服

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再

飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐

訖以理中湯藿香正氣散欸緩調治得效○又法

急以鹽湯一盞入童便薑汁頓服撥吐

令透未透再服吐後續用熨法入門

霍亂熨法

霍亂吐瀉心腹疼痛不可忍炒鹽二枕紙包紗

護頓其背前并腹肚上以熨斗火熨之氣透

則甦續以炒鹽熨其背則十分無事得效

○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效入門

霍亂鍼法

乾霍亂刺委中穴名出血或十指頭諸經井

穴出血皆是良法王傳○絞腸痧證手足厥

冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者膝腕上拍

打有紫黑點處以鍼刺去惡血即愈經驗○又法

用麻弦小竹弓蘸香油或熱水刮手足背額項

即愈經驗○乾霍亂者乃寒溼太甚脾被絆而不

單衣

水寒

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍

中大艾炷灸之不計壯數立效得效○霍亂

已然而腹中有煖氣者依土法灸之亦甦○霍亂吐瀉不止垂

又法灸氣海二七壯效得效○霍亂吐瀉不止垂

灸太樞即效○霍亂已死但有煖氣者灸承

禁忌法

霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽

漸而將息○霍亂吐瀉時慎勿與粟米粥湯

更...

六

助邪氣必所傷物盡然後稀粥漸漸養之入門○
霍亂時大忌飲食入腹則死只喫冰水不妨不可

飲熱湯切不可飲

熱酒燒酒山居

不治證

霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脉洪大不可治如脉微而囊縮舌卷者不治綱目○霍亂喘

脹煩躁者不治得效○乾霍亂吐瀉不得胃腹脹

硬面唇青黑手足冷過肘膝六脉伏絕氣喘急舌

短囊縮者死同春○脉微遲氣少不語為難治得

效○大渴大躁大汗遺尿者死同生散救之方見

上○中大又熱矣之不省人事者死○事

人見

水疾吐瀉

乘船大吐瀉渴飲水者即死飲童尿最好自
已尿亦好丹心○枯白礬末一錢百沸湯點

服亦好入門○船暈嘔吐大半天

夏湯法煎服效入門

凡二十

單方

一種

鹽

治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童尿一升溫和攪服吐下即愈本州

鍋底墨

治霍亂取二錢百沸湯一盞投其中急攪服吐瀉立止本州

甘爛水

治霍亂入藥煎用其妙詳見水部

生熟湯

一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物和鹽服之尤妙即百沸湯合新汲水也本州

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛尿一升同煎取汁服即效本州

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

林

便省神妙本州

蘆花

一名蓬蘽治霍亂氣息危急者取一把濃煎取汁頓服即差本州

皂角

乾霍亂鹽湯一椀入皂角末少許調服探吐即效本州

木瓜 治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之枝
葉功同。棋植與木瓜同功 本州

烏梅 治霍亂煩渴水漬
和蜜飲之妙 本州

林檎 青色者治霍亂吐瀉甚妙
煮取汁飲或嚼食之 本州

秣葛葉 治霍亂轉筋筋大如桃李攣摘
不可忍取葉濃煎湯飲之 種杏

粟米泔 治霍亂煩渴飲數升立差。又研米清
水和濾取汁服之主轉筋入腹 本州

糯米 治霍亂煩渴水研取
汁任意飲之 本州

蓼 治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗
因取飲一二盞即愈 得效

香薷 治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之即
止。治霍亂不可闕也 本州

小蒜 治霍亂吐瀉煮下
汁飲之 本州

牛糞

治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以水
煮濾取清汁頓服一升即止

煙鹿皮

或烟獐皮熏烟最多黃色者水浸搗
取汁頓服治乾霍亂即吐神效

醋

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取
禾絮漬醋煮令溫暴患處冷則易即愈

牛涎

小兒霍亂牛涎一
合灌下立效

嘔吐

嘔吐之因

內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱
甚則為嘔火氣炎上之象也

者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳
嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱
病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃
血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主噦
者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也
以半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因

脉法

寒氣客胃或因飲食所傷而致逆以丁香藿香半
夏茯苓陳皮生薑之類主之東垣。溼嘔者有物

有聲食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血
俱病故嘔比吐為重也入門。劉河間謂嘔者火

氣炎上此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有
氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心肺之分新

食不得下而反出者有胃中有火與痰而嘔者仲景
心。嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也

寸口脉數其人即吐。寸口脉細而數數則為熱
細則為寒數為嘔吐脉經。問曰病人脉數數為

熱當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令
陽氣微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中

虛冷故吐也仲景。陽脉緊陰脉數其人食已即
吐。寸緊尺滿其人胃滿不能食而吐脉經。脉

滑為嘔吐脉訣。嘔吐無他寸緊滑數微數血虛
單浮胃薄乳則有痰最忌瀼弱同春。跌陽脉浮

而瀼浮則為虛瀼則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐
暮食朝吐完穀不化名曰胃反脉經。脉緊而瀼