

瘟疫論類編卷之四

延陵吳有性又可甫著

諸城後學劉奎松峯訂正

福山後學劉嗣宗南瑛叅閱

撮要

前分諸論治法雜症爲三門此外又有不能以類相從者則位置於此卷中雖擬香寸玉莫不兼收而婦人小兒之瘟疫尤有不可不亟講者原擬補遺二字提綱領凡介在可遺者皆無閑緊要之事卷內諸條皆瘟疫中

男秉錦濯西編



南京中医药大学图书馆藏

所最不可闕者也編撮要

論飲

煩渴思飲酌量與之若引飲過多自覺水停心下名停飲

宜四苓散如大渴思飲冰水及冷飲無論四時皆可量與

益內熱之極得冷飲相救甚宜能飲一升止與半升寧使可

少頃再飲至于梨汁藕汁蔗漿西瓜皆可備不時之需如

不欲飲冷當易百滾湯與之乃至不思飲則知胃和矣

四苓湯

茯苓二錢澤瀉錢半猪苓錢半陳皮一錢

還不與非其
過飲須妨別
生此之謂也



長流水煎服。古方有五苓散用桂枝者以太陽中風
表症未罷併入膀胱用四苓以利小便加桂枝以解
表邪為雙解散猶之如少陽併於胃以大柴胡通表裡
而治之之意。今人但見小便不利便用桂枝何異聾
者之聽宮商。欲胃本無病邪者故五苓用白朮以健中
今不用白朮者瘟邪傳胃而渴白朮性壅恐以實填
實也加陳皮者和中理氣也

松峯曰講解分明

論食

瘟疫有首尾能食者

能食所感必輕病亦易愈

此邪不傳胃

邪傳胃則不能食

邪熱不殺谷也

切不可絕其飲食但不宜過食耳有愈後數日微

寫微熱

肌熱

不思食者此微邪在胃正氣衰弱強與之即為

食復有下後一日便思食食之有味當與之先與米飲一

小杯加至茶甌漸進稀粥不可盡意飢則再與如忽加吞

酸反覺無味乃胃傷也當停谷一日胃氣復復思食仍如

漸進法有愈後十數日脉靜身涼表裡俱和但不思食者

此中氣不甦當與粥飲迎之得谷後即思食覺飢如久而

不思食者一法以人參一錢煎湯與之少換胃氣忽覺思

食餘毋服

大便

熱結傍流。協熱下利。大便閉結。大腸膠閉。四者總之邪在

裡。其症不同者。在乎通塞之間耳。

熱結旁流者。

熱邪將糞結住。不能下糞旁止。能流下臭水。并所進湯藥。此句當如是講。

以胃家

實。內熱壅閉。先大便閉結。續得下利。純臭水。全然無糞。

日三四度。或十數度。宜大承氣湯。得結糞而利自止。倘

服之不得結糞。仍下利并臭水。及所進湯藥。因大腸邪

盛。失其傳送之職。知邪仍在也。病必不減。宜更下之。

原本此節提綱
下分列條目
不按次順應前
後倒置不便觀
覽今悉改正之

原本利止擡頭
為一節今接

協熱下利者其人大便素不調邪氣忽乘于胃便作煩渴

其泄瀉一如平時稀糞而色不敗其敗色但焦黃而已

此伏邪傳裡不能稽留于胃至午後潮熱便作泄瀉

後熱退泄瀉亦減次日不作潮熱利亦止為病愈倘潮

熱未除利不止者宜小乘氣湯以徹其餘邪而利自止

利止二三日後午後忽加煩渴潮熱下泄仍如前症此

伏邪未盡復傳到胃也治法同前

傷寒協熱下利與此不同

松峯曰凡遇瘟疫下利之症當先問其平日大便調

否以便施治



大便秘結者瘟邪傳裡內熱壅鬱宿糞不行蒸而爲結漸至更硬下之結糞一行瘀熱自除諸症悉去

松峯曰如遇不任攻擊者用蜜胆二導法

大腸膠閉者其人平素大便不實設遇瘟邪傳裡但蒸作極臭然如膠粘至死不結但愈蒸愈閉以致胃氣不能下行瘟毒無路而出不下卽死下之但得粘膠一去下症自除霍然而愈

瘟疫愈後三五日或數日反腹痛裡急者非前病復也此下焦別有伏邪所發欲作滯下也發于氣分則爲白積發



北京中醫藥大學圖書館藏

于血分。則為紅積。氣血俱病。紅白相兼。邪盡痢止。未止者

宜芍藥湯。見前

愈後大便數日不行。別無他症。此足三陰不足以致大腸

虛燥。此不可攻。飲食漸加。津液流通。自能潤下也。覺谷道

分擊上聲。悶。宜蜜導。或胆導甚則六成湯。大用力

愈後脉遲細而弱。每至黎明。或夜半後。便作泄瀉。此命門

真陽不足。宜七成湯。或亦有雜症。屬實者。宜大黃丸下之

立愈。此症絕少。不可不審慎

六成湯



熟地

錢五

當歸

錢半

酒洗 尚宜重用

白芍

一錢

天冬

一錢

麥冬

一錢

去心

錢

肉苁蓉

三錢

去 淨鹽

日後更燥者宜六味丸少減澤瀉

松峯按此方乃潤燥之劑明白易解至云用六味丸

少減澤瀉不如盡行減去即茯苓亦不當用蓋此

藥大利小便小便益利大便益結也不可不知

七成湯

補骨脂

三錢 炒研

熟附子

一錢

與肉果亦可加肉果亦宜

茯苓

一錢

人參

一錢

甘草

一錢

五味子

八分 炒研

服之愈後更發者八味丸倍附

子

小便

熱到膀胱。小便赤色。邪到膀胱。干于氣分。小便膠濁。干于

血分。溺血畜血。留邪欲去。小便數急。膀胱不約。小便自遺。

此症虛實寒熱。膀胱熱結。小便閉塞。此症總無虛寒。維癰
皆有。不獨瘟疫。亦有之。不獨瘟疫。

劉南璞曰。熱邪分說妙。

熱到膀胱者。其邪在胃。胃熱灼蒸于下焦。在膀胱。但有熱

而無邪。唯令小便赤色而已。其治在胃。或流或下

邪到膀胱者。乃瘟邪分布下焦。膀胱實有之邪。不止於熱

也。從胃家來治在胃。攻兼治膀胱分利若純治膀胱。胃氣



二方一則純利
小便一則行血
而兼之養血

兼熱邪言乘勢擁入膀胱非其治也若腸胃無邪獨小便

數或下白膏如馬溺此邪干氣分其治在膀胱宜猪苓湯

猪苓湯 邪干氣分者宜之

猪苓 車前 澤瀉 木通 甘草 八分

滑石末 燈心引

桃仁湯 邪干血分者宜之

桃仁 湯泡去皮尖研 阿膠 丹皮 當歸 滑石 末

錢 如小腹痛按之硬痛小便自調有蓄血也加大黃

生熟 三錢 甚則代抵當丸藥分三等 原方一也加大黃

酌用 二也抵當三也



隨其病之輕重施治。

應下諸症

頭脹痛

胃家實氣不下降下之痛立止若瘟疫初起頭痛別無下症在葛可下邪在經也

日赤

咽乾內熱極宜下

鼻孔如烟煤

瘟毒在胃宜下

唇燥裂

唇焦色

唇口皮起

口臭

胃熱多有此等症固當下但唇口皮

起仍常用

別症互較

口燥渴

更兼有下症者宜下之下後邪去胃和渴自減若服花柳門冬知母生津止渴殊謬苦大淫脈長

洪而渴者未可下宜白虎湯汗更出身涼渴止

鼻孔如烟煤在
不治蓋云宜下
豈尚可救耶



此段診案不亮

軟胎尚當觀其
未可必其早

舌白胎漸變黃胎

邪在膜原胎白邪在胃家胎黃胎老變為沉香色白胎未可下黃胎宜下

白砂胎

白胎乾硬如砂皮一名水晶胎乃白胎時津液乾燥今邪雖入胃不能變黃也宜急下之

胎潤澤者邪在膜原也邪微胎亦微邪氣盛胎胎積滯其舌未可下久而胎色不變別有下症服三消飲

即變黃

舌黑胎

邪毒在胃薰騰于上而生黑胎有黃胎老而變焦色者有津液潤澤作軟黑胎者有舌上乾燥作硬

黑胎者下後二三日黑皮自脫又有一種舌俱黑而無胎此經氣非下症也妊娠多見此陰症亦有此並非

下症下後裡症去舌尚黑者胎皮未脫也不可再下必有下症方可下舌上無胎沉無下症誤下舌反見離

離黑色者危

急當補之

舌芒刺

熱傷津液此瘟毒之最重者急當下老人微瘟無下症舌上乾燥易生胎刺用生脈散生津潤燥



刺自去

舌裂 日久失下血液枯極多有此症又熱結旁流日久不

症急下之 流在下部則津液消亡在上部則邪火毒熾并有此

凡舌裂原難滿 雖病勢急不能 無張

舌短 舌硬 舌卷 皆邪氣盛真氣虧急下之邪毒去真

心下滿 心下高起如硯 心下痛 心下脹而且痛

腹脹滿 腹痛按之愈痛 皆胃家邪實內結氣阻宜下之

大便閉 轉屎氣 亦作轉矢氣 極臭 更有下症下之無辭

裏症為虛燥 宜蜜胆導法 大腸膠閉 協熱下利 熱結旁流 見前

小便閉 以大便秘不通氣結不舒也大便秘行小便立解誤服

虛燥乃難症 中無此或老人 遍後腹有虛 法不論人之虛



實是
小便閉亦有
因大便閉者

小便赤黑

涓滴作痛

小便極臭

皆內熱之極宜下

揚手擲足

內熱極宜下

四逆

脈厥

體厥

並屬氣閉陽氣內鬱不能四布于外胃家實也宜下下後反見此症者為

虛脫
宜補

脈沉而數

氣噴如火

俱內熱極宜下

善太息

胃家實呼吸不利胸膈痞悶每欲引氣下行故爾

松峯曰古人所謂長太息者即此之謂乃嘆息之聲長

吁氣也因氣不舒暢每一吁氣始覺寬鬆茲解以呼吸

不利引氣下行尚不甚真切



登高而歌棄
衣而走狂言罵
詈不避親疎皆
是

張步衢曰善太息非獨瘟疫為然雜症亦有之當察
脉症始得

發狂

胃家實陽氣盛宜下有虛煩似狂有因飲汗作狂並
詳見本條

潮熱

熱因時發邪在胃有此症宜下然又有不可下者
載似裡非裏熱入血室神虛譫語三條內

松峯曰原文位置顛倒而且不倫如方言咽乾即繼以
便赤正說閉結即繼以頭疼令閱者茫然失次讀者總
難記誦今按人之一身自上而下稍為順序之脉訣神
志氣息另附於後使各以類從俾有層次以便觀覽

應補諸症



數句固非此題
正同不過引來
說但習瘟疫
利者不可不牢
記心懷更富着
眼字

用補驗效于本
日第指瘟疫用

向謂傷寒無補法者蓋以傷寒瘟疫均是客邪有邪誤補然

傷於寒者不過風寒乃天地之正氣尚嫌其填實而不可

瘟疫

補今感疫氣者乃天地之毒氣補之則壅裏其毒形於

熾是以故誤補為害尤甚于傷寒此言其常也及言其變

又有應補者或日久失下形神幾脫或久病先虧或先受

大勞或老人枯竭皆當補為兼施設獨行而增虛症者句

亮

宜急峻補

虛症散見諸篇

補之虛症稍退切忌再補

詳見前補虛後實

後虛症不退及加變症者危下後虛症不見乃臆度其虛

輒用補劑法所大忌凡用補本日不見佳處即非應補益