

(卷之十八)

驗方新編

第六本

驗方新編卷之六

癰毒

癰疽論

王洪緒曰癰疽二毒由於心形止數分乃係小癰按之陷
滯而發毒毒借部位而名藥者膿尚未成按之隨指而起
者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃係小癰按之陷
而不即高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成按之隨指而起
頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿久留醒
消一品立能消腫止痛爲療癰之聖藥白陷稱疽疽發五
臟之疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血緊附
也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內
也紫黯不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者

氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有腠裏火
毒之滯疽有腠裏寒痰之凝既出膿後癰有熱毒未盡宜
托疽有寒疑夫解宜溫既患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熱
毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別閱古書總未詳
因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其
初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝已潰而陰血
乾枯非滋陰溫暢何能厚其膿漿蓋氣以成形血以華色
故諸疽平塌不能還毒者陽和一轉則陰分凝結之毒自
能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣
未盡之時通其腠裏之功仍不可緩一容一縱毒即逗留
一解一逐毒即消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以
成膿猶無米之炊也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則

寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶車粟
以助盜糧矣滋補不兼溫暖則血凝氣滯孰作釀膿之具
猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知
一概清火以解毒殊不知毒卽是寒解寒而毒自化清火
而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化
必由溫也豈可涼乎況清涼之劑僅可施於紅腫癰癤若
遇陰寒險穴之疽溫補尙虞不暇安可妄行清解反傷胃
氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃
有開生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健
則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之劑仍
以犀角羚羊連翹等性寒之藥始終咸當禁服癰之與疽
戢然而金湯症爲難陰症爲疽治法迥別世人以癰疽連

呼並治貽害無窮古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生^{別號山人}所著外科全生一書乃其世傳秘本部析陰陽虛實之理至精且備不施昇降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭於指掌可以不學而能書只前後兩集其價甚廉板存江南省城湖南湖此書坊間亦有賣各宜購置一部不唯目便亦可濟人留心瘍醫者尙毋忽諸

癰毒治法

凡患色紅腫痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尙未作膿以洞天嫩膏貼之內服醒消丸熱陳酒送下三錢卽止其痛夜間得睡次日皮卽起皺再服全消如過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫服藥破者用代刀

散酒服卽穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背
心腦後腰腹肚腋陰囊等處險要之地用五通丸醒消丸
早晚輪服一次用散毒皮皴痛息若已穿破用托毒散醒
消丸早晚輪服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名
癰用蟾酥丸梅花點舌丹卽愈此林屋山人經驗方也
癰毒諸症

肺癰

方見肺部

腸癰

腸癰有生於腸內者腹內脹急大小便壅痛如淋轉側搖
之如水聲潰後則膿從大便出有生腸外者肚臍腫痛作
脹或一足腫曲口有臭氣或腹自脹出甚則腸穿有虫自

臍中出勢難為計初起宜用牡丹皮散以消之潰爛即用
參芪內托之劑

牡丹皮散 牡丹皮五錢 苡仁一兩 瓜蒌仁二錢 桃仁去皮尖研

水煎服此孫真人千金方也

又方 多服六一散見內外備用諸方膿血從大便出膿盡即愈

至神至穩之方也

又方 皂角刺用八錢酒煎至七分溫服膿血從大小

便出而愈不飲酒者水煎亦可

又方 大黃炒 朴硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢

空心煎服小腹堅硬而熱按之則痛肉色不變或紅赤微
腫出汗畏寒小便亦多脈堅實而有力服此神效

肚癰

肚腹生癰即腸癰也照上腸癰各方治之

臍癰

方見肚腹諸部

懸癰

方見海底部

對口

方見頸項部

發背搭手

均見背部

魚口便毒

方見陰疽門橫痃症

遍身肢節生瘡

此名疔蝕因風寒所搏氣血凝滯故也用蠶繭每繭一個入白礬五分火煨過之後每礬一兩另加陀僧五錢白芷一錢研末用蜜調敷

筋骨疼痛潰爛生瘡

此因誤服輕粉及丹石諸藥以致毒凝筋骨日久不愈香解救諸毒門輕粉毒方治之

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢

此丹毒也照後遊風丹毒各方治之

身生庖瘡如塊如核

此流注也與上遊風丹毒忽然而發者不同照陰疽門流注方治之

疔瘡

凡疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法見後

疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有三日三日而不
死至一月半月而終死者其毒最烈或發寒熱或發麻木
或嘔吐或煩燥或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青黑或
心腹脹悶或精神沉困或言語顛倒此皆生疔之症其形
或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或紫或有紅絲
名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆合本入嚼之
如無豆腥之味卽是疔瘡

疔瘡多生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺
若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生
者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等
症卽於遍身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻肩下兩腋手足
甲縫糞門陰戶等處更宜細看一日須看數次有則照方

醫治若前心坎後背心有紅點者卽照後羊毛疔方治之
如尋覓不見取飯中氣垢少許納口中必有一處痛甚卽
知疔瘡所在須急宜刺出惡血以見好血而止諸瘡及刀
鏹疔忌用刀針餘疔不忌如毒重者急服護心散見瘡毒方
或菜子油一碗真蘇油亦可以免毒氣攻心若服菊花飲亦可
蜘蛛拔毒法 先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一個大越
越放疔瘡上蜘蛛一見自能奔往吸拔其毒少時蜘蛛不
動卽取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛再行吸拔或
另取蜘蛛用之以毒盡爲止無論疔在何處雖毒重痛極
不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指
生蛇頭瘡及毒蛇毒虫咬傷皆可照此拔毒
菊花飲 白菊花葉連根 隨取自然汁一茶鍾滾酒兌服

用酒者服亦可

不如生汁為妙渣敷患處留頭不敷蓋被

睡臥出汗其毒自散無論生在何處雖欲氣絕亦可起死

回生至穩至便至靈諸方皆不及此不可遲疑自誤無藥

用根如無即用藥店中乾白菊花

四兩少甘草

四錢酒煮

溫服亦可

大戟膏

見瘟毒諸方

敷之即愈再發再敷無不神效

地丁飲

紫花地丁

一兩

白礬

甘草

各三錢

銀花

三兩

煎服各症俱效有人生紅絲疔已走至乳旁服之立愈真

神方也

葱礬散

明礬

三錢

葱白

七個

二味共研爛分作七塊每

塊以熱酒一鐘送下服完即睡蓋被取汗如無汗再服葱

頭湯一鐘少頃汗出如淋其病若失此方不但治疔一切

惡症皆治初起未成膿者更妙

烟油膏 用烟桿中烟油厚敷四圍留頭不敷少刻疔破出水而愈奇效如有紅絲者用烟油雞絲三分處敷之絲即不走

又方 黃色糖雞糞厚敷四圍將疔頭挑破不敷極效

又方 生黃豆嚼爛敷之極效

頭面諸疔 救唇湯 紫花地丁 金銀花各一兩 白菓仁

個桔梗 生甘草 知母各錢 水煎服至重三劑必愈此

方治頭面口角疔毒俱效唇疔更妙

又方 一人口唇生疔七個頭腫如斗心悶神昏百藥不

效後有人云此名七星趕月用蛔虫搗爛敷之頃刻瘡口

流出黃水腫消神清次日全愈如無蛔虫以五穀虫一錢

瓦上焙研末白礬三分蟾酥三分以燒酒溶化也謂之軟
片上少刻片亦破流毒水而愈

又方 凡口唇生疔看大腿灣中如有紫筋用銀針刺出
血即愈有人不知疔在何處但唇內癢極須與牛面腫硬
痛甚見腿後起有紫筋刺之立效

又方 雄雞冠血點上其效如神

又方 大蝦蟆 個 取肝貼之立消兼治面上生疔對口

疔等症

又方 生蜆 去壳 搗融敷即消

又方 烏色草魚鱗取反切片貼之隨貼隨乾乾則另

換換至數十次即破口而愈矣

此疔而走最決生於是者其紅絲漸長至臍生

於子者紅絲漸長至心生於唇面者紅絲漸長至喉至則不可救矣手足兩處可用頭髮離絲一二寸遠緊捆住並將絲頭刺破或用燈火或用艾火在絲頭燒之絲即退散而愈不散再燒以散爲度其效如神或照各前方治之刀繭疔 疔形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是思用針刺用前葱蒜散服之並糖鴉糞敷之即愈是則毒歸心腑致命

羊毛疔

初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如

疹子形先用針挑破取出羊毛再用明雄末二錢青布包

朴_辛熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍團擦之漸

漸擦入瘡眼其手卽奔至後背心再於背心照前擦之其

羊毛但拔於布上卽埋入土中內服菊花飲或葱白飲地

丁飲俱見護心散見毒方俱可

羊毛疔痛 此症忽起一泡其形如屑內有羊毛亦名羊
疔初起或頭痛或發寒熱即是用黑豆蕎麥等分研末
挑破敷之毛落即愈內服菊花飲亦可

疔瘡出血不止 飲苴麻油一大碗即止或飲燕子油便
疔瘡走黃 凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃
急用芭蕉根搥汁服之立可回生或煎前菊花飲地丁飲
服之均妙

拔疔根法 疔毒重者好而復發此疔根未出故也若不
急治再發則根愈深而難治矣 苴麻子去油乳香去油
共搗爛用飯和為餅貼之少時疔根自可

又方 葱白加蜜搗融將疔刺破敷之如人行五里其根

自出又癰毒諸方門紅膏藥方拔片最效

楊梅瘡 此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服
輕粉服則毒留筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者
可用解輕粉方見解毒門治之

紅棗丸 紅棗三斤以杉木作柴煮之煮熟剝皮去核多
取燒過杉柴枯炭磨細末和棗肉搗勻爲丸如彈子大每
日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一
切丹石隱藥致成結毒穿頂穿鼻潰爛不已多年不愈者
服之大有奇效至穩至靈此治楊梅結毒第一方也愈後
再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛濕熱之
侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒又名青椒及一切發物牛
年外用蝦蟆散