

新刊體仁彙編卷八



邪之所爲也內經言人傷於寒者則爲病熱者言當
言變也仲景謂或寒或熱而不一者備常與變而弗遺也
且陽邪傳者常也陰邪傳者變也且夫陽邪以日發熱七
八日不解此表證在當發其汗又少陰病得之二三日口
燥咽乾者急下之宜大承氣湯主之此皆不以日數而言
也守真曰誰敢二三日便以大承氣下之蓋聖人書不盡
言言不盡意說其大槩爾蓋太陽爲諸經之首傳變最多
且邪熱乘虛之經則傳也若經實則不受邪而不傳也且
夫太陽水傳陽明土乃妻傳夫謂之微邪陽明土傳少陽
木亦曰妻傳夫乃微邪也少陽木傳太陰土乃夫傳邪謂

之賊邪大陰土傳少陰水亦曰夫傳妻乃賊邪也少陰水
傳厥陰木母傳子謂之虛邪太陽水間傳少陽木乃母傳
子亦曰虛邪也太陽水越經而傳太陰土謂之微邪又曰
誤下傳也太陽水傳少陰水此乃陰陽雙傳即兩感太陽
水傳厥陰木乃母傳子謂之虛邪又曰首尾傳也夫傷寒
傳至厥陰肝經爲尾蓋厥者盡也正氣將復而邪氣將解
水升火降寒熱作而大汗解也若正氣不復邪無從解陰
陽勝極則四肢厥冷舌卷耳聾囊縮不知人而死矣趙氏
曰大抵邪在陽經則易治傳入陰經則危殆蓋陽微而陰
盛正虛而邪實也況誤下內陷汗虛別經則壞其領

足也。胃經圖乃兩陽合明於前也。一曰府者居中土
萬物所歸也。其脉起於鼻頰上頭額絡於目循於面行
之前終於足也。經曰傷寒三日陽明脉大又曰尺寸俱長
者陽明受病也。其政頭額痛目疼鼻乾身熱不得卧乃標
病也。若本病則身熱汗出而惡熱也。本實則潮熱大便不
行也在標者當解肌在本者宜平熱本實者可下夫陽明
有三一曰太陽陽明大便難者小承氣湯主之二曰正陽
陽明胃家實也大承氣湯下之三曰少陽陽明胃中燥熱
實不大便者大柴胡湯主下之

足陽明胃經圖

第二日



鼻起

厲兌止

足少陽膽經圖其肝起於臍上頭角之中猶則
身之側終於至足也前有陽明後有太陽居二陽之
中以主半表半裏經曰尺寸俱弦者太少陽受病也其
痛目眩口苦胸滿耳聾脇痛也或心煩喜嘔或胸中煩悶
而不嘔或心下病鞭或寒熱往來或發熱寅申時左盛或
身微熱者皆少陽也凡治有三禁不可發汗不可下不可
利小便也其宜和之惟小柴胡湯出入增減用之如神効
也凡頭角痛耳中痛耳中烘烘而鳴耳之上下前後腫痛
皆少陽所主部分其火爲之也若口苦者少陽之膽熱脇
下鞭者少陽之結也

足少陽膽經圖

第三日



脾經圖脾爲中營宮之坤土也其脉起於足大

上行至腹絡於噤連舌本行身之前也若寒邪卒中直
本經者一時便發腹痛或吐或利也宜溫之如四日而發
腹滿噤乾者此傳經之邪也宜和之若太陽病下之早因
爾腹痛者此誤下之而傳也凡治太陰證自利不渴脉沉
細手足冷急溫之若脉浮者可發汗宜桂枝湯主之若發
熱脉數者少陽之邪未解須以小柴胡湯主之如自利不
渴者藏有寒也宜理中湯寒甚者加附子腹滿嘔吐食不
下者宜治中湯手足冷脉沉細者宜四逆湯若傳經邪熱
內陷腹痛者宜桂枝芍藥湯主之

足太陰脾經圖

體仁彙編卷八

第四日



耳止

脾經

足少陰腎經圖爲人身之根帶也其脉始於足心上行
脊循喉絡舌本散手下注心中行身之前也若因慾事所
虛者寒邪直中之也其證一二日便發故發熱脉沉足冷
或惡寒倦卧也宜溫經而散寒也若五六日而發口燥舌
乾者此傳經之熱邪宜急下之恐腎水乾也如其脉沉細
足冷者又不可下急溫之脉沉疾有力者乃可下之凡少
陰飲水而小便色白者下虛有寒引水自救非熱宜溫之
蓋少陰傷寒多因勞傷腎經之所致有緊有慢其害甚速
宜溫之不可以寒涼之藥妄投之也但脉沉足冷雖發熱
者急宜溫腎以扶元氣

足少陰腎經圖

第五目



足少陰

腎

湧泉起

建辰陰肝經圖厥者盡也爲六經之尾也其脉始於
大指上環指抵少腹循脇肋上口唇與督脉會於顛頂行
身前之側也若本經不足寒邪直中之也一日便發吐利
少腹疼痛其甚者唇青厥冷囊縮急宜溫之并着艾灸丹田
氣海以溫之若六七日發煩滿囊拳者此傳經熱邪厥深
熱亦深也若脉沉疾有力者宜急下之若脉微細者不可
下也凡傷寒傳至厥陰經則病勢極矣然死生在于頃臾
可不謹察之也哉大抵熱深厥亦深則舌卷囊縮陰寒冷
經亦舌卷囊縮也要當仔細而辨其冷熱之始其法微矣

足厥陰肝經圖

第六日



凡論考傷寒六經傳變至六日盡病則已而多
有專在一經而不再傳亦有一日双傳爲重者年辨
之古又云傷寒不服藥爲中醫病自安此爲醫者之
錯悞而言也

傷寒至捷法

發熱惡寒身體痛脉浮無汗怎生醫十神湯與香蘇散有
汗傷風用桂枝

四五日來口舌乾發熱身疼睡不安先服人參敗毒散小
柴胡湯在後者

七八日來熱在內口渴心煩腹脹彙小便赤少大便難大

柴胡湯好通和

發熱口乾大便洩小便赤少煩燥結小柴胡湯兼五苓加

止黃連真一絕

汗下之後病不解依然熱渴如見怪解毒湯兼小柴胡諸

般熱病皆無碍

傷寒有四證相類

食積寒痰并脚氣更兼亦有患勞煩要識四般相類證不

與傷寒一例看

此四證皆發熱惡寒若似傷感表證一同而用藥却

異不可混治故詳之

邪氣未除而真氣已涸死者必矣又別有半在表半在裏之證及無表裏之證不惟皆不可下亦皆不可汗但隨證治之

○九傷寒飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度病人大渴當與之水以消熱故仲景以飲水爲欲愈人見此說遂令病者縱飲因而爲嘔爲喘爲咳逆爲下利爲腫爲悸爲痞爲結胸小便不利矣且如病人如飲一碗只與半碗常令不足爲

○七傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房及食諸