

救
偏
瑣
言
三

救偏瑣言卷之六

申明貫珠攢簇怪症

症不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有
形相似而離乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間
乎其內者有一於此空地雖多亦何取焉須知氣毒
深藏氣血鋼閉毒無領載症不得透故多源地內部
受其殃其實珠攢簇者氣毒衝突氣血不能為一
任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊
者外見堆聚攢簇誠中形外信不誣也是毒頑而不

鬆伏而不透猶賊之巨魁也此毒不治諸症皆為坑
拒治不以攻治之何益巨魁授首前途不戰有倒戈
之勢然世於貫珠者習矣不察而多忽於壘竊者歸
咎于命而棄絕焉興言及此亦慘甚矣庶狀其圖象
或得觸目經心詳其治法或得挽回於萬一未必無

小補云

遊蚕

是瘡貫珠成條其形如蚕故
名遊蚕有稀密有長短身上

者輕頭面者重身上短而稀

可見無多者輕長而密更繁

多者重重則必攻今鬆透如

一赤豆莢其毒方起

疊錢

是瘡圓圓簇攢絕不臥點錢
許之大故名之也僅見三

者輕多者重則必以藥

胭脂膏封貼更和猪尾膏大

桑蟲子割肉透之令毒如蒸

飯其毒方透

燕窩

是瘡攢簇象似燕窩而
名者也單見尚重見而不

者不急治攻之拆令鬆抬如

餅其毒方化以油胭脂化

毒丹用綿紙攤貼更佐以

猪尾膏大桑蟲

雁行

雁行者狀似遊蚕但曲而甚
長且排行而若雁字也單

見者亦重不累及重連攻

之鬆若遊蚕而毒化矣

鼠跡

是瘡或因五粒或六七粒相簇

如鼠跡故以是名無多者

輕見于周身則重重則必

攻令相併成泡其毒亦甚

劑內調以化毒丹并搽虎

膏



蠱沙

跡者其瘡而潤歪斜無

頂無盤有細點如沙積簇于

囊宛似蠱沙而名之也可

以數紀者輕偏及者生之

則必攻毒令其毒盡去

殺其毒蠱化而成膿

鳥跡者連串二條頭殺脚

聞其瘡若鳥之跡也卑

見者輕五六成其重

者必攻亦如遊毒製透

為準

珠殺

珠殺者其瘡有頂而平

四圍貼附一細圈宛如珠殺

無多者輕及于周身則重


重者必攻務令圓滿旋

去其毒乃速



鳥跡

蟹爪



蟹爪者貫珠連串，其細如髮，稍有隱患，忽如髮竟與蟬爪無異。無感者，輕蟬多者，重重者，必攻其形，統脹成條，而毒盡滅矣。

蛇皮



業取簇成，凡散多無向，其收皮而者之也。見此不治，或見點之初，燈下照之，隱簇簇細密，無倫將形未形之際，即便攻之，以猪尾膏破之，不使其成底，可省毒。

履底



履底者，形似蛇皮，不若蛇皮散漫，身直處皆凶，其形得小，更得年治，底可有為速以猪尾膏如攻毒劑內，并大蠶虫遠之，急以藥胭脂膏封貼，令得膿水淋漓，方能廣生。

喜窩



喜窩者，較蠶錢而更大也，刀割其者，其形大，其毒亦更重也。即底指無多，毒已不淺，攻之自不容已。佐以大蠶虫猪尾膏，亦以藥胭脂貼之，得新法平治，方可成膿。

螺

其毒頭大根尖項黑形若螺

肉深于肉裡有大小有淺

按其圍板破治法見于餘毒若

放點時而即見者最惡先以挑

鬆即將應服之藥去人含于口

中吮其數次隨用貼法

是症連串環繞故以是名有瘡

因鎖阻症即如鎖而繞者有

項以圈繫症即如圈而繫者

于項稍輕于項稍重因阻尤

重無因更重非特項端為

然頭身亦有之凡見且改



紫背

麻之形似其色以紅之背

紫而紫點有大有小目之有

點手按其形無幾便生膿

多者莫救急宜攻毒破麻

初令漸浸淡而速去方可

回生必須早圖



遊蚕治驗

吾宗連疇四歲一愛身熱如火神情昏貴兩頰通
紅鼻衄成流身上隱隱數點色滯乾紅以必勝湯
減紅花地龍如佐參二劑後紅中泛點細碎如麻
周身稠密如舖而多遊蚕珠穀亦間乎其間前方
服至三朝兩頰界地未清却成顆粒滯色畧轉每
劑加大毒蟲一枚六朝滯變為紅色猶如蟬唇口
腫裂前方減蟬蛻葛根加黃連石膏七朝放白珠
穀泛頂九朝遊蚕統脹成條時或暖而腹痛熱猶

火熾十一二朝頭收斂而面燥身漿滿而盤暈猶
赤神情尚困而未舒以一方貫及十六朝發臭異
常二十朝諸症頓愈寢食得安而收全功後左眼
赤痛多淚以撥雲散治之得痊

蟾窩治驗

張又卓兄一小公郎方一歲一日壯熱如烙遍體
如霞瘡不甚密色滯不平有蟾窩見於手背神情
愁楚不時叫哭是腹痛使然以消癰快毒湯加大
黃臨服和桑蟲一枚日服二劑手背以胭脂封貼

六朝霞色清愁眉散手背髮浮泛白七朝氣導血
附俱放白成漿熱勢減半去大黃蟬蛻黃連加連
翹佺參日服一劑十二朝回好

疊錢治驗

一錢氏子四歲症在五朝唇烈掀腫體熱如火頭
面稠無滯地身上疎朗板實禁紅四肢胸脇疊錢
者不一而足躁亂不寧以涼血攻毒飲如山查地
丁減犀角和大桑蟲一枚日服二大劑更以金汁
日服盡餘外用胭脂膏封貼至八朝鬆泛如蒸餅

十朝通身漿足十二朝發臭收結十四朝身熱始
和寢食俱安方易忍冬解毒湯收功

珠穀治驗

韓六龍兄一公郎六歲乙未仲夏一日忽體熱如
爐頭面通紅神情昏憤見痘現無餘地僅不細碎
盤若塗珠內有珠穀幾半以涼血攻毒飲倍生地
大黃去^紅花紫草加^紅參地丁四朝如黃連每劑
和^紅桑蟲一枚五朝神情清爽七朝珠穀皆透減
蟬蛻葛根桑蟲九朝漿足十朝^紅暈漸淡飲食漸

進頭面收結十二朝壯熱方和遂去大黃減生地
及丰十六朝回足如此血熱不致帶火成痼底肌
抓肉大黃生地荆芥之力不淺也後以忍冬解毒
湯調治諸痼未久膿理未固餘毒亦未盡淨見風
大早忽爾昏暈急以疎風消毒飲而愈

鼠跡蠶沙治驗

吾宗僦如一子一日身熱如火汗出如油神情困
苦難支似瘧非瘧數點隱隱于頭面色滯乾紅瘡
本是而若非且熱如火汗如油非惡瘡不爾以清

熱透肌湯未用生地加大黃二劑後次日頭面細
碎如麻身上見點處若集隱伏處若無此氣為毒
滯而通塞不均也又二劑頭面顆粒分明色亦覺
潤汗即頓收偏體湧出內向眾跡款沙難以數紀
囊窠不鬆色近于血此血為毒鬱而未著非血虛
白也不則有一體兩局者乎前劑每服加大桑蟲
一枚五朝窠腳漸鬆囊頂未起色轉深紅神情得
定熱不稍減前方重以生地加黃連石膏至九朝
頂縫食減稀粥碗許十一朝鼠跡與之款沙俱得坑

脹如泡而漿俱濃十四朝盤罩始淡頭面收結十
六朝身得溫氣日強方易忍冬解毒湯調治
至二十朝收功弗藥

雁行治驗

有一段氏子三歲見痘三朝兩額細如蚕種背多
雁行更有瓢沙間手其間椒紅其色味咸不已熾
熱如焚以清涼攻毒飲和桑蟲一枚日服二劑四
朝額即成顆六朝色即紅活八朝怪象俱統脹放
白十朝漿足猶然悲楚不能進食一方服及十四

朝眉宇方舒得進飲食身體溫和一朝霍然收瘡
落癰而愈

蛇皮治驗

一女年及十四歲倏然身熱如火神即昏憤兩眼
如畏刀鋸偏體如霞瘡未及見死期若將至矣即
以大黃石膏一兩生地七錢佐以荆芥赤芍青皮
葛根木通半兩日投三頭汁次日午後見瘡細似
坑沙色似紫紅通身無一隙地前方又服四劑即
成點粒却稠密如舖方叫腹痛累知人事大渴不

已揭衣棄被前方如黃連犀角生地兩事并大桑
蟲服至九朝始得紅潤周身起脹十一朝貫漿連
成一片如松皮不能轉側大便日去四五次水米
不沾十四朝發臭滿室頭將收結唇黑如煤身若
寒戰熱仍如火一方貫至十六朝頓思飲食夜臥
得半熱渴稍減二十朝外痂成一片如蛻一殼得
脫此難方易忍冬解毒湯月愈餘全愈約用大黃觔
半生地石膏二觔餘是症得治予未見之前更得
首尾一轍庶得挽回若今見點其勢便成牢不可

破矣

蟹爪治驗

中介周老先生三公郎方半週痘出稠密如鋪色
滯乾紅粟粒平板內多蟹爪身體壯熱脈惕筋抽
時在二朝以鬆肌透毒散加大黃七分和入桑蟲
錢許一枚日服二頭汁次日粒數即減落四朝紅
潤八朝鬆泛九朝行漿遂減大黃十朝安睡乳食
如故大便如常收回而愈

燕窩治驗