

家

藏

蒙

筌

九

家藏

輟

脫

後學王世鍾小溪氏

大腸其血氣衰壯者大腸之門也肺熱則大腸燥結肺虛則

大腸滑脫如肝一證其因不一有因久濕久痢脾腎氣陷而

脫者有因氣虛者有因酒熱傷脾色慾傷

腎者有因氣虛者有因酒熱傷脾色慾傷

家藏蒙筌卷八

目錄

家藏蒙筌卷八

脫肛

汗證

虛損勞瘵

死證

脉

內傷

血證

飲食

脾胃

眩暈

家藏家卷八

後學王世鍾小溪氏纂輯

脫肛

大腸與肺爲表裏肛者大腸之門也肺熱則大腸燥結肺虛則大腸滑脫若脫肛一證其因不一有因久瀉久痢脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因酒濕傷脾色慾傷腎而脫者有因稟賦怯弱腎關不固而脫者有因濕熱下墜而脫者但此症屬實熱者少屬虛寒者多虛人氣血多衰小兒氣血未旺皆易脫肛經曰下者舉之徐之才曰濡可去脫皆治脫肛之大法也故古人之治此者多用參芪歸朮川芎甘艸升麻

之類以升之補之或兼用北五味烏梅之類以固之澁之外用
薰洗摻藥苦久出而堅者先以煖藥湯澆軟漸漸納入若腸頭
作癢者多因大腸濕熱生蟲而蝕肛門上唇有瘡蟲蝕其腋下
唇有瘡蟲蝕其肛初治宜服化蟲丸外用生艾川棟根煎湯薰
洗至若蝕肛透內者不治

按古法脫肛之症不越乎升舉固攝益氣之法如氣虛下陷而
脫者參芪歸朮升麻炙甘草之類如腎虛不攝而脫者熟地山
茱萸五味虎絲之類如兼濕熱而脫者陰八味加黃連槐花之
類如因久痢脾虛而脫者補中益氣湯加醋炒白芍之類如婦
人因產用力太過而脫者四物湯少用川芎加參芪之類雖所

患不一均宜以升舉固攝益氣為法而更察其所因以

新法云

穀道痿痛多因濕熱生蟲宜以雄黃末和艾燒烟薰之或用桃

葉一斛搗爛蒸熟納入小口瓶中乘熱坐生立死

補中益氣湯

見補益門此治氣虛下陷脫肛者內服本方外用

腸即愈小跳者係公蚯蚓

參朮芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參

白朮

當歸

醋炒

黃芪

酒炒

山藥

白芍

白苓

各三錢

炙甘草

一錢

川芎

一錢

升麻

一錢醋炒

按此方若治泄痢虛滑脫肛者於本方內須加製附子肉豆

蔻通包煨搥去油紅棗

涼血清腸散

治大腸血熱脫肛

生地

當歸

醋炒

白芍

各三錢

黃芩

黃連

防風

荊芥

香附

搗碎醋炒

川芎

甘州

升麻

醋炒各二分

新方固元散

治腎氣虛弱而脫者

熟地炭

五錢

人參

白朮

白芍

當歸

醋炒各三錢

山藥

山茱萸

炒

鬼餅

北五味

炙甘州

各一錢

補陰益氣煎

治肝腎不足陰虛下陷而脫者

人參

三錢

當歸

醋炒

山藥

三錢

熟地

七錢

炙甘州

陳皮

柴胡

各一錢

升麻

醋炒

七分

生薑煎服

訶子人參湯

治大腸伏熱脫肛紅腫

訶子煨去核 人參 白茯苓 白朮 炙草

石連肉 升麻 柴胡 水一鍾半加生薑煎服

真人養臟湯治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如魚腦裏急後重臍腹疼痛脫肛墜下

人參一錢 當歸一錢 白芍三錢 炙艸 訶子煨去核一錢

廣香一錢 白朮三錢 栗壳蜜炙二錢 肉桂五分 肉豆蔻麵煨去油一錢

臟寒者加製附子一錢

龍骨散治小兒大腸虛肛門脫出

龍骨二錢 訶子煨去核五分 赤石脂 沒石子二箇 罌粟壳去葶蒂醋炒二錢

共為極細末米飲調化食前服

薰洗脫肛法

用赤皮火葱韭菜二味各帶根者煎湯入大楓子肉防風末各數錢乘熱薰洗立收

方用益母草葉熬濃洗再用新鮮葉搗爛取汁以用雄末少許調和鵝毛搽上即收

一方用五倍子末三錢明礬末二錢水二碗煎沸熱洗立收

一方治脫肛三五寸者先用五倍白礬湯洗過次用赤石脂爲末四圍皆搽之以油紙擦入

又方用鼈頭煨存性入枯礬少許如上搽入

一方治陽疰脫肛腫痛用荊芥生火葱二味煎濃湯候溫洗之輕輕拭乾用地龍晒乾一兩風化硝一兩共爲末併用二錢

肛門濕則乾摻燥則清麻油調搽

一方治陰症脫肛不腫痛用紫蘇煎濃湯候溫洗之用伏龍肝
一兩鼈頭骨煨末五錢百藥煎二錢五分每用二錢藥末以
清麻油調敷

一方用草麻子數粒搗膏貼腦頂心肛收卽刻溫水洗去不可
少留些須恐提腸上懸轉成危症

一方用木賊燒存性爲末搽肛門上接入卽愈

四物湯

見補益門治血虛脫肛本方內加人參黃芪蜜炙

陰八味

卽六味加黃栢知母是也治尺脉甚旺陰虛火動而脫
者但知栢二味性寒大傷脾胃不宜久用

汗證

經云陽之汗以天地之雨名之又云陽加於陰謂之汗由是推之是陽熱加於陰津散於外而爲汗也夫心爲主陽之臟凡五臟六腑表裏之陽皆心主之以行其變化故隨其陽氣所在之處而氣化爲精亦隨其火擾所在之處而津泄爲汗經曰汗者心之液又曰腎主五液故凡汗症未有不由心腎虛而得之者心之陽虛不能衛外而爲固則外傷而自汗不分寤寐不因勞動不因發散而自出者治當補氣以衛外用溫熱之劑腎之陰虛不能內營而退藏則內傷而盜汗睡熱則出醒則漸收由陽

蒸陰分者治當補陰以營內用清滋之品或兼收斂固密至若肺虛者固其皮毛脾虛者收其中氣心虛者益其血脈肝虛者禁其疎泄腎虛者助其封藏更當觀五臟察陰陽宜溫宜補或潤或燥不得膠乎一定也

經曰陽氣有餘身熱無汗陰氣有餘多汗身寒

○飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心特重遠行汗出於腎驚惶恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾然肥人多自汗以其多氣虛瘦人多盜汗以其多陰虛有火也但臟腑俱有津液一經勞倦所傷皆足以致汗出然血之與汗雖異而亦同類故奪血者無汗奪汗者無血

經曰心之液爲汗東垣曰坤土主濕在人爲脾胃夫人之汗猶
天地之陰氣爲霧爲雨也內經獨主於心東垣又指脾胃而言
蓋心屬火主熱脾胃爲土主濕濕熱相搏爲汗明矣如天氣下
降地濕上升乃成霖雨又如甑中煮酒非湯火薰淘則不能成
涓滴也然人身清陽之氣上行達表實腠理而固皮毛謂之衛
氣衛氣象天天包地外一氣統攝猶衛氣包一身經云陽密
乃陽密者卽腠理密也此氣主於肺而本於胃故胃充則衛
實且衛氣誠由穀氣之所由化肺臟之所分布卽天真之陽必
得是而後充大無是則衰微變症百出豈止汗乎

古賢云虛損之症自汗不休者最宜用補中益氣湯少加麻黃

根製附子爲佐助其功甚捷但升柴須少用而必蜜炙以抑其
升發暴悍之性又欲其引參芪至表不可缺也

○如左寸心脉浮洪而自汗者心火炎也本方倍參芪去製附
子加麥冬五味黃連○如左關肝脉浮弦而自汗者挾有風邪
也本方加桂枝若陰虛加白芍並去附子○左尺腎脉浮洪無
力而無汗者水虧火盛也本方加黃柏知母熟地壯水之主以
制陽光亦宜去附子○右關脾脉浮洪無力而自汗者只依本
方倍用參芪○右尺相火之脉洪數無力而自汗者或盜汗者
相火挾心火之勢而上灼肺金也宜當歸六黃湯

補中益氣湯

見補益門此方治脾胃內傷穀氣不勝陽氣下陷
陰中而發熱或脉洪大因倦自汗者宜之若兩尺

脉虛微是臂中之水火並衰也又當忌用此升提之藥此秘法也特為告之

玉屏風散

治表虛瀼瀼然自汗易感風寒者

黃芪

蜜炙八錢

白朮

炒六錢

防風

三錢

黃芪補氣專固肌表故以為君白朮補脾脾主肌肉故以為臣防風去風而黃芪畏之取其相畏而功益大故以為使以其益衛固表故曰玉屏風夫以防風之善驅風得黃芪以固表則外有所衛得白朮以固裏則內有所據風邪去而不復來此欲散風邪者當依如屏珍如玉也自汗不止者乎氣虛於本方內加人參陽虛本方內加製附子

黃芪六一湯

治表虛自汗

黃芪

蜜炙六錢

粉甘草

一錢

桂枝加附子湯

治表氣虛弱自汗畏寒

桂枝三錢

白芍

三錢酒炒

炙甘草

二錢

製附子

三錢

姜棗引

大補黃芪湯

治虛弱自汗

黃芪

蜜炙

人參

白茯苓

肉蓯蓉

酒洗

熟地

當歸

山茱萸

去核

白朮

炒

防風

二錢

炙甘草

五味子

肉桂

各

白芍

酒炒各三錢

紅棗三枚引

黃芪湯

治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛或自汗盜汗不止

黃芪

蜜炙

熟地

白茯苓

麻黃

蜜炙

龍骨

各三錢

天冬

肉桂

浮小麥

炒

防風

當歸

各一錢半

炙甘草

各一錢

五味

紅棗五枚擘破水煎服

○如冷汗加製附子

發熱自汗去肉桂加石斛

當歸六黃湯

治陰虛有火令人盜汗

當歸

黃芪

蜜炙各三錢

生地

熟地

黃連

黃芩

各二錢

黃柏

景岳謂陽盛陰虛盜汗者此方為第一但既曰陰虛則元氣有降而無升肅殺之氣方深而復用肅殺之藥每乃犯虛虛之戒乎惟火實氣強者不得已而暫用之可餘非所宜新方止汗散 治虛弱人自汗盜汗

人參

麥冬

去心

生地

黃芪

蜜炙

白朮

各三錢 治心土水炒

歸身

北味 一錢

桑葉七片紅棗三枚擘破同水煎

酸棗仁湯

治心虛盜汗夜眠多驚

當歸

白芍

酒炒

人參

黃芪

蜜炙

棗仁

微炒

各