

繪圖痧驚合璧

上海廣新書局印行



刺右眉稍尖各一針

刺兩耳上

刺臍中穴一針

蓬

刺天庭

頭

痧

刺地閣一針

刺兩肩比骨陷中一針



卷之三
 陳氏下工
 陳氏下工
 陳氏下工



腋
刺鼻尖一針
放地閣一針

癰

痧


放兩耳墜

刺中腕一針

刺臍上量大指一節

刺大指火灸

刺大指火灸



藥
性
論
卷
一
一
條

藥
性
論
卷
一
一
條

藥
性
論
卷
一
一
條



刺兩手臂窩青筋

壓

舌

放鼻尖針

痧放唇中央針

放舌尖針

刺地閣一針

刺臆中穴

刺臍下一寸是穴



南京中醫藥大學圖書館藏

卷之六
 卷之七
 卷之八
 卷之九
 卷之十
 卷之十一
 卷之十二
 卷之十三
 卷之十四
 卷之十五
 卷之十六
 卷之十七
 卷之十八
 卷之十九
 卷之二十



中惡癰痧

放手指用裡
刺兩手腕各一針

放脚彎窩青筋左右各一針



中國醫藥大學圖書館版權所有

本草綱目

卷之五
木部
桂




驚風三十八症童人圖

喘臍驚症

圖中有墨圖者係正面應灸穴堂有加墨角圈者即

係背上應灸穴堂診活俱詳歌論中須細玩之耳



小兒喘氣似風症

潮熱如同火上蒸

飲食受寒風噎乳


臍下三火氣和平

今有小兒氣喘如風潮熱火蒸因飲食受風噎

乳離臍下一指用艾火三炷即安灸後勿熱與

乳併忌見風

胎毒驚症




兒未滿月泣詠呱
兩脇膨脹恍似瓜
心下一指攢臍火
管教灸後起沉疴

小兒未滿月晝夜啼哭煩燥兩脇膨脹指彈如木響身且發熱
因母腹中冷熱不勻受胎成驚名曰胎驚離心下一指灸一火
攢臍四火過半月之後方可與乳




挺厥驚症



兩手豎起哭哀哀
死去之時醒即來
手足脚心分左右
若不即治必是死

今有小兒發熱發寒而且啼哭一時死去漸漸
醒來或兩手豎起驚攔不定或乍時所喊此因
物受嚇故也將兩乳上離一指用二火脚復下
離一指用三火兩脚心各用一火

痘疹驚症



今有小兒出痘痧疹又過日而熱欲渴不渴肚
腹膨脹坐卧行走搖抖動身併啼哭煩燥者離
心下一指灸火一炷即安

小兒纔出痘痧疹
肚腹膨脹煩渴煩
坐卧行走身抖動
心下一指灸和平


瀉痢驚症



小兒瀉痢白兼紅
飲食不思哭肚疼
即將本人分指寸
鼻頂兩門臍下攻

今有小兒三五六歲至十二三歲患瀉紅白水
痢不至者原因飲食過度冷熱不勻即時手指
分寸男左女右鼻中至頂門治之又乳上及臍
下各用艾火一炷

吐瀉驚症



乳食不納兼惡心
腹脹熱還如火燠
乳上心下臍上下
灸治洗浴效如神

今有小兒乳食不納或嘔吐惡心發熱腹脹下
瀉原因乳食受傷風寒冷邪或在風坐卧或迎
風哭喊或發熱見風男左女右乳上心下臍上
下俱離一指各用艾火一炷

蛇舌驚症



小兒將舌縮又伸


發熱煩燥不轉睛

莫論男女人中灸

洗浴出汗即安寧

今有小兒將舌一伸一縮發熱睡卧眼珠定面
不轉原因受嚇得病可將人中灸一火即安治
遲者不可救

啞風驚症



不哭不語忽然驚
遍身發熱病非輕
頂後一火離三指
手足交骨左右分

今有小兒忽然昏去不哭不語遍身發熱手足不動十分沉
重原因飲食之時驚嚇得病阻塞胃中氣不能伸血不能行
緣成此病症將男左女右頂後一火離三指人中一火手足
背上大指交骨處俱一火治遲者不可救

