

治傷寒症病所察病人聲法第二十二

凡治傷寒。若見病人寒熱交作。出言壯厲。先輕後重。此是外感陽症有餘。看經在腑。當發表攻裏。若見寒熱間作。語言懶怯倦卧。且先重後輕。此是內傷陰證不足。當溫補元氣。若見病人身熱口渴。大便不通。脈來有力。口出無倫語。曰譫語。無稽妄亂曰狂言。分虛實。看身不熱。口不渴。脈沉細無力。便不實。自利。言語不接續者。曰鄭聲。宜溫補。若病人初起。頭疼身熱。惡風。噴嚏。鼻塞聲重。曰傷風。當疎風解表。聲嘶者。肺

有風熱宜清肺經。若見唇口生瘡聲啞者曰狐惑。若見口噤難言。手足攣掣曰風証。治法各隨本條。若見卒中風痰涎湧盛。口噤不言。或厥絕目直。褻遺尿者。難治。聲如鼻鼾者亦難治。但見病人喉中漉漉有聲者。即痰也。宜吐之。

治傷寒症病所察病人形體法第二十二

凡看病人。身輕自能轉動者。易治。身重不能轉動者。難醫。若見口渴。揭去衣被。脈來有力。手足露直。揚手擲足者。此爲陽証。溪當溫之。若身無熱。欲得衣蓋。倦臥不渴。脈沉細昏倦者。曰陰寒。法當溫之。若見口噤難言。手足牽引者。曰風症。治在本條。若見病人叉手冒心。因汗過多。陰虛。法當清熱養心。血。若見兩手尋衣摸床。曰撮空。雖云死証。此肝熱乘於肺金。元氣不能自主。神去魂亂。當明可治。與不可治。若見身重足

冷倦臥惡寒。好自針臥。閉目不欲見光。明憊見人言。

此屬陰寒。法當溫之。若見身如被挾。疼重如山。不能

轉側。此爲陰毒。若身重痛。脚手難移。小水短濇。此名

風濕。治法各開本條下。若見身輕。手足和煖。開目欲

見人言。此名陽証。分表裏治之。若見病人身汗如油。

喘而不休。形體不仁。乍靜乍亂。脈浮而洪。此爲命絕。

若見病人頭重視身。此名天柱骨倒。而元氣敗矣。若

見皮膚潤澤者生。枯燥者死。形如枯骨。脈脫者死。屁

臭者死。大肉脫敗者死。形瘦脈大。胃中氣多者死。形

治傷寒症病所察病人鼻法第二十三

凡見病人鼻頭色青。腹中痛。若冷者死。微黑者有水氣。黃者小便難。白者屬氣虛。赤者屬肝熱。鮮明有留飲。鼻孔乾燥者必衄血。鼻燥如烟煤。屬陽毒熱極。鼻孔冷滑而黑。屬陰毒冷極。鼻燥息如鼾睡。屬風溫。鼻塞濁涕者。屬風熱。鼻流清涕者。屬肺寒。鼻孔痔脹者。屬肺熱有風。乃肺絕而不治。鼻衄者。分點滴成流而治之也。

盛脉細短氣不足以息者危也

治傷寒症病所察病人口唇齒牙法第二十四

凡見病人唇口焦乾爲脾熱。焦而紅者吉。焦而黑者凶。唇口俱腫赤者是熱極。唇口俱青黑者是寒極。口苦者是膽熱。口甜者是脾熱。口燥咽乾者是腎熱。舌乾口燥者是心熱。口噤咬牙者是風瘧。唇口生瘡聲啞者是狐惑。齒燥無津液是陽明熱極。前板齒燥脉虛者是中暑。唇口舌胎斷紋者難治。齒如熟齒者難治。唇口燥裂是脾熱。若唇青舌卷唇吻反青環口鰓黑口張直氣口如魚口。唇口顫搖不止氣出不返者死証也。

治傷寒症病所察病人耳法第二十五

若見病人耳聾脅痛寒熱嘔而口苦屬少陽宜和解。
冬病耳聾屬氣虛從元氣復實耳自聰也耳聾耳腫
耳痛皆屬少陽風熱耳黑枯燥曰腎憊若見舌卷唇
青囊縮耳聾者難治原傷寒溫熱病耳聾者此乃爲
常例也。

治傷寒症病所看病人口法第二十六

凡治傷寒先觀兩目若見目赤唇焦舌黑屬陽毒脈洪數有力大便實大渴譫語者法當下之設或大便如常脈浮洪者三黃石膏湯主之若見目黃者如小便短濇發渴惡熱薰黃色暗者屬濕熱發黃法當分利陰陽兼或腹脹滿不痛燥渴大便不通者重則用茵陳湯輕則五苓散利之小便清白其黃自退若見小便自利大便黑小腹滿硬而痛目黃者屬畜血發黃宜桃仁承氣下盡黑物則愈其黃自退二証身目俱

黃者用姜相擦法甚良。開在發黃條下大抵發黃色
明者專主熱也。暗者主濕熱相兼。如疰病則目發赤。
如衄血則目黯。白睛黃者必發黃。如身冷無熱不渴。脉
沉細而黃者屬陰。黃法當溫之。兩眦黃者病欲愈也。
開目見人屬陽。閉目不見人屬陰。若睛自明能識見
者可治。若睛昏不識人或目上視或眼小目瞪直視
或目邪視或目睛正圓或戴眼反折或眼胞陷下皆
死証也。若見病人目睛微定暫時稍轉動者屬痰眼
也。宜吐痰出其眼珠自然流動光明也。凡見目中不

了了者。眼不和。不明白。謂見一半。不見一半。是也。此因邪熱結實于內。上蒸于目。但大便秘通。目自明活也。
治傷寒症病。須先觀病人兩目。次看口舌。已後以兩手按其心胃。至小腹有無痛處。再復聞其大小便通與不通。渴與不渴。服過何藥。或久或新。察其病之端的。脈証相同。方可以言吉凶。庶得用藥無差。此數件看法。最爲緊關切。要醫家之心法也。

治傷寒症病所察病人舌法第二十七

凡看口舌有無胎狀濕滑者吉。燥澀者凶。舌上白胎者。胃中有寒。丹田有熱。故胎白而滑。未入乎腑。邪在半表半裏間。法當和解。舌上黃胎者。必燥渴。胃腑有邪。法當下之。舌上黑胎。燥生芒刺者。必燥渴。亢極則難治也。法當下之。若不燥渴。身不熱。舌上黑胎而滑者。屬陰寒。法當急溫。若舌卷焦黑而燥者。陽毒熱極。亦當下之。若舌青而胎滑。無熱不渴者。陰毒寒極。亦當溫之。凡看舌鮮紅者吉。青黑者凶。而紫者爲陰寒。

赤而紫者爲陽熱黑者乃水尅火故難治舌乃心之苗紅色應南方火本色見故吉凡見黑者屬北方壬癸腎水來尅心火也但見舌硬舌腫舌卷舌短舌強囊縮者必難治也間有可生如舌短縮語言不清神氣昏亂脉脫者死陰陽易舌出數寸者死其夏熱病舌上黑胎燥渴者可治乃時火與邪火內外合而炎燒故舌上易生胎刺不在必死之例若黑胎刮不去易生刺裂者必死無醫冬月黑胎者實難治之此不傳之心妙也

治傷寒症病所按病人心胃有無痛處法第二

十八

以手按病人心胃有無痛處。若按當心下痛。手不可
近。燥渴譫語。大便實。脉沉有力。爲結胃症。量病輕重。
輕則用小陷胃湯。加枳桔下之。重則大陷胃湯下之。
量元氣虛弱。宜從緩治。如不渴。身無熱。脉沉無力。爲
寒結胃。宜理中湯溫散之。若口渴有熱。飲水多而心
胃停飲不散。有聲作痛者。爲水結胃。宜四苓散。合小
半夏湯滲利消之。若咳喘發渴。喉中漉漉有聲。胃脅

滿痛爲痰結。胃用加減二陳湯消之。俱用炒姜。祖掾
熨法。若心胃雖滿悶不痛。是痞滿也。乃表邪填于胃
中。只消小柴胡。加枳殼。桔梗。以治其悶。如未効。本方
對小陷胃湯。一服最神速。世俗皆所未識。若按當心
下脹滿不痛者。宜瀉心湯。加枳桔。是治痞滿也。亦用
姜。祖掾熨法甚良。按小腹有無痛處。若小腹痛而小
水自利。大便黑。兼或身黃。譫語燥渴而脉沉實者。爲
畜血。宜桃仁承氣。下盡黑物而愈。按小腹雖脹滿不
硬痛。小水不利。卽溺澀也。以五苓散利之。不可大利。

恐傷耗津液而反燥渴。如按而小腹硬。瘕硬痛。渴而小水赤。譫妄。大便不通。有燥屎也。傷寒結胃痞滿。今醫不分。曾下與未下。便呼爲結胃。便與枳桔湯反成眞結胃者有之。殊不知乃因下早而成滿硬痛者爲結胃。未經下者非結胃也。雖滿悶不硬痛者爲痞氣。乃表邪傳至胃中。未入于腑。證雖滿悶。尚爲在表。証屬少陽部分。治法開結胃痞滿條下。宜從緩治。不宜峻利。上焦乃清道。主至高之氣分。若過下之。則傷元氣也。原太陽證無汗。此寒傷榮血。當服發汗藥爲當。